

雜病篇

寒暑濕燥火

東醫寶鑑

上

東醫寶鑑雜病篇卷之三

御醫忠勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

寒下

傷寒煩渴

凡得病反能飲水此欲愈也。汗下後口乾

舌燥脉洪大人參白虎湯主之。凡得病五六

日而渴欲飲水不能多者不當與之。何者以腹中

熱尚少不能消故也。至七八日大渴欲飲水惟當

少與之常令不足勿極意也。言能飲一斗只與五

升若腹滿小便不利若喘若噦者不可與之。若小

渴咽乾者少少與之。令胃氣和則愈。○渴欲

飲水入即吐者少與之。○熱入裏則渴耗奪津液而然也。然有渴必有煩者

腎主水熱深則水竭而渴。肝木挾心火以生煩故

厥陰六七日飲水多而小便少者謂之消渴。屬太陽宜白

水為欲愈者傳經已盡也。脉浮而渴屬太陽宜白

虎湯汗多而渴屬陽明宜竹葉石膏湯自利而渴

善經云若還不能飲非其治強飲須教別病生也

渴欲飲水而不飲者丹田有熱膏中有寒也

不○陰盛隔陽之證亦漱水不欲飲

五苓散治太陽證入裏煩渴而小便不利澤瀉二錢

為末每二錢白湯調下或剉作一貼水煎服○傷寒汗後亡津但渴欲飲水者邪在裏也然上焦虛

燥或飲水不散而反吐出為水逆證或飲水雖多而小便不利者皆裏熱未實不能消水故爾五苓散也

竹葉石膏湯治傷寒解後餘熱及陽明證自汗煩渴

麥門冬一錢半半夏一錢甘草七分剉作一貼

入竹葉七片粳米百粒水煎入薑汁二匙服門一貼

傷寒潮熱發指時而發者謂之潮熱若日三五發者是

即發熱非潮熱也潮熱屬陽明必於日哺時發者乃為潮熱也陽明之為病胃家實也胃實則譫語

理○潮熱者似潮水之有信一日一發謂之潮必日哺而作陽明旺於未中故耳諸承氣湯選用下

之或潮於寅卯者屬少陽或潮於巳午者屬太陽為邪未入胃俱宜小柴胡湯和解之門○吐下後

不大便潮熱若劇則不識人循衣摸床微喘直視脈弦者生脈濇者死

傷寒發狂發狂者熱毒在胃併入於心使神昏不定言動急速妄語妄笑甚則登高而歌棄衣而走

喻垣上屋不食不時非大吐下不止表裏俱熱宜三黃石膏湯裏熱盛宜大承氣湯加黃連狂言譫

語宜辰砂五苓散○如狂者但睡中忽欲起行錯言妄語非若發狂莫能制也門○陽毒發狂宜

陽毒升麻湯陽毒施子湯切見○發狂宜用妙香丸方觀三白飲活龍散破棺湯水漬法火切法○

喜忘如狂蓄血證也○凡發狂見陽證陽脈者順見陰證陰脈舌卷囊縮者死

三白飲治傷寒熱病熱極在走雞子清一箇白蜜一大匙芒硝三錢右合作一處凉水調下

活龍散

治陽毒發狂活地龍大者四五條淨洗研取汁入薑汁薄荷汁及蜜各一匙新汲水調和

徐徐灌盡漸次涼快若熱熾則加片腦尤妙名曰地龍水門

破棺湯

治傷寒熱病發狂心躁言語不定不省人事人屎乾者燒存性水漬飲汁一二盞即變或

細研如麴新汲水調下三錢亦可俗名野人乾水鞞

水漬法

見上陽毒下

火劫法

治發狂炭火一盆置病人之前將醋一椀急沃火內使烟氣衝入鼻內須臾自定又將涼

水熨亦可

傷寒譫語鄭聲

實則譫語次第則譫語虛則鄭聲鄭聲者謂亂語無

也只將一句舊言重疊頻言之也陽明病胃實則譫語則大言重疊頻言之也陽明病胃

聲宜用白通湯大便秘小便赤手足溫脈洪數者必譫語宜用調胃承氣湯○譫語有實有虛實

則可下虛不可為實者胃實有燥屎可下之虛者
腸胃自利也難治門○傷寒大熱呻吟錯語不得
眠黃連解毒湯主之○晝日明了夜則譫語如
見鬼乃婦人熱入血室證也○傷寒發熱譫語
宜柴胡連翹湯醫

黃連解毒湯

治傷寒大熱煩躁不得眠或差後飲酒
復劇者及一切熱毒黃連黃芩黃柏枳

子各一錢二分半
剉作一貼水煎服

柴胡連翹湯

治傷寒發熱譫語呻吟不得眠
黃芩枳殼赤芍藥桔梗瓜蒌仁不

連翹黃連黃芩甘草各八分
剉作一貼入薑三片水煎服

傷寒結膏

傷寒若脈浮緊下之必結膏○傷寒表未解
而反下之熱入胃作結膏○

醫反下之隔內拒痛手不可近一云心下硬痛手
痛此為結膏宜大陷膏湯○若按心下硬痛手
急不可近燥渴譫語大便秘實脈沉實有力為大結膏
急以火陷膏湯加枳殼桔梗下之反加煩躁者死

陷膏湯○結膏者正在心下按之則痛脉浮滑宜小

陷膏湯○寒實結膏無熱證者宜三物白散小

寒熱但用陷膏湯不差用枳實理中丸應手而愈

瞷○但結膏無大熱者此為水結在胃脇但頭汗

出名曰水結膏小半夏湯加茯苓主之○方瞷○熱

實結膏宜用大陷膏九○結膏宜用灸法熨法

未經下而膏滿非結膏也○只以小柴胡合小陷膏

一加枳殼神○如神○一服如神○一服如神

大陷膏湯○治大結膏大黃三錢芒硝二錢甘遂末五

分納硝石煎一二沸去滓納甘遂末攪服得快利止後服

小陷膏湯○治小結膏半夏製五錢黃連二錢半瓜蒌

瓜蒌至一盞乃入半夏黃連煎至半去滓溫服未

利再服利下黃涎便安○一方加枳實黃芩桔

梗尤效○瓜蒌惟到其腹

勿到其子到其子者非也

三物白散

治寒實結胸，膏枯，梗，貝，母各三錢，巴豆去皮

牛錢弱人減半，或吐，或利，不利進，熱粥一椀，利不止進冷粥一椀。

大陷胸丸

治熱實結胸，大黃五錢，葶藶子炒，杏仁炒，各三錢，芒硝二錢，半甘遂二字，右為末，蜜

丸彈子大，每服一丸，水一盞煎六分，溫服，未利再服。

灸法

詳見部

熨法

詳見部

傷寒藏結

病有結胸，有藏結，其狀何如？答曰：按之痛寸

結胸，名曰藏結，飲食如故，時時下利，寸脈浮，關脈細，小沉

素有不瘕，連在臍旁，引入小腹，入陰筋者，此名藏結，死

連臍痛，引陰筋者，藏結元來死，不醫，○病入素有不

傷寒痞氣

發病發熱者若陰而反下之因作痞○此為痞○傷寒嘔而

痞氣再加傷寒與宿積相合使真藏之氣閉結不通亦名藏結慎不可下止宜示柴胡加生薑以和表灸關元以回陽解陰結危哉○藏結與結胃相似皆下後邪氣入裏與陽相結○結在胃者為結胃膏與陰不相結結在藏者為藏結惟其陰結故藏結無陽證不往來寒熱或但寒不熱其入反靜飲食如常時時下利舌上白胎脇肋臍腹引八陰筋俱痛者丹田有熱膏中有寒所以難治○陰

湯主之胃虛氣逆者亦主之○心下痞硬按之濡其脉關上浮者三黃瀉心湯主之○凡結胃與痞惡寒汗出者附子瀉心湯主之○下後下痞而復關脉須沉若關脉浮者宣此湯○心下痞而復惡寒汗出者附子瀉心湯主之○下後下痞而復數十行穀不化腹中鳴心下痞硬乾嘔心煩此乃結熱乃胃中虛客氣上逆故也甘草瀉心湯主之○雷鳴○汗解後胃不和心下痞硬○太陽病外證未除而數下之遂下利不止心下痞硬表裏不解桂枝人參湯主之○利痞氣通用○結部

半夏瀉心湯

半夏二錢黃芩人參甘草各一錢半乾薑二錢黃連五分右剉作一貼入薑

三片棗二枚水煎服

三黃瀉心湯

大黃黃連各二錢黃芩一錢右剉作一貼以沸湯一盞漬之良久絞去滓分

溫再服

附子瀉心湯

大黃黃連黃芩各二錢剉附子炮二錢別煮作汁右取百沸湯一盞入三味漬

之良久去滓納附子汁分溫再服

甘草瀉心湯

甘草二錢黃芩乾薑各一錢半半夏人參各一錢黃連五分右剉作一貼入

大棗三枚水煎服

生薑瀉心湯

生薑半夏各二錢人參乾薑各一錢半黃連甘草各一錢黃芩五分右剉作一

貼入棗三枚水煎服

桂枝人參湯桂枝另剉甘草炙各一錢半右剉作一貼水二盞

煎至一盞入桂枝煮取七分去滓溫服日二服

傷寒筋惕肉瞤動氣在左而發汗則筋惕肉瞤也古人以

真武湯主之然真武湯能止其汗而榮筋筋愈急

而四體百骸俱為之動血虛無以榮筋筋愈急

人參半夏茯苓甘草作劑以五靈脂為佐入生薑

傷寒除中證厥而利反能食曰除中其死也可立待也

○邪在表則不能食邪在裏則不能食今傷寒厥深

下利脈遲當不能食而反能食者名曰除中中深

胃氣既除豈可再復乎○厥利當不能食今反能

食恐為除中試食以索餅發熱者除中也不發熱

者非除中知胃氣尚在必念也

傷寒血證太陽病六七日表證因在脉藏而沉反不結

自利者下血乃愈抵當湯主之○太陰當湯證身黃

傷寒小腹痛滿應小便利者血證諦也宜抵當湯○

下之宜抵當丸○太陰病不解熱結為有血也當

似狂若氣湯下者自愈但小腹急結者宜攻之宜

桃仁承氣湯○勿忌發汗者為無脉或脉微故

也若脉浮緊身疼惡寒發熱則汗之可也宜麻黃

湯桂枝湯○若脉微不可汗則犀角地黃湯主

之方觀血門○小陰病強發汗血出九竅是名下

厥上竭不治○太陰病脉浮緊發熱無汗而

者自愈也○傷寒頭痛發熱口乾口鼻血出午

後昏沉耳聾脇痛俗名血汗病也犀角地黃湯合

小柴胡湯主之

抵當湯治一切瘀血結膏諸語漱水等證水蛭炒

水煎服右剉作一貼

抵當丸治蓄血在下而無身熱便黑喜忘如狂等證

蜜各七箇作二丸水一盞煎一六箇大黃三錢右為末蜜和分

桃仁承氣湯治血結膀胱小腹結急便黑譫語水

甘草一錢水煎入芒硝溫服以瘀血盡下為度

傷寒自利傷寒陰證身痛脈沉大便秘自利或嘔或下利

飲大便秘自利宜柴胡湯

柴苓湯治傷寒熱病發熱泄瀉柴胡一錢六分澤瀉

七分黃芩右剉作一貼入薑三片水煎溫服

傷寒胸腹痛傷寒腹痛中脘痛太陰也

為結青若未經下者非結膏也乃邪氣填塞胃中

東醫寶鑑

膏加枳枯一脈如神
乃瘡氣也宜瀉心湯
便利則為瀉蓄血之證
和則為尿證之證
小便大承氣湯下之
屎也大承氣湯下之

傷寒吐衄死蓋胃中有寒則
傷寒吐衄死蓋胃中有寒則
傷寒吐衄死蓋胃中有寒則

煎服待衄定却以小柴胡湯退熱
煎服待衄定却以小柴胡湯退熱
煎服待衄定却以小柴胡湯退熱

虛者手足冷胃

陰陽交證黃帝問曰有病溫者汗出輒復熱而脈躁疾

名陰陽交者死也帝曰願聞其說岐伯曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨

肉而得汗者是邪却而精勝也精勝則當能食而不復熱復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒

其壽可立而傾也且夫熱論曰汗出而脈尚躁盛

者死狂言不能食謂之陰陽交言交合陰陽之氣不

死證也別此

壞證傷寒病未退重感寒變為溫瘧重感風變為風溫

病經汗吐下溫鍼不解及過經不解皆名壞證或

醫者不辨陰陽錯謬汗下使病不解壞證亂經久

而不差視其犯何逆以治之表證多者知母麻黃

湯半表者小柴胡湯餘熱不解者參胡芍藥湯危

急者奪命散諸藥不效者蠶甲散

知母麻黃湯治壞傷寒以傷寒差後經久精神不守

汗下不盡毒留心甘草灸各一錢右剉作一貼水煎

服微汗即愈

本去桂心代桂枝

參胡芍藥湯治傷寒十四日外餘熱未除或渴或煩

赤此為壞證生地黃一錢半人參柴胡芍藥黃芩
知母麥門冬各一錢枳殼八分甘草三分石到作

一貼入薑三片水煎服

奪命散治傷寒壞證昏沉垂死或陰陽一證不明過

之證一好人參一兩剉作一服水二升於銀石器內
煎至一升去滓以新水沉冷一服而盡汗自鼻梁

效也一消消如水是藥之

鰲甲散治壞證諸藥不效鰲甲二錢犀角前胡黃芩
生地黄各一錢枳殼八分烏梅二箇石到作

煎服水

百合證大病後未平復失於調理餘證在陽醫反下之

無復經絡故謂之百合傷寒其證常黑然欲食
不能食欲卧不能卧欲行不能行或有時聞食臭

或時如寒無寒如熱無熱口苦小便赤諸藥不能
治藥入口即吐利如有神靈身形雖似和其脉微

數每尿時輒頭痛者六十日乃愈若尿時眩者三十日漸然者四十日愈若尿時快然但頭眩者三十日愈宜用陶氏柴胡百合湯百合湯百合地黃湯百合滑石散石代赭湯百合雞子湯百合地黃湯百合滑石散以百合洗方煎。百合者百脉合病也治

陶氏柴胡百合湯 治百合病及勞復等證 驚甲 瞽煮 二錢柴胡 百合 知母 生地黃 陳皮

入參黃芩甘草各一錢右剉作一貼入薑三片棗二枚水煎服

百合知母湯 治汗後百合證 七枚知母 一兩右 先將百合水浸一宿當白沫出去其水

更以井水二盞煎至一盞去滓又將井水二盞另煎知母取一盞去滓二汁和勻同煎取一盞半分

服溫水

百合滑石代赭湯 治下後百合證 七枚滑石 三兩右煎如上法服

百合雞子湯 治吐後百合病 七枚雞子黃 一箇右先將百合水浸一宿當白沫出去其