

韓園醫學六種十二

十
二
種
書

省中医学委员会書簽

編號 11-102 $\frac{12}{12}$



十藥不申書

付霍亂吐
瀉方論



南京中醫藥大學圖書館版權所有

光緒甲申季春
江西書局開雕



余奉使渡臺後感受海外瘴癘吐血咳嗽公餘
繙閱是編照方試服不旬日血止而嗽亦平矣
深服是編十方治法爲切中竅要蓋吐血原於
肺胃上逆十灰散用柏葉以斂肺大黃以降胃
牡丹皮山梔等味以瀉肝膽之火然後清金補
土固其營衛以次奏功焉得不瘡經陳修園先
生逐方詳註極爲精當余又以己意及名人所
論隨筆添註於上汪子用大令索閱是編讀而

好之用之有效因爲付梓剞劂既竣并乞弁言
光緒己卯秋吳潘蔚書於鄂署之精白堂



南京中医药大学图书馆版权所有

夫人之生皆稟天地之氣而成形宜乎保養真
元固守根本則一病不生四體輕健若曰不養
真元不守根本病卽生矣根本者氣血精津也
予得先師之教萬病無如癆症之難蓋因人之
壯年血氣充聚津液完足之際不能守養惟務
酒色豈分饑飽日夜耽慾無有休息以致耗散
精液則嘔血吐痰骨蒸煩熱腎虛精竭形羸頰
紅面白口乾咽燥小便白濁遺精盜汗飲食難

進氣力全無斯因火乘金位重則半年而斃輕則一載而傾況爲醫者不究其源不通其治或大寒大熱之藥妄投亂進不能取效殊不知大寒則愈虛其中大熱則愈竭其內所以世之醫者無察其情予師用藥治癆如羿之射無不中的余以用藥次第開列於後用藥之法逐一條陳如嘔血咳嗽者先服十灰散揭住如不住者須以花蕊石散止之大抵血熱則行血冷則凝

見黑則止此定理也止血之後患人必疏解其
體用獨參湯補之令其熟睡一覺不要驚動醒
則病去六七矣次服保真湯止嗽甯肺太平丸
潤肺扶痿消化丸下痰疏氣保和湯分治血盛
痰盛喘盛熱盛風盛寒盛六事加味治之餘無
加法又服藥法曰三日前服保真湯三日後服
保和湯二藥相間服之爲準每日仍濃煎薄荷
湯灌漱喉中用太平丸徐徐嚥下次噙一丸緩

一
卷
二
緩化下至上牀時候如此用之夜則肺竅開藥
必流入肺竅此訣最爲切要如痰壅卻先用飴
糖烱消化丸百丸吞下又依前嚼太平丸令其
仰臥而睡嗽必止矣如有餘嗽可煮潤肺膏服
之復其根本完其真元全愈之後方合十珍丸
服之此謂收功起身藥也前藥如神之妙如神
之靈雖岐扁再世不過於此吁世之方脉用藥
不過草木金石碌碌之常耳何以得此通神訣

要奇異之靈也余蒙師授此書吳中治癆何止
千萬人哉未嘗傳與一人今衛世恐此泯失重
次序一新名曰十藥神書留遺子孫以廣其傳
矣時至正乙酉一陽日可久書於姑蘇養道丹
房

余自髫稚學業醫道攷究方脉三十餘年遍歷
江湖多學廣博者不過言語文字形容之耳及
至用藥治病皆不能捷是以日夜苦心用志務

在中病後遇至人同處三月斯人極明醫道精通方術用藥如發矢無不中的余曰必神人也遂拜爲師得授奇方一冊閱之或羣隊者或三四洙者皆余目觀至人用效者也使予如久旱逢霖夜行得月心中豁然自此回至吳中一用一捷無不刻驗信乎奇方可錢梓者也余以三餘暇日將至人所授奇方併日用決效之法類成一帙名曰十藥神書蓋用效者輒記錄之今



西浙大癡道人與余通家之好用禮求授故錄
以奉養生濟人之功用爾時至正戊子春正月
三陽日可久再書於姑蘇春先堂

十藥神書目錄

甲字十灰散

乙字花蕊石散

丙字獨參湯


丁字保和湯

戊字保真湯

己字太平丸

又名寧嗽金丹

庚字沉香消化丸



辛字潤肺膏

壬字白鳳膏

癸字補髓丹

平胃散方

附

四君子湯

附



南京中醫藥大學圖書館版權所有

十藥神書

姑蘇葛可久編

古吳潘蔚韓園重校增注

甲字十灰散

治嘔血吐血咯血嗽血先用此藥止之

大薊 小薊 荷葉 扁柏葉 茅根

茜根 山梔 大黃 牡丹皮 櫻櫚皮

各等分

右各燒灰存性研極細末用紙包碗蓋於

一藥而書
地上一夕出火毒用時先將白藕搗汁或
蘿蔔汁磨京墨半碗調服五錢食後服下
如病勢輕用此立止如血出成升斗者用
後藥止之

十灰大小薊大黃梔子茅根茜草根側柏葉同
荷葉等櫻櫚皮並牡丹嘗

陳脩園按前散自注云燒灰存性今藥肆中
止知燒灰則色變爲黑而不知存性二字大

有深義蓋各藥有各藥之性若燒之太過則成死灰無用之物矣唯燒之初燃卽速放於地上以碗覆之令滅其火俾各藥一經火煉色雖變易而本來之真性俱存所以用之有效人以爲放地出火氣猶其淺焉者也然余治證四十餘年習見時醫喜用此藥效者固多而未效者亦復不少推原其故蓋因製不如法亦因輕藥不能當此重任必須深一步