

明・劉全備

編注

新編注解藥性賦



明・劉全備

編注

新編
注解
藥性
賦



新編注解藥性賦·書影

大腸藥性

大腸乃手陽明之經，多血多氣。

其經起自商陽穴，在手指頭內側端，終於迎香穴，在鼻孔傍五分針縫中。

庚金之腑。

大腸乃肺之腑。

傳道之官，變化出焉。

謂傳不潔之道，變化物之形。

合肺臟而長二丈之一，曲十六而廣四寸。

大腸乃肺之臟，雖經云長二丈一尺，廣四寸，疊十六曲，千金云長一丈二尺，廣六寸，右回疊十一曲。

新編注解藥性賦·解題

明·劉全備編注。成書約於成化二十年（公元一四八四年）。

劉全備，字克用。柯城（今河南內黃）世醫。

全書共有藥性賦十四篇，爲總賦、外感、內傷及五臟六腑藥性歌賦。大字賦文下有注釋，注出典故、性用、治驗、單方等方法。卷末爲補真養性等内容。

原書與劉氏《病機賦》合刻，末附『權正活法』，統稱《合刻劉全備先生病機藥性賦》。

今據明·成化二十年（公元一四八四年）近聖居序刊本影印。

（鄭金生）

新編注解藥性賦 · 總目

注解藥性賦序	〇一〇
新編注解藥性賦卷之上	
藥性賦	〇一三
外感	〇二五
內傷	〇二九
心臟藥性	〇三三
小腸藥性	〇三七
肝臟藥性	〇四二
膽腑藥性	〇四七
脾臟藥性	〇五一
胃腑藥性	〇五六
肺臟藥性	〇六一
大腸藥性	〇六七
腎臟藥性	〇七〇
膀胱腑藥性	〇七五
三焦腑藥性	〇七八
補真養性	〇七九
(新編注解病機賦卷之下)	
(病機賦)	〇九七
新編論四時六氣用藥權正活法卷之首	
論四時六氣用藥權正之活法	一五七

合刻劉全備先

生病機藥性賦

醫學須知 近聖居藏板

欽差巡按浙江等處監察御史
林 案驗前事照得當職巡
欽差巡按浙江等處監察御史
林 案驗前事照得當職巡
歷兩浙地方訪其依山
居民凡遇有病

註解藥性賦序

乙

媚淫神被其誑誘百出不經
之費且囚之耽誤致死者無
限其死生俱受此害深可憫
惻揆厥所由皆因地處偏僻
無醫無方無所求治而勢不
得不趨於彼今將世醫劉全

備所編輯病機并藥性二賦
註解詳明實學醫者之指南
令善書者楷謄案發吳江縣
刊行據申報尚義官屠昱沈
能自願雇工版刊送縣等因
爲此仰本縣着落當該官吏

註解藥性賦序

二

聽其屠昱沈能自買梨板雇
匠雕刊送縣印發地方有司
分給醫者與人民知悉凡遇
有病可對方求藥以療之量
其全活者必多而其破費者
亦少是乃吾儒醫道旣行彼

邪術淫神自廢譬之正氣得
勝而邪氣自消抄案官吏先
具不違依准繳來本縣依蒙
刊發施行

成化二十年十一月長至後
二日刊

註解藥性賦序

三

新編註解藥性賦卷之上

柯城醫士劉全備克用撰

後學 劉朝珂 校正

魏知幾

書林余應虬重訂

藥性賦

黃帝立論

軒轅氏作素問論人疾苦

神農理藥

註解藥性賦

乙

神農氏與本草以明藥性

方分奇偶緩急藥按君臣佐使味嘗甘苦辛酸淡鹹
性別寒熱溫涼毒善相須配合者品用隨安相反畏
惡者單行取效明而用者若步康衢昧而行者如登
蜀道若人參白朮黃耆甘草當歸茯苓陳皮姜棗德
似一夔氣同四時保比子房正如顏杲有守有爲似
平國老觀諸甘草膏療癰疽之酷烈

國老膏治一切癰疽諸發預期服之能消腫逐毒
使毒氣不內攻功効不可具述用大橫紋粉草或
斤施令碎河水浸一宿搥令漿汁去盡筋滓再
用密絹濾過銀石器內慢火熬成膏以磁罐收之

每服一二匙。無灰酒調服。或白湯亦可。
胃服燥藥。丹劑亦解之。或微利無妨。

人參湯治吐血之狼狽。

有人忽然吐血。其証皆因內損。或因酒色勞損。或心肺脈破。血氣妄行。血如湧泉。口鼻俱出。須臾不投。用側柏葉。蒸焙乾。人參各一兩。焙乾。二味爲末。每服二錢。飛羅麵二錢。新汲水調。如稀糊服之。

白朮療泄。健脾胃。以驅風。茯苓主嘔。伐腎邪。而滲濕。

黃耆補虛。汗最佳。生姜治嘔吐却妙。芎歸滅理血之

珍。烏沉實和氣之寶。用之得宜。無往不好。大黃號爲

將軍。朴硝巴豆之屬類焉。以其能破結攻堅。推陳去

積。若勇將之敢死擒生。身先士卒而不難也。如關羽

註解藥性賦

二

之刺顏良。班超之斬邊使。李世勣之豪傑。薛仁貴之

英武也。汗之者。麻黃乾葛。

輕可
去實

吐之者。藜蘆瓜蒂。

病在上
者吐之

逐水以芫花大戟。消脹以黑丑檳榔。瀉氣須枳實葶

藶。破血用水蛭虻蟲。開渠有滑石木通。決壅有甘遂

防己。腦麝通關。硝礪破積。恒山截瘧。粟殼止痢。燥痰

者砒丹。回陽者烏附。此皆破壘奪旗之雄卒也。然下

痰氣必半夏陳皮。定喘嗽。須杏仁五味。甘桔寬咽。柴
苓退熱。麻仁枳殼以寬腸。豆蔻砂仁而快胃。脾疼者
烏沉心痛者玄木。消食麴蘖須投。治痢香連莫捨。吹
鼻衄龍骨梔灰。定吐血人參小蘗。疝起小腸。川練苗
香木蕩血歸大腑。黃連枳殼芎歸。此則列行伍之敵
兵也。又若噴醋愈盤腸之產。

產有盤腸產。產下腸盤出不收。用醋噴產婦面。一
噴。一縮。不過三兩噴。則腸歸縮矣。

吐痰愈便閉之瘥

昔有小便癰閉者。用藥通利不效。良醫用二陳湯
加香附子探吐之。卽通知其痰結於肺。譬如玉漏。

註解藥性賦

三

上竅閉塞下
竅不通矣

破眼上之粉瘤

昔張子和治一夫當目之上。網內皆生一瘤。色若
灰。李垂覆目。睛不能視。物子和令其僂臥一床。以
繩束其肋刺委中大出血。先令以
手按其目。瘡上一刺。出雀糞立平。

落舌中之肉菌

余治一童。下出麻後。舌生瘡出血。如泉。服諸藥無
效。一旦舌出菌者三。其人如狂。卽合琥珀犀角膏
用三五丸。卽
落血止瘥愈。

傷者安之信軍吏之煨葱

昔有書官因傷其拇指。并爪甲。擘裂。瘡索金瘡藥。
畏之。強坐。頓索酒飲至數盃。已過量而面色愈青。

忍痛不止有軍吏言取葱新折者便入瘡灰火熨
蒸熱剝皮擘開其間有涕取瘡損處仍多熨取瘡
續易熱者凡三易之面色却赤斯須云又不痛片
十數度易熱葱并涕裹纏遂畢席笑語○余治
一夫因截馬草去其一指亦用此法則血止痛消
亦不瘡癰良

驚者平之炒醫師之擊覺

昔有一婦宿於樓上夜值盜劫人燒舍驚墮床下
自後每聞有響則驚倒不知人家人躡足而行莫
敢冒觸歲餘不痊諸醫作心病治之入參珍珠及
定志丸皆無效張子和見而斷之曰驚者為陽從
外入恐者為陰從內出驚者為自不知故也恐者
自知也足陽明膽經屬木膽者敢也驚怕則膽傷
矣乃命二侍女執病婦之兩手坐於高椅之上當
面前下置一小凳子和平曰娘子當視此用一不猛
擊其覺其婦大驚和平曰我以木擊覺何必驚乎
同少定擊之驚少緩又斯須連擊三五次又以木

註解藥性賦

四

擊門又暗遣人畫背後之窗徐驚定而笑曰是
何法子和曰內經云驚者平之平者常也平常見
之必無驚是夜使人擊其門窗自夕達旦夫驚者
神上越也從下擊覺使之下視所以收神也二三
日間雖聞雷亦不驚矣○余嘗治一婦人亦因驚
而得病後復小產其病聞響則驚口噤目瞪或手
提搐或語言亂若神靈所扶諸醫治不效余以和
血氣下痰清心之劑少効復發後用抱膽丸不十
粒病痊如故此驚傷膽信不誣矣○抱膽丸治男
子婦人一切癰癤風狂或因驚恐怖畏所致及婦
人產後血虛驚氣入心并室女經脈通行驚邪
結頓服此累會經效水銀貳兩朱砂壹兩細研黑
鉛壹兩半乳香壹兩細研本將黑鉛入銚子內下
水銀結成砂子大下朱砂滴乳香乘熱用柳木槌
研勻在布雞頭子大每服一丸空心井花水吞下
病者得睡切莫驚動再服除根

病若急於勝理扁鵲難醫