

草部 卷之二上

本草綱目草部目錄第十二卷

李時珍曰天造地化而草木生焉剛交于柔而成根
荄柔交于剛而成枝幹葉蕎屬陽華實屬陰由是草
中有木木中有草得氣之粹者爲良得氣之戾者爲
毒故有五形焉金木水火土 五氣焉香臭腥膻 五色焉青赤黃白
黑五味焉酸苦甘辛鹹 五性焉寒熱溫涼平 五用焉升降浮沉中 炎
農嘗而辨之軒岐述而著之漢魏唐宋明賢良醫代
有增益但三品雖存淄澑交混諸條重出涇渭不分
苟不察其精微審其善惡其何以權七方衡十劑而

寄死生卽于是翦繁去複繩繆補遺折族區類振綱
分目除穀菜外凡得草屬之可供醫藥者六百一十
種分爲十類曰山曰芳曰隰曰毒曰蔓曰水曰石曰
苦曰雜曰有名未用

舊本草部上中下三品共四百四十七種今併入三十一種移
二十三種入菜部三種人穀部四種入果部二種入
木部自木部移併一
併一十三種果部移併十四種蔓草二十九種菜部移
類有名未用共二百四十七種

神農本草經一百六十四種

梁陶宏景註

名醫別錄一百三十種

陶宏景註○七十
八種有名未用

李氏藥錄一種

魏李當之

吳氏本草一種

魏吳普

唐本草三十四種

唐蘇恭

藥性本草一種

唐甄權

本草拾遺六十八種

唐陳藏器

食療本草二種

唐孟詭

海藥本草四種

唐李珣

四聲本草一種

唐蕭炳

開寶本草三十七種

宋馬志

嘉祐本草一十七種

宋掌禹錫

圖經本草五十四種

宋蘇頌

日華本草七種

宋人大明

用藥法象一種

元李杲

本草補遺一種

元朱震亨

本草會編一種

明汪機

本草綱目八十六種

明李時珍

附註宋雷敦炮炙論

唐楊損之刪繁

北齊徐之才藥對

唐孫思邈千金

蜀韓保昇重註

南唐陳士良食性

唐慎微證類

陳承別說

元王好古湯液

金張元素珍珠囊

吳瑞日用

明汪穎食物

王綸集要

陳嘉謨蒙筌

憲王救荒

寧原食鑑

草之一

山草類上三十一種

甘草

本經

黃耆

本經

人參

本經

沙參

本經

蕣莞

別錄

桔梗

本經

長松

拾遺

黃精

別錄

萎蕤

本經

鹿藥

委蛇附

知母

本經

肉蓯蓉

木經

列當

開寶

瑣陽

補遺

赤箭天麻

本經

术

本經

木經

狗脊

本經

貫衆

本經

巴戟天

本經

巴棘附

遠志

本經

白脉根

唐本

淫羊藿

本經

仙茅

開寶經

立參

本經

地榆

本經

丹參

本經

紫參

本經

王孫

本經

紫草

木經

白頭翁

本經

白及

本經

三七

綱目

右附方舊八十六新二百六十

老

草綱目草部

卷十二

目錄

本艸大薑八十六種二百六十

紫草

木鱗

白頭翁

木鱗

白叉

木鱗

三十一

鱗目

山茱萸

木鱗

丹參

木鱗

紫參

木鱗

王孫

木鱗

白頭翁

木鱗

羊齒

木鱗

山藥

木鱗

立參

木鱗

白頭翁

木鱗

山藥

木鱗

山藥

木鱗

開寶

木鱗

本草綱目草部第十二卷上

草之一 山草類三十一種

甘草

本經
上品

釋名

蜜甘 別錄

蜜草

別錄

美草

別錄

落草

別錄

靈通

記事珠

國

老

別錄 宏景曰
用者猶如香

中
有沈香也

國老卽帝師之稱雖

非君而爲君所宗是以能安

加草石而解諸毒也

魏權曰

諸藥中甘草爲君治七

二種乳石毒解

一千二百般草木毒調和

衆藥

有功故有國老之號

集解

別錄曰甘草生河西川谷積沙山及上郡二

西上郡今不復通市

今出蜀漢中悉從汶山諸夷

中來赤皮斷理看之堅實者是抱孚草最佳抱孚

乃西羌地名亦有火炙乾者理多虛疎又有如鯉

魚腸者被刀破不復好青州間有而不如有紫

甘草細而實乏時亦可用蘇頌曰今陝西河東州

郡皆有之春生青苗高一二尺葉如槐葉七月開

紫花似柰冬結實作角子如畢豆根長者三四尺

粗細不定皮赤色上有橫梁梁下皆細根也采得

去薹頭及赤皮陰乾用今甘草有數種以堅實斷

理者爲佳其輕虛縱理及細勒者不堪惟貨湯家

用之謹按爾雅云薹大苦郭璞薹似地黃又詩唐

風云采苓采苓首陽之巔是也薹與苓通用首陽

之山在河東蒲坂縣乃今甘草所生處相近而先

儒所說苗葉與今全別豈種類有不同者乎李時

珍曰按沈括筆談云本草註引雨雅薹大苦之註

爲甘草者非矣廓璞之註乃黃藥也其味極苦故

謂之大苦非甘草也甘草枝葉悉如槐高五六尺

但葉端微尖而糙濶似有白毛結角如相思角乍

一本生至熟時角折子扁如小豆極堅齒嚼不破

今出河東西界寇氏衍幾亦取此說而不言大苦

非甘草也以理度之郭說形狀羽不相類沈說過之今人惟以大徑寸而結繫斷文者爲佳謂一粉

草其輕虛細小者皆不及之鋸積霏雪錄言安南甘草大者如柱土人以架屋不識果然否也

根修治

雷敷

日凡使須去頭尾尖處其頭尾吐人

每用切長三寸擘住六七片入蕘器中盛

用酒浸蒸從巳至午取出暴乾剉細用一法每斤

用酥七兩塗炙酥盡爲度又法先炮令內外亦黃

用時珍曰方書炙甘草皆用長流水蘸濕炙之至

熟刮去赤皮或用漿水炙熟未有酥炙酒蒸者大

底補中宜炙用

瀉火宜生用

氣味甘平無毒

寇宗奭曰生則微涼味不佳炙則溫王好古曰氣薄味厚升而浮陽

也入足太陰厥陰經時珍曰通入手足十二經○徐之才曰木苦參乾漆爲之使惡遠志友大戟芫花甘遂海藻權曰思豬肉時珍曰甘草與藻戟遂

芫四物皆灰而胡治居十治癰潰以十棗湯加甘

草大黃乃是痰在膈上欲令通泄以拔去病根也
東垣李杲治項下結核消腫潰堅湯加海藻丹溪
朱震亨治勞瘵遷心飲用芫花二方俱有甘草皆
本胡居士之意也故陶宏景言古方亦有相惡相
反並乃不爲害非妙達精微者不能知此理主治五臟六腑寒熱邪氣

堅筋骨長肌肉倍氣力金瘡癰解毒久服輕身延

年本經。腫音時勇切腫也溫中下氣煩滿短氣傷臟咳嗽止

渴通經脈利血氣解百藥毒爲九土之精安和七

十二種石一千二百種草別錄主腹中冷痛治驚癇

除腹脹滿補益五臟腎氣內傷令人陰不痿王婦

人血滯腰痛凡虛而多熱者加用之權安魂定魄

補五勞七傷一切虛損驚悸煩悶健忘通九竅利

百脉益精養氣壯筋骨

大明

生用瀉火熟用散表

寒去咽痛除邪熱緩正氣養陰血補脾胃潤肺

明季果

吐肺瘻之膿血消五發之瘡疽

古好解

小兒胎毒驚

癰降火止痛

時珍

稍主治生用治胸中積熱去莖中痛加酒煮延胡索苦棟子尤妙

元素

頭主治病用能行足厥陰陽明二經汚濁之血消腫導毒

亨震

主癰腫宜八吐藥

時珍

發明

震亨曰：甘草味甘，大緩諸火。黃中通理，厚德載物之君子也。欲達下焦，須用稍子。冥曰：甘

草氣薄，味厚可升可降。陰中陽也。陽不足者，補之以甘；甘溫能除大熱，故生用則氣平，補脾胃不足而大瀉心火，炙之則氣溫，補三焦元氣而散表寒除邪熱去咽痛，緩正氣養陰血。凡心火乘脾，腹中急痛，腹皮急縮者，宜倍用之。其性能緩急，而又協和諸藥使之不爭，故熟藥得之緩，其熱寒藥得之緩，其寒熱相雜者，用之得其平。好古曰：五味之用，苦泄辛散，酸收鹹歛，甘上行而發，而本草言甘草下氣，何也？蓋甘味主中有升降浮沉，可上可下，可外可內，有和有緩，有補有泄，居中之道盡矣。張仲景附子理中湯用甘草，恐其僭上也。調胃承氣湯用甘草，恐其速下也。皆緩之之意。小柴胡湯有柴胡、黃芩之寒，人參半夏之溫，而用甘草者，則有調和之意。建中湯用甘草以補中而緩脾急也。鳳髓丹用甘草以緩賢急，而生元氣也。乃甘補之意。又曰：甘者令人中滿，中滿者勿食甘。甘緩而壅氣。

非中滿所宜也。凡不滿而用灸甘草爲之補。若中滿而用生甘草爲之瀉。能引諸藥直至滿所。甘味入脾歸其所喜。此升降浮沉之理也。經云：以甘補之，以甘瀉之，以甘緩之，是矣。時珍曰：甘草外赤中黃色，兼坤離味濃氣薄，資全土德，協和羣品。有元老之功，普治百邪。得王道之化，費帝力而人不知歛神功而已。不與可謂藥中之良相也。然中滿嘔吐酒客之病，不喜其甘，而大戟、芫花、甘遂、海藻與之相反，是亦迂緩不可。以救昏昧而君子嘗見嫉於宵人之意與。○頌曰：按孫思邈千金方論云：甘草解百藥毒，如湯沃雪。有中鳥頭巴豆毒，甘草入腹卽定。驗如反掌，方稱大豆汁，解百藥毒。予每試之，不效。如入甘草爲甘豆湯，其驗乃奇也。又葛洪肘後備急方云：席辯刺史嘗言嶺南俚人解蠱毒藥，並是常用之物。畏人得其法，乃言三百頭牛藥，或言三百兩銀藥，久與親狎，乃得其詳。凡飲食時先取炙熟甘草一寸嚼之，蘸汁若中毒，隨卽吐出，仍以炙甘草三兩生薑四兩水六升煮二升，日三

服或用都淋藤黃藤二物酒煎溫常服則毒隨人
小溲出又常帶甘草數寸隨身備急若經含甘草
而食物不吐者非毒物也三百頭牛藥卽土常
山也三百兩銀藥卽馬兜鈴藤也詳見各條

附方

舊十五

新二十傷寒心悸

脈結代者甘草二兩水三升煮一半服七合日一服

傷寒類要

傷寒咽痛少陰證

甘草湯主之用甘草二兩水二升煮一升半服五合

目二服

張仲景

傷寒論肺熱喉痛

有痰熱者甘草炒二兩桔梗米泔浸一夜一兩每服

五錢水一鍾半入阿膠

半片煎服

錢乙直訣肺痿多涎

肺痿吐涎沫頭眩小便數而不

亥者肺中冷也

甘草乾薑炮二兩

水三升煮一升五合分服

甘草湯溫之甘草炙四兩乾薑湯以甘草三

匱要畧

肺痿久嗽

涕唾多骨節煩悶

寒熱以甘草三兩炙搗爲末每日取小便三合調

甘草末一錢服

小兒熱嗽

宿灸研末蜜丸綠豆大

之廣利方

食後薄荷湯

下十九丸

初生解毒

小兒初生未可便與殊砂蜜只以甘草

名涼膈丸

聖惠方

初生解毒

與殊砂蜜只以甘草

草一指節長炙碎以水二合煮取一合以綿染點

兒口中可爲一塊

敷當吐出胸中惡汁此後待兒

饑渴更與之令兒智慧無

病出痘稀少王璆選方

病出痘稀少

王璆選方

初生便閉

各一錢水半

蓋煎服

全幼心鑑

小兒撮口

發噤用生甘草二錢半水一

以乳汁點兒口

金匱玉函

嬰兒目澀

月內目閉不開或腫羞明或出血者名慢肝風

中用甘草一截以猪膽汁炙爲末每

用米泔調少許灌之

幼幼新書

大甘草頭

煎湯夜夜服之

小兒尿血

甘草一兩二錢水六合煎二合一歲兒一日服

危氏得效方盡姚和

小兒羸瘦

甘草三兩炙焦爲末蜜丸緣豆大每溫水下五丸日二服

衆至寶方金匱

大人羸瘦

甘草三兩炙每旦以小便煮三

赤外臺秘要

玉函四沸頓服之良

白痢下

崔宣州衍所傳

方用甘草一尺炙劈破以淡漿水蘸水一升半煎取八合服之立效

○梅師方用甘草一兩炙肉豆蔻七個煨剉以水三升煎一升分服

甘草煎濃湯熱漱不治

甘草煎濃湯熱漱

頻吐聖濟總錄

太陰口瘡

甘草二寸白朮一栗大同嚼嚥汁保命

集發背癰疽

崔元亮海上集驗方云李北海言此方乃神授極奇秘用甘草三大兩生

搗篩末大麥麴九兩和勻取好酥少許入內下沸

水搜如餅狀方圓大於瘡一分熱傳腫上以紬片

及故紙膈令通風冷則換之已成者膿水自出未

成者腫便內消仍當喫黃芪粥爲妙○又一法甘

草一大兩水炙搗碎水一大升浸之器上橫一小

刀子露一宿平明以物攬令沫出去沫服之但是

瘡腫發背皆甚

蘇頌圖經諸般癰疽

甘草三兩微炙切以酒

效

蘇頌圖經一斗同浸瓶中用黑鉛

一片溶成汁投酒中取出如此九度令

病者飲酒至醉寢後卽愈也

經驗方一切癰疽