

長樂陳修園著

傷寒真方謬括

遠安堂匪板

同治七年冬 錄

陳修園先生晚餘
式書

傷寒真方歌括
傷寒醫訣串解
十藥神書註解

三山林氏校刊

序

醫至仲景歷矣六經之理至
傷寒論盡矣自宋景濂學士
割為紀全書之說而後之注
是考者任意刪移如杼臆說

刀圭家苦無遠從吾潤陳

脩園前輩精於醫理嘗取

景傷寒揭其旨要分經辨證

各立方例間有未盡明者復

詳注其所以然之妙未錄魏念

庭先生跋語以殿之顏曰真方
歌括讀此果得其解是亦衛生
之一助也美友引伸觸類不泥
於法而亦不背於法神而明之
則存乎其人矣

時

咸彞已未重陽前百後學林

壽壹謹序

傷寒真方歌括卷一

閩長樂陳念祖修園著

冷南林壽萱校

太陽上篇方法

太陽為寒水之經。主一身之膚表。邪之初傷。必自太陽經始。論云。太陽為病。脈浮。頭項強痛。惡寒。統傷寒中風而言也。傷寒詳見中篇

茲請先別中風之病。論云。太陽病發熱。汗出。惡風。脈浮。緩。或見鼻鳴。乾嘔者。為中風病。主以桂枝湯。服湯啜粥。

得熱熱微似汗則愈。若服桂枝湯。大汗出不解。所以然者。以風邪得微汗則除。得大汗反不除。病不去。則變浮緩之脈。而爲洪大。仍用桂枝湯。取微似汗則愈。倘若不愈。則病如瘧狀。日再發。邪淺欲散宜桂枝二麻黃一湯。撤其餘邪。則全愈矣。○前症是汗後餘邪未盡。以小劑爲緩汗法。此症是過經不解。不可不汗。故制此湯以急汗之。不可太汗。故制小劑。以小汗之人。知大劑急汗之法。而不知小劑亦有急汗之法也。○若太陽病得之八九日。頭痛項強。雖日久而未去。熱多寒少。往來如膏。而頭

本論云一日是邪淺而欲衰。面上反有熱色。身癢必得

少汗而全愈。宜桂枝麻黃各半湯主之。○桂枝症而兼

喘者。宜桂枝加厚朴杏仁湯主之。○若燒針針處核起

因驚而發奔豚者。宜炙其核。以桂枝加桂湯主之。○若

奔豚症欲作未作。其悸只在臍下者。宜茯苓桂枝甘草

大棗湯主之。○若悸在心下。又手冒心者。因發汗過多

所致。宜桂枝甘草湯主之。○若候汗遂漏不止。惡風小

便難。四肢拘急者。宜桂枝加附子湯主之。○若桂枝症

誤下之後。胸滿者。是陰邪盛于陽位。恐芍藥附和陰氣

宜桂枝去芍藥湯急散之。若兼惡寒者恐薑桂力微宜桂枝去芍藥加付子湯以溫散之。○若汗後陽虛陰氣凝聚身痛者以桂枝新加湯行其陽氣。○又有太陽傳入本腑症發熱六七日不解煩渴飲水水入即吐小便不利者宜五苓散表裏兩解之。又有太陽裏症而表邪具在下後心下滿小便不利者宜桂枝去桂加茯苓白朮湯。利水則表邪自化。此皆大陽症虛邪之方法也。

桂枝湯

發熱自汗是傷風。桂枝生姜芍棗逢。頭痛項強浮緩脈。

必須稀粥合成功

芍藥桂枝生薑

各三錢

炙草

三錢

大棗

四枚

水煎溫服

須臾啜稀粥。溫覆取微似汗。○此方最切於時用。中風

汗自出者用之。服麻黃湯復煩者用之。下後脈仍浮者

用之。氣冲利不止者用之。陰症厥浮爲欲愈亦用之。

桂草辛甘化陽。助太陽融會肌氣。芍草若甘養陰。啟少

陰奠安營血。薑活桂枝行陽。棗佐芍藥行陰。此方本不

發汗。藉熱粥之力。充胃氣以達於肺。合風邪從皮毛而

解。不傷氣血爲諸方之冠。

時醫以桂枝湯麻黃湯。地非北方。時非冬月。戒不敢用。以羌獨蒼芎荆防代之。而不知此等藥更燥烈害人。也。桂枝湯以桂枝為君。色赤。入心生血。得芍藥之苦以和之。為陰陽調和之劑。麻黃湯以麻黃為君。比物輕清走表。絕無辛烈之味。悍濁之氣。又佐之桂枝入心化液。杏仁入肺降氣。甘草安內攘外。不加薑之上行。棗之留中。逕走肌表。不傷津液。觀蒼芎羌獨之類。孰和平。孰峻烈耶。

桂枝二麻黃一湯

汗出不徹邪還襲如瘧頻來時翕翕桂枝湯二麻黃
表後脉洪藉此輯。

桂枝 一錢三分 芍藥 生薑 各一錢 炙草 七分 麻黃 七分 杏仁 十六箇

大棗 一枚 先煮麻黃去沫後入諸藥溫服○此是麻黃

症只用桂枝湯汗不徹之故故又作此湯再解其肌微

解其表此又桂枝後更用麻黃法也○按柯韻伯云麻

黃湯桂枝湯兩方各煎聽用如各半湯則各取其半而

合服之此湯則取桂枝湯二分麻黃湯一分合而服之

猶水陸之師各有節制兩軍相為表裏異道夾攻之義

身異真方次告

也。後人等其分兩合為一方。與葛根青龍輩何異。

桂枝麻黃各半湯

面熱身癢感雖輕。小汗輕施。顧衛營。麻杏桂薑芍棗草。

減之各半定方名。

桂枝 一錢二分。芍藥 生薑炙草麻黃 各八分。杏仁 七枚。

大棗 二枚半。先煎麻黃去沫。入諸藥煎溫服。此方原

小劑。治欲退之餘邪。活人借用之。以代解肌諸方。

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝厚朴杏仁湯。諸喘皆須。疎利方。誤下。後世。置月。此。

去邪下氣本相當

即桂枝湯加厚朴炙一錢五分杏仁十四枚○論云喘家作

桂枝湯加厚枚杏仁主之○言本然之喘也○又云太陽症

下之微喘者表未解也○此湯主之○言誤下之喘也○

桂枝加附子湯 照桂枝湯加附子 一錢

桂枝加桂湯 照桂枝湯加桂 三錢

太陽誤下遂拘急湯本桂枝加附入更有核起作奔豚

桂枝加桂湯宜察各遂漏症乃汗多脫液陽虛之候此方固陽即所以止汗止汗即所以救

液○此桂枝加附子湯歌也○又加桂枝者取味重則能

達下也。○此桂枝加桂湯歌也。

茯苓桂枝甘草大棗湯

欲作奔豚臍下悸。八錢茯苓桂枝四。二廿四棗水甘瀾。

直伐腎邪安內志。

茯苓 八錢。桂枝 四錢。甘草 二錢。大棗 四枚。取水揚三五

百遍。名甘瀾水。用甘瀾水三杯。先煮茯苓至二杯。入諸

藥煮七分。溫服。○此方安腎以鎮水。使水不凌心。補脾

以制水。使水不泛溢。

桂枝甘草湯

