

御纂醫宗金鑑卷五十九

編輯痘疹心法要訣

痘中雜證下

痘後癰毒

餘毒未盡痘毒生輕則瘡癰重爲癰內用解毒湯
俱可外敷紅玉膏有功

註凡痘後餘毒皆因滯漿之時毒氣太盛未得

盡化留藏於經絡聚而不散輕則發爲瘡癰
重卽成癰或在肌肉之虛處或發於關節搖



南京中医药大学图书馆版权所有

御纂醫宗金鑑卷五十九

編輯痘疹心法要訣目錄

痘中雜證下

痘後癰毒

解毒內托湯

紅玉膏

目

洗肝散

龍膽湯



唇

加味升麻葛根湯

黃連解毒湯

痘後牙疳

清毒涼血飲

人中白散

舌

加味犀角湯

咽喉



北京中醫藥大學
1964
北京中醫藥大學圖書館版權所有

加味甘桔湯

利咽解毒湯

牛黃散

夾疹

升麻葛根湯

夾癰

荆防敗毒散

黃連解毒湯

夾痧



後方集卷之三
荆防敗毒散

水痘

荆防敗毒散

加味導赤散

男婦年長出痘門

男子年長出痘

參麥清補湯

參歸鹿茸湯

鷄冠血酒



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1964

婦女出痘行經

涼血解毒湯

四物解毒湯

十全大補湯

孕婦出痘

如聖散

痘出遇產

十全大補湯

黑神散



產後出痘

十全大補湯

疹門

疹原

麻疹輕重

麻疹主治大法

麻疹未出證治

宣毒發表湯

麻疹見形證治



南京中醫藥大學圖書館版權所有

升麻葛根湯

三黃石膏湯

人參敗毒散

麻疹收沒證治

荆防解毒湯

胡荽酒

柴胡四物湯

身熱不退

化毒清表湯



柴胡清熱飲

煩渴

升麻葛根湯

白虎湯

竹葉石膏湯

譫妄

三黃石膏湯

黃連解毒湯

喘急



南京中醫藥大學圖書館版權所有

麻杏石甘湯

清氣化毒飲

欬嗽

升麻葛根湯

清金寧嗽湯

喉痛

元參升麻湯

涼膈消毒飲

失音



元參升麻湯

加減涼膈散

兒茶散

嘔吐

竹茹石膏湯

瀉泄

升麻葛根湯

黃連解毒湯

痢疾



清熱導滯湯

腹痛

加味平胃散

衄血

髮灰散

犀角地黄湯

瘙疹

蓋痘疹

加味消毒飲



癰疹

加減羌活散

加味消毒飲



御纂醫宗金鑑卷五十九

編輯痘疹心法要訣

痘中雜證下

痘後癰毒

餘毒未盡痘毒生輕則瘡癰重爲癰內用解毒湯
俱可外敷紅玉膏有功

註凡痘後餘毒皆因滯漿之時毒氣太盛未得

盡化留藏於經絡聚而不散輕則發爲瘡癰
重卽成癰或在肌肉之虛處或發於關節搖



南京中医药大学图书馆版权所有

動之際皆不論已潰未潰均以解毒內托湯

主之外用紅玉膏攤貼患處

解毒內托湯

生黃者

荆芥

防風

連翹

去心

當歸

赤芍藥

金銀花

甘草節

木通

水煎服



南京中醫藥大學
1954
南京中醫藥大學圖書館版權所有

方歌
解毒內托湯最靈黃耆荆芥共防風連翹當

歸赤芍藥銀花甘草與木通

紅玉膏

紫草 一兩

紅花 一兩

當歸 二兩

黃蠟 三兩

用香油半觔先將藥煤焦去渣後下黃蠟令
勻以冷爲度攤貼患處

目

目病之由風熱成痘毒火鬱上攻睛赤腫澁痛洗



肝散翳膜遮睛龍膽從

註

目病固多由風熱而起也夫痘蘊非常之

自裏達外氣血弱則不能逐毒外出火鬱

攻目斯病矣如赤腫疼痛癰澁流淚不能開

者以洗肝散主之翳膜遮睛隱澁羞明者加

味龍膽湯主之

洗肝散

羌活

歸尾

防風

山梔仁

