

壽世保元八



南京中医药大学图书馆版权所有

新刊醫林狀元壽世保元辛集八卷

太醫院吏目 金谿雲林龔廷賢子才編

同邑後學周亮登元龍校

小兒科

小兒形色論 論歌脉 症十五條

夫小兒半週兩歲為嬰兒三四歲為孩兒五六歲為小兒七八歲為齠齡九歲為童子十歲為稚子矣小兒半歲之間有病當於額前眉端髮際之間以名中食三指輕手滿額按之兒頭在左用右手在右用左手食指為上中指為中名指為下若三指俱熱主感受風邪鼻塞氣粗發熱咳嗽若三指俱冷主外感內傷發熱吐瀉若食中形察色假如肝之為病則面青心之為病則面胸膈氣滿乳食不消又要觀赤脾之為病則面黃肺之為病則面白腎之為病則面黑先要分別五臟形症次看稟受盈虧胎氣虛實明其標本而治之無不可者



額上屬心其色赤者為順黑者為逆若青黑主驚風腹痛癍啼哭微黃主盜汗頭髮乾燥驚疳骨熱

鼻屬脾其色黃者為順青者為逆若色赤主脾經虛熱飲食少思深黃主小便

閉而鼻燥衄血

額屬腎其色黑者為順黃者為逆若色赤主腎與膀胱有熱而小便不通

又

而赤心家熱

唇黃脾有積

眼黃脚有積

人中黑腹痛

唇紅面赤驚

驚風面頰紅

面白多成蕩

手指脉紋式

面黃脾有積

唇白肺虛寒

眼白肺有驚

風池紅多啼

臉青唇黑臍

渴來唇帶赤

傷寒色紫紅

面白肺家寒

唇燥脾有熱

鼻青主吐瀉

風池黃吐逆

唇青面白瘧

熱甚眼朦朧

而青肝有風

唇赤心家熱

眼青肝有驚

人中赤肺家

承漿黃吐驚

青色是驚風

山根紫傷驚

面黃如土癩

面黃多食積

夫小兒三歲已下有病須看男

至女右手虎口三關紋理兩手食指本節為風

關中節為氣關第三節為命

關其紋曲直不同如紋只在本節病易治透過

中節則病重過第三節則難

治驚則紋青淡紅則寒熱在表深紅必主傷寒

痘疹紋亂則病久紋細則腹

痛多啼乳食不消紋麗直射指甲必主驚風惡

候紋黑如墨必困重難醫此

乃神聖工巧之一端也

虎口三關脈紋圖

虎口又手處是也三關在第二

指久看三節

第一節風關第二節名氣關

第三節名命關

脈指歌

小兒食指辨三關男左女右一

虎口氣紋脈倒指看紋分五

食氣虛煩青黑之時症候逆

到風關粒米短長分兩端如

為逆順逆交連順已難又頭

股看皆知初氣中風候未是命門易亦難要知

色紅黃安樂五臟和紅紫依稀有損益紫青傷

怒然純黑在其間好手醫人心膽寒若也直上

踞衝射驚風至分作紋又有數股弓反裏順外

長短猶可救如此醫人仔細看初看掌心中有



執便知身體熱相從肚執脚冷傷積定脚執額熱是感風額冷脚執驚所得
瘡疹發來耳後紅孩子無事忽大叫不是驚風是天癩大叫氣促長聲驚
吃執毒悶心竅急須吐下却和脾若將驚藥真堪笑痢後努氣眉頭皺不努
不皺腸有風冷執不調分赤白脫肚因毒執相攻十二種痢何為惡禁口利
腸大不同孩兒有病不可下不執白汗兼自瀉神困顛陷四肢冷乾嘔氣虛
神怯怕吐蟲面白毛焦穗府氣潮執食不化鼻塞咳嗽及虛痰脉細腸鳴煩
燥訝方將有積與疎通下了之時必生詫孩兒實熱下無辜面赤睛紅氣壯
強脉大弦洪肚上熱肝腮喉痛尿如湯屎硬腹脹脇助滿四肢浮腫夜啼長
遍體生瘡肚隱痛下之必愈是為良

小兒脉理

小兒一歲變蒸已足方有脉自寸口而生子見小兒初生未滿月手掌高骨之
際亦有脉息吸吸而動脉者氣血之波瀾既生乃成人必有氣血焉得無脉
但不有大人察其端的之至意也

小兒脉歌

小兒有病須憑脈一指三關定息數遲冷數熱古今傳浮風沉積當先識左手人迎主外証右手氣口主內疾外候風寒暑濕侵內候乳食痰積攻其腹痛不休弦緊喉間作氣急緊促之時疹痘生緊數之際驚風至虛軟燥瘵瘵瘵緊貫風痲發搐搦軟而細者為疳蟲牢而實者因使閉脈耗大小便血虛濡有氣兼驚悸滑主露濕冷二至為脫三至卒五至為虛四至損六至平和曰無疾七至八至病猶輕九至十至病勢急十一二至死無疑此訣萬中無一失

小兒五臟主病脈歌

心脈

心脈浮數驚與熱

傷暑焦啼明白訣

弔腸疝氣及盤腸

壅結口瘡小腑澁

心脈沉遲臟腑寒

諸氣有冷痛難當

小便頻數腸中冷

下指端詳仔細看

肝脈

肝脈浮數定主風

目赤翳膜又主筋

流淚出血眼生糞

或痒或痛怕羞明
肝脉沉遲主有寒

面青唇白眼喜張

諸病傳人慢風候

良醫仔細要參詳

脉

脾脉浮數熱痰涎

能食胃惡脾臟堅

滯頤口瘡停壅結

唇紅臉赤胃中熱

脾脉沉遲主風吹

更加吐瀉慢脾傳

氣虛胃弱不能食

滯頤嘔惡醒脾丸

肺脉

肺脉浮數主便血

傷寒咳嗽遍身熱

氣急痰盛或瘡疹

瀉痢潮熱大腑滿

肺脉沉遲主虛寒

臟腑滑腸或洞泄

仍有咳嗽與痰涎

下根不定即無根

腎脉

腎脉浮數實有熱

偏墜膀胱痛又赤

口臭咬牙是腎驚

停身齒肉出鮮血

腎脉沉遲定有寒

臟腑停留人腎囊

偏墜膀胱尤不痛



光淨虛大最難當

小兒死症真訣

黑色如懸針眼下盧醫也須怕忽然腹痛

鼻青時不必更求醫青色運具極大

耳此候必知死黑色繞口及連目看看

定不足黑色眉間也不良十日必死

亡人中黑色入口來孩子人泉埋水腫

之病準頭里報君腎氣滅咳嗽切忌

白入眉肺絕要君知孩子吐時鼻色白

命斷難再得中風切忌面如粧焉能

得久長目焰無光兼直視必定三朝死

更有腫人不動時死候要君知目似

開如又不開也是死之媒口噤全然不

進乳此病終不起瀉下之物如湯血

孤兒不得活長吐不止止又吐休要勞

心顧痢久不食更啖人終與死為隣

瀉痢不歇歇又來指日下泉台小便艱

難又大瀉畢竟難得活大便用藥全

不通扁鵲也無功耳上主瘡黑斑出醫

人無此術久嗽四肢皆逆冷無由難

得醒體熱多應睡不醒休要費精神痘

疹出後熱不退此候應為害下糞青

黑不止時不覺見良醫久渴之後加燥

瀉命必難得活腹腫脹時氣又亂終

以命不甦



小兒死候形症

大衝無脉滿口枯涎身出黑汗舌縮
又瀉直視看人面黑狂燥驚叫咬
聲啼哭無淚兩眼半開四肢羸瘦
唇反舌縮用手撒人搖頭動項顛
者皆死已上並是死候難以醫療

上搶五心凸腫瀉出黑血川毒遍身瀉止
吐瀉不止魚口氣麤鼻乾黑燥忽作鴉
氣喘無烟肚大青筋四肢逆冷汗珠不流
作坑涎如牽鋸拘腰凸肚鼻內氣冷思
可順情

看兒眼法

小兒諸病但見兩眼無精光黑精無
不治或神藏於內外若昏困者無
眼者五臟六腑神氣之所發神氣
已脫脉雖僅存亦未能保

相兒命短長法

兒初生叫聲連延相屬者壽聲絕而
復揚急者不壽

啼聲散不成人

啼聲深不成人

臍中無血者好

臍小者不壽

通身軟弱

如無骨者不壽



魚白長大者壽

汗血者多死不壽

頭四破不成人

早坐早行早齒早語皆惡性非佳兒

髮稀少者強不聽人一作不聰

兒生枕骨不成者能言而死

掌骨不成者能匍匐而死

膕骨不成者能立而死

魚口者死

頭下破者死

陰囊下白者死

自開目者不成人

汗不流不成人

常搖手足者不成人

目視不正數動者大非佳兒

小便凝如脂膏不成人

頭毛不周匝者不成人

額上有旋毛者早貴妨父母

尻骨不成者能偃而死

躄骨不成者能行而死

身不收者死

股間無生肉者死

陰不起者死

卵縫通達黑者壽

急驚馬

急驚曰小兒脉促急為虛驚○

直指云浮數洪緊為急驚○沉遲緩為



慢驚○虎口脉紋青紫為驚風○紅者風熱輕○赤者風熱盛○青者驚風
○紫者驚熱○青紫相半驚積風熱俱有主急驚風○青而淡紫伸縮未
主慢驚風○紫絲青絲或黑絲隱隱相雜似出而不出主慢脾風○其勢
人夷者順○出外音逆

夫急驚風者因內有鬱熱外挾風邪心家受熱而積驚肝家主風而發執其木
制在金火盛則金受克金衰不能平木木能生火火得風則火焰起故子母
縱橫血亂氣併痰涎壅塞開竅不通風火蕃盛而不得泄暴烈而成急驚也
其症牙關緊急壯熱涎潮竄視反張搐搦攣動唇口眉眼眨引頻併六脉浮
散洪緊治先搐鼻通關痰涎壅盛以吐風散吐之次用敗毒散保命丹或雄
黃解毒丸下之驚退而神志未定投安神散但噴藥不下通關不噤眼睛耖
輔口中出血兩足擺跳肚腹搐動或神緩而摸床尋衣症篤而晨昏氣促心
中熱痛忽大叫聲者不治

噤驚散

半夏

牙皂

等分

為末用豆許吹入鼻中



○一論小兒急慢驚風發熱口噤不省人事手心伏熱痰涎咳嗽上壅喘急宜湧法

吐風散

全蝎 炒一箇 瓜蒂 炒十箇 赤小豆 三十箇

右為末 每一歲兒服一字 溫米飲調下 未吐再服

○一論小兒急驚風初起發熱手足搐搦眼上視等症并一切感冒風寒頭疼發熱咳嗽鼻塞聲重及豆疹欲搐發搐并時行瘟疫等症宜加味收毒散

羌活 獨活 前胡

枳殼 去穢 炒 桔梗

天麻

紫胡 白茯苓 人參

姜蚕 白附子

地骨皮 川芎 甘草

右作一劑生薑三片水煎服

○一論小兒急驚搐搦眼番口噤林宗師頭天吊痰嗽喘熱服

南極壽星湯



膽星

防風

白附子

蟬退

薄荷

甘草

右剉水煎服

○小兒潮熱驚啼

木通

車前

赤茯苓

麥門冬

蟬退

防風

白芍

甘草

燈草

水煎服

○小兒驚風咳嗽痰喘

天南星

一固大者炮去裂為末每服一小生薑三片水煎溫服

○一論小兒胎驚內疝肚腹堅硬目睛上視手足搐搦角弓反張痰嗽喘熱

切急慢驚風並皆治之

至聖保命用

南星

炮去皮用白礬水浸一宿再出酒

半夏

同上製青黛

薄荷

各一兩全蝎去尾尖

天麻

白附子

各炒姜蚕姜法炒

防風

鬱金

甘草

各五小

麝香

少許

硃砂為末五小

右為細末煉蜜為丸硃砂為衣芡實大每服一九燈心薄荷湯化下



○一論小兒痰喘急慢驚風至死但能開口嚥下無不活者用千金散
內閣秘傳

全蝎炙熟 直姜各三分 硃砂四分 牛黃六厘 冰片

天麻 黃連各四分 膽星 甘草各二分

右為末每服五七釐薄荷燈心金銀煎湯不拘時調下

○一論驚風退後恍惚虛怯安神定志調理之劑

安神散

人參 茯苓去皮 遠志去心 天麻 白附子

麥門冬 全蝎 蓮肉 茯神去皮木 硃砂各等分

右為細末每服燈心湯調下

○一小兒沉困發熱驚搐不乳視其脉紋如亂魚骨此風熱急驚之症也先用

抱龍丸少許祛風化痰後用六君子湯加柴胡壯脾平肝遂熱退而驚定總

○一小兒瘈瘲啼叫額間青黑此驚風肝木乘脾腹中作痛也先用六君子湯

加木香柴胡鈞藤鈞啼叫漸緩更加當歸又二劑而安



○一小兒目內色青發搐目上視叫哭不已或用牛黃清心丸不愈後咳身顫
悶小便自遺此肝經血氣虛甚故耳余用補中益氣湯及六味地黃丸而痊

慢驚

天慢驚風者因外感風寒內傷乳食而作吐瀉或得大病之餘或誤吐下之過
脾胃而虛脾與肺時子也時虛亦令子虛而生粘痰胃虛則能生風風能動
能開故其症目偏喜開痰帶因矣和至金天口鼻身之肩纏面黃涎流口角
將復瘳瘳是也治宜怯風活痰健脾生胃不可妄用腦麝色粉等藥其有眼
閉四肢厥冷者名曰慢脾風極危篤速用回陽之藥手足漸溫復以醒脾散
理之其服藥不効太衝脈尚有者灸百會穴但而黯神慘魚口鴉聲脾痛脇
動身冷粘汗頭搖髮直睛定口瘡喘噎夫臥唇縮氣籠者不治
加味和中散 治小兒慢驚風

人參

白朮去焙各 白茯苓去皮

陳皮各五分 半夏七分

全蝎炒五分 天麻七分

細辛三分

薄荷三分

甘草各二分



右劉一劑生薑藥煎服乳母亦宜服之

○一論小兒吐瀉不止作慢驚風脾困昏沉默默不食宜醒脾散

人參

白朮去苳

白茯苓去皮木香

全蝎

姜蚕

白附子

天麻

甘草

○一方去天麻姜蚕加泡南星半夏麩陳倉米二百粒水煎熟旋服之

○右劉生姜三片棗一枚水煎服

○一論慢驚乃元氣虛損而至昏惰急須早治之見而後治之見元氣脫散而不救矣此乃臟腑傳受已極總歸虛處惟脾受之無風可逐無驚可療此因脾虛不能攝涎而作痰也此方專治慢驚涎潮發搐或吐或瀉不思飲食神昏氣弱宜用

紫金錠子

人參

白朮去苳

白茯苓去皮白茯苓神去皮山藥炒

乳香

赤石脂醋炒辰砂各二小麝香一

