

參附湯 補三八

五味子湯 補五八

十全大補湯 補二十  
虛喘

蜜酥煎 補六六

百合湯 和一二五  
浮腫作喘

人參胡桃湯 補六十  
喘不得卧

蘇子煎 和一二一  
渴肺喘

定喘湯 和一二三  
風寒喘

人參定喘湯 和一二三四  
寒邪欬喘

黃瓜萎丸 和百十八  
痰喘

神秘湯 和一二三八  
水氣喘

蘇陳九寶湯 散入五  
哮喘

瀉白散 寒四二  
肺火

雙玉散 寒七一  
火喘

安眠散 固七  
喘不止

葶藶大棗瀉肺湯 和百四十  
浮腫喘

# 呃逆

## 經義

曰問篇帝曰人之噦者何氣使然岐伯曰穀入於胃胃氣上注於肺今有故寒氣與新穀氣俱還入於胃新故相亂真邪相攻氣并相逆復出於胃故爲噦○肺主爲噦取手大陰足少陰

宣明五氣篇曰胃爲氣逆爲噦爲恐

雜病篇曰噦以草刺鼻噦噦而已無息而疾迎引之立已大驚

之亦可已

至真要大論曰陽明之復嘔吐欬噦○大陽之復唾出清水及爲噦噫○諸逆衝上皆屬於火

保命全形論曰病深者其聲噦

邪氣臟腑病形篇曰心脉小甚爲善噦

三部九候論曰若有七診之病其脉候亦敗者死矣必發噦噫

論證 共三條

呃逆一證古無是名其在內經本謂之噦因其呃呃連聲故今以呃逆名之於義亦妥觀內經治噦之法以草刺鼻噦及氣

息迎引大驚之類是皆治呃之法此噦本呃逆無待辨也自孫真人云遍尋方論無此名遂以欬逆爲噦因致後世訛傳乃以欬逆乾嘔噫氣之類互相殽亂自唐迄今矣此名之不可不察亦不可不正也

一欬逆之名原出內經本以欬嗽氣逆者爲言如氣交變大論曰歲金太過甚則喘欬逆氣此因喘欬以致氣逆故云欬逆氣也又曰欬逆甚而血溢正以欬逆不止而血隨氣溢則病之常也未聞以呃逆而見血者也卽如六元正紀大論云金鬱之發民病欬逆者亦是此意此欬逆之非呃逆亦甚明矣

而今後世諸公乃悉以噦爲欬逆豈皆未之詳察耶及觀丹  
溪之言在纂要則曰孫真人誤以噦爲欬逆是謂噦非欬逆  
也在心法附錄則曰欬逆爲病古謂之噦近謂之呃此又謂  
噦卽欬逆也在嘔吐門則又曰有聲有物謂之嘔吐有聲無  
物謂之噦此又以乾嘔爲噦也前後不一何其自謬若此再  
如海藏河間諸公有以噦爲乾嘔者有以欬逆爲噦者總皆  
謬矣蓋嘔卽吐之類但吐而無物者曰嘔嘔而有物者曰吐  
腹脹噯氣者曰噦逆氣自下而上者亦曰噦此四者之辨自  
有正名顧可紛紛若是乎茲余析而判之曰噦者呃逆也非

欬逆也欬逆者欬嗽之甚者也非呃逆也乾嘔者無物之吐  
卽嘔也非噦也噦者飽食之息卽噯氣也非欬逆也後人但  
以此爲鑑則異說之疑可盡釋矣

一呃逆證有傷寒之呃逆有雜證之呃逆其在古人則悉以虛  
寒爲言惟丹溪引內經之言曰諸逆衝上皆屬於火病人見  
此似爲死證然亦有實者不可不知余向見此說疑其與古  
人相左不以爲然蓋亦謂此證必屬虛寒何有實熱茲及晚  
年歷驗始有定見乃知丹溪此言爲不誣也雖其中寒熱虛  
實亦有不同然致呃之由總由氣逆氣逆於下則直衝於上

無氣則無呃無陽亦無呃此病呃之源所以必由氣也欲得  
其象不見雨中之雷水中之淳乎夫陽爲陰蔽所以爲雷而  
轟轟不已者此火爲雷之本而火卽氣也氣爲水覆所以爲  
淳而汨汨不已者此爲氣淳之本而氣卽陽也然病在氣分  
本非一端而呃之大要亦惟三者而已則一曰寒呃二曰熱  
呃三曰虎脫之呃寒呃可溫可散寒去則氣自舒也熱呃可  
降可清火靜而氣自平也惟虛脫之呃則誠危殆之證其或  
免者亦萬幸矣凡諸治法當辨如左

論治 其九條

凡雜證之呃雖由氣逆然有兼寒者有兼熱者有因食滯而逆者有因氣滯而逆者有因中氣虛而逆者有因陰氣竭而逆者但察其因而治其氣自無不愈若輕易之呃或偶然之呃氣順則已本不必治惟屢呃爲患及呃之甚者必其氣有大逆或脾腎元氣大有虧竭而然然實呃不難治而惟元氣敗竭者乃最危之候也

一寒滯爲呃者或以風寒或以生冷或其臟氣本寒偶有所逆皆能致呃但去其蔽抑之寒而呃自止宜橘皮湯三因丁香散或二陳湯加生薑五七片或佐關煎或甘草乾薑湯橘皮

乾薑湯之類皆可酌用○若寒之甚者漿水散或四逆湯  
一胃火爲呃者其證極多但察其脉見滑實而形氣不虛胸膈  
有滯或大便堅實或不行者皆其胃中有火所以上衝爲呃  
但降其火其呃自止惟安胃飲爲最妙余嘗治愈多人皆此  
證也

一氣逆爲噦而兼脹悶者宜加減二陳湯加烏藥或寶鑑丁香  
柿蒂散或羌活附子湯或神香散

一食滯而呃者宜加減二陳加山查白芥子烏藥之屬或用大  
和中飲加乾薑木香

一中焦脾胃虛寒氣逆爲呃者宜理中加丁香湯或溫胃飲加丁香○若因勞倦內傷而致呃逆者宜補中益氣湯加丁香○凡中焦寒甚者多由脾胃氣虛而然蓋脾胃不虛則寒亦不甚故治寒者當以脾氣爲主○若吐利後胃氣微虛或兼膈熱而呃者宜橘皮竹茹湯無熱者宜生薑半夏丁香柿蒂白朮肉桂之類皆可酌用

一下焦虛寒者其肝腎生氣之原不能暢達故凡虛弱之人多見呃逆正以元陽無力易爲抑遏而然此呃逆之本多在腎中故余製歸氣飲主之甚效或用理陰煎加丁香以踈氣妙

亦如之

一凡以大病之後或以虛羸之極或以虛損誤攻而致呃逆者此最危之證察其中虛速宜補脾察其陰虛速宜補腎如前二條固其法矣然猶恐不及則惟大補元煎及右歸飲之類斯其庶幾者也

一呃逆證凡聲強氣盛而脉見滑實者多宜清降若聲小息微而脉見微弱者多宜溫補

傷寒呃逆

其六條

凡傷寒之呃亦無非氣逆之病其有與雜證不同者如仲景所

言則其類也然猶有未悉及治有未備者謹略如左

一傷寒胃中虛冷等證大約與前雜證相似悉宜如前以溫中等劑治之○或如仲景所言胃中虛冷及飲水則噦等證當以後條仲景法治之

一傷寒邪在表者與裏無涉故無噦證惟少陽證邪在半表半裏之間則寒熱往來氣爲邪抑而噦逆者有之矣宜柴陳煎主之有寒者加丁香有火者加黃芩或小柴胡湯亦可

一傷寒失下邪入正陽明內熱之極三焦乾格陰道不行而上衝作呃者必宜去火去閉斯逆氣得降而噦乃可愈然必察

邪之微甚如無堅實脹滿等證而但以乾涸燥熱者宜白虎湯或竹葉石膏湯或瀉心湯涼解之○若果有燥糞大便閉結脹滿堅俱全者宜三承氣湯下之

一傷寒邪有未解而用溫補太過者則其中焦氣逆最能爲噦惟安胃飲爲最妙○若氣逆無火者宜橘皮湯○若兼表邪未解者宜柴陳煎

一傷寒誤攻或吐或下或誤用寒涼以致脾腎胃氣大虛大寒而發噦者大爲危候速當以前雜證溫胃理陰等法調治之恐遲則無濟於事也

述古 其三條

仲景曰陽明病不能食攻其熱必噦所以然者胃中虛冷故也  
以其人本虛故攻其熱必噦○傷寒大吐大下之極虛復極  
汗出者以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以  
然者胃中虛冷故也○陽明病不大便六七日恐有燥屎欲  
知之法少與小承氣湯湯入腹中轉失氣者此有燥屎乃可  
攻之若不轉失氣者此但初頭鞭後必澹不可攻之攻之必  
脹滿不能食也欲飲水者與水則噦○若胃中虛冷不能食  
者飲水則噦○按以上四條皆言胃之虛寒也虛寒者既不

可攻亦不可與水煎寒涼之藥亦當忌用可知

○論曰傷寒噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈○  
按此一條卽言噦之實邪也蓋便有不利則氣有不達下不  
達則上逆而出故小便不利者當利其水大便不通者當通  
其便

要畧曰病人胸中似喘不喘似嘔不嘔似噦不噦徹心中憤憤  
然無奈者生薑半夏湯主之○乾嘔噦手足厥者橘皮湯主  
之○噦逆者橘皮竹茹湯主之

張子和吐式篇云凡病在上者皆宜吐然自胸以上大滿大實

痰如膠漆微湯微散皆兒戲耳若非吐法病安能除曾見病之在上者諸醫用藥盡其技而不效余以涌劑少少用之輒獲微效可見吐法必可用於上宜乎其效之速也○按此吐法亦可治噦者以其氣得伸而鬱得散也故凡氣實而鬱者在子和之法亦所宜用

易簡方

一方治呃逆久不愈連連四五十聲者用生薑搗汁一合加蜜一匙溫熱服

一齏法 治呃逆服藥不效者用硫黃乳香等分以酒煎令患

人以鼻齁之效○一方用雄黃一味煎酒齁

灸法

兩乳穴 治呃逆立止取穴法婦人以乳頭垂下到處是穴男  
子不可垂者以乳頭下一指爲率與乳頭相直骨間陷中是  
穴男左女右灸一處艾炷如小麥大着火卽止灸三壯不止  
者不可治

膈中

中脘

氣海

三里

呃逆論列方

三陳湯 和一

橘皮湯 熱五七