

加批詳評景岳全書

卷六十四

春集外科鈴古方

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
吾吳江家楨忍庵訂

外科

仙方活命飲一

治一切瘡瘍。未成膿者內消。已成膿者即潰。此止痛消毒之聖藥也。

穿山甲

蛤粉炒黃白芷

防風

天花粉

赤芍藥

歸尾

乳香

沒藥

貝母

皂刺

甘草

草錢各二

金銀花

陳皮

各三錢

酒一碗

煎數沸

溫服

托裏消毒散二

治瘡疽元氣虛弱。或行攻伐不能潰散。服之未成即消。已成即潰。腐肉即去。新肉即生。若腐肉既潰。而新肉不能收斂。屬氣虛者。四君子湯為主。屬血虛者。四物湯為主。氣血俱虛者。十全大補湯為主。并忌寒涼消毒之劑。

人參隨症增減黃耆鹽水拌炒當歸川芎芍藥炒白朮炒茯苓各一錢金銀花白芷各七分甘草

連翹各五分

右水煎服

○陳氏托裏消毒散內多陳皮。方在痘瘡。

祕方托裏散三

治一切瘡毒。終始常服。不致內陷。

瓜蒌

大者一個

當歸

酒拌

黃耆

鹽水炒

白芍藥

甘草

各一兩半

熟地

天花粉

金銀花

皂刺

一兩

右每用藥五兩。以無灰酒五茶鍾入磁器內。厚紙封口。再用油紙重封。置湯鍋內。蓋煮。





中國藥物新字典

△醫家必備之新本草

△途徑別開之新字源

△欲知藥物性質者...不可不看

△欲知藥物功用者...不可不看

△欲知藥物名稱者...不可不看

△欲知藥物種類者...不可不看

是編為吳縣江忍庵先生所輯。采錄古今名人本草匯合而成。依據字典按部列入。分為十二集。合訂一巨冊。計有四百四十八頁。其中所載藥物。約得六千數百餘種。搜羅宏富。鉅細靡遺。足與綱目相頡頏。並且每一字下。詳以音註。而於性質功用二者。倍加注重。不獨使醫家用備參攷。毋煩檢査之勞。即粗知文字者。亦不難翻閱而得。藉資研究。誠不愧為空前絕後之善本也。

△精裝一厚冊...定價洋二元

中華民國二十四年七月五版

版權所有
翻印必究

加詳批
景岳全書

(全書念四冊●布匣兩通)

●定價大洋四元五角

原著者 會稽張介賓

批評者 長洲葉天士

校訂者 古吳江家楨

出版者 廣益書局

印刷者 廣益書局

總發行所 廣益書局
上海棋盤街中

北平楊梅竹斜街南昌中山馬路

廣州永漢北路長沙南陽街 廣益書局

漢口統一街開封書店街

南京中醫藥大學圖書館版權所有

加批詳評景岳全書

卷六十四

春集外科鈴古方

會稽張介賓會卿著

長洲葉桂天士評
吾吳江家楨忍庵訂

外科

仙方活命飲一 治一切瘡瘍未成膿者內消已成膿者即潰此止痛消毒之聖藥也

穿山甲蛤粉炒黃白芷 防風 天花粉 赤芍藥 歸尾 乳香 沒藥 貝母 皂刺

草各二錢 金銀花 陳皮各三錢 酒一碗煎數沸溫服

托裏消毒散二 治瘡疽元氣虛弱或行攻伐不能潰散服之未成即消已成即潰腐肉即去

新肉即生若腐肉既潰而新肉不能收斂屬氣虛者四君子湯為主屬血虛者四物湯為主氣血俱虛者十全大補湯為主并忌寒涼消毒之劑

人參隨症增減 黃耆鹽水拌炒 當歸 川芎 芍藥炒 白朮炒 茯苓各一錢 金銀花 白芷各七分 甘草

連翹各五分 右水煎服○陳氏托裏消毒散內多陳皮方在痘瘡

祕方托裏散三 治一切瘡毒終始常服不致內陷

瓜蒌大者一個 當歸酒拌 黃耆鹽水炒 白芍藥 甘草各一兩半 熟地 天花粉 金銀花 皂刺各炒

一兩 右每用藥五兩以無灰酒五茶鍾入磁器內厚紙封口再用油紙重封置湯鍋內蓋煮

至藥香取出。分服。直至瘡愈。○立齋曰。此方藥品平易。消毒之功甚大。且不動臟腑。不傷血氣。不問陰陽腫潰。屢用屢效。真仙方也。常治發背。腦疽。勢盛者。更用隔蒜灸之。若脈沉實。大小便秘者。先用疎通。而後用此。功甚捷。若火毒已退。不作膿。或不潰者。更宜托裏。潰而不斂。及膿清者。用峻補。

神功托裏散四 一名金銀花散。○治癰疽發背。腸癰乳癰。及一切腫毒。或喉痛。憎寒壯熱。

金銀花 黃耆 當歸 甘草等分 右用酒水各一鍾。煎至一鍾。分病上下。食前食後服。

之少頃再服一劑。浮數患處。不問老少虛實皆可服。若為未酒調服尤妙。

參耆托裏散五 治瘡瘍氣血俱虛。不能起發。或腐潰不能收斂。及惡寒熱者。

人參氣虛者用之 黃耆炒 白朮炒 當歸 熟地 芍藥酒炒 茯苓 陳皮各一 右

水煎服。

參耆內托散六 方在痘疹七。治癰疽膿毒不化。及潰後作痛。

托裏養營湯七 治療應流注。及一切癰疽不足之症。不作膿。或不潰。或潰後發熱。或惡寒。

肌肉消瘦。飲食不思。睡卧不寧。盜汗不止。

人參 黃耆炙 當歸酒拌 川芎 芍藥炒 白朮炒各錢 熟地二錢 五味子炒研 麥冬 甘草各

分水二鍾。薑三片。棗一枚。煎七分。食遠服。



托裏黃耆湯八 治癰疽氣虛作渴甚效

黃耆蜜炒六錢 甘草各一錢 天花粉各一錢 水二鍾煎八分頻服之。○加人參一錢亦可。○若氣血俱

虛膿血大泄而作渴或兼發熱者宜用托裏養營湯。

內補黃耆湯九 治癰毒內虛不起化及潰後諸虛迭見

黃耆炙 麥冬各一兩 人參各一兩 熟地 茯苓 甘草各七分 白芍藥 當歸 川芎 遠志 官桂

各五分 右每服一兩薑棗水煎服。

托裏當歸湯十 治潰瘍氣血俱虛或晡熱內熱寒熱往來或婦人諸瘡經候不調小便頻數

大便不實等症但瘡瘍氣血虛而發熱者皆宜服之。久服亦收斂瘡口。

人參 黃耆 當歸 熟地 川芎 芍藥各一錢 柴胡 甘草各五分 右水煎服

托裏健中湯十一 治瘡瘍元氣素虛或因涼藥傷胃飲食少思或作嘔瀉等症

人參 白朮 茯苓各二錢 半夏 炮薑各一錢 黃耆半錢 炙甘草五分 肉桂三分 右薑棗水

煎溫服。

托裏溫中湯十二 治瘡瘍膿潰元氣虛寒或因尅伐胃氣脫陷腸鳴腹痛大便溏泄神思昏

潰此寒變內陷緩則不治。

附子炮去皮臍二錢 乾薑炒三錢 益志 丁香 羌活 沉香 木香 茴香 陳皮各一錢 炙甘草二錢

右薑水煎服。



托裏益中湯十三 治中氣虛弱。飲食少思。或瘡不消散。或潰而不斂。

人參 白朮 茯苓 炮薑 陳皮 半夏錢各一 木香 炙甘草分各五

右薑棗水煎服

托裏溫經湯十四 治瘡瘍寒熱。皮毛鬱遏。經絡不得伸越。熱伏營中。聚結赤腫作痛。惡寒發

熱。或痛引肢體。若頭面腫痛。煖甚。仍宜砭之。

麻黃 升麻 防風 乾葛 白芷 人參 當歸 芍藥 甘草 蒼朮錢各

右水煎服

鍾煎一鍾服。卧煖處得汗乃散。或加柴胡。

托裏益黃湯十五 治脾土虛寒。水反侮土。以致飲食少思。或嘔吐泄瀉等症。

人參 白朮 茯苓 陳皮 半夏錢各一 炮薑 丁香 炙甘草分各五

右薑棗水煎服

托裏清中湯十六 治脾胃虛弱。痰氣不清。飲食少思等症。

人參 白朮 茯苓 陳皮錢各一 半夏八分 桔梗七分 甘草五分

右薑棗水煎服

托裏益清湯十七 治肝木侮脾。脾土虛弱。以致飲食少思。或胸膈不利等症。

人參 白朮 半夏 茯苓 陳皮錢各一 芍藥 柴胡 甘草分各五

右薑棗水煎服

托裏營衛湯十八 治瘡瘍外無煖腫。內便調和。乃邪在經絡也。宜用此藥。

人參 黃耆 當歸 甘草炙 紅花 柴胡 連翹 蒼朮米泔浸炒 羌活 防風 黃芩錢各一

桂枝七分 右酒水煎服

托裏越鞠湯十九 治六鬱所傷。脾胃虛弱。飲食少思等症。



人參 白朮錢各二 陳皮 半夏錢各一 山梔 川芎 香附 蒼朮錢各七 炙甘草錢五 右薑棗水煎服。

定痛托裏散二十 治瘡瘍血虛疼痛之聖藥也。

粟穀去蒂炒 當歸酒拌 白芍藥炒 川芎錢各一 乳香 沒藥 肉桂錢各一

內托後煎散二一 治瘡瘍焮腫在外其脈多浮邪勝必侵於內宜用此托之。

人參 白朮炒 當歸 黃耆鹽水炒 芍藥炒 茯苓 甘草炙 地骨皮 肉桂 防己酒炒 黃芩

錢各一 防風錢二 右先以蒼朮一升水五升煎去朮入藥再煎至二升終日飲之。

內托羌活湯二二 治臂癰堅硬腫痛兩尺脈緊無力。

羌活 黃柏錢各一 防風 當歸尾 藁本 肉桂錢各一 連翹 蒼朮米泔浸炒 陳皮錢各五 黃耆鹽水

錢半 右水酒各一鍾煎八分食前服。

內寒散二三 治陰虛陽邪湊襲患腫或潰而不散或風寒襲於患處血氣不能運行久不能

愈遂成漏證。

附子童便浸泡 肉桂皮去 赤小豆 炙甘草 黃耆鹽水炒 當歸酒拌 茯苓 白芷 桔梗炒 川芎 人參 遠志去

厚朴製各一兩 防風錢四 右為末每服二錢空心溫酒下或酒糊丸鹽湯下或煉蜜為丸亦可。

沖和湯二四 治瘡屬半陰半陽似潰非潰似腫非腫此因元氣虛弱失於補托所致。

人參 陳皮錢各二 黃耆 白朮 當歸 白芷錢各一 茯苓 川芎 皂角刺炒 乳香 沒藥

金銀花 甘草節各一 右水酒各半煎服。

神效酒前散 二五 治一切瘡瘍能托毒散毒其效如神

人參 沒藥 研另當歸尾各一甘草錢三括萸一個半

末酒糊丸桐子大每服五十九用酒下善消毒活血

人參黃耆湯 二六 治潰瘍飲食少思無睡發熱

人參 白朮 蒼朮 參冬 陳皮 當歸 升麻 各五錢黃耆一錢黃柏炒四分

黃耆人參湯 二七 治潰瘍虛熱無睡少食或穢氣所觸作痛

黃耆 鹽水炒 人參 白朮 蒼朮 沒藥 當歸 酒非 麥門冬 五味子 炒敲各一錢 甘草 炙升用

神麴 炒陳皮 各五分 黃柏 酒炒 水二鍾薑三片棗一枚煎服

黃耆建中湯 二八 內托癰疽諸毒

黃耆 蜜炙 肉桂 各三兩 甘草 炙二兩 白芍藥 六兩 右每服一兩薑棗水煎服

參朮補脾湯 二九 治肺疽脾氣虧損久咳吐膿或中滿不食必服此藥補脾土以生肺金否

則不治

人參 白朮 各二錢 黃耆 半錢 茯苓 當歸 陳皮 各一錢 麥冬 七分 北五味 四分 桔梗 六分 炙

甘草 五分 右薑棗水煎服

參耆補肺湯 三十 治肺證咳嗽短氣或腎水不足虛火上炎痰涎壅盛或吐膿血發熱作渴

小便短澀

人參 黃耆 白朮 當歸 陳皮 茯苓 各一錢 山藥 山茱萸 各二錢 五味子 炙甘草 各五錢

熟地黃 一錢 麥門冬 牡丹皮 各八分 右薑棗水煎服

益氣養營湯 三一 治懷抱抑鬱或氣血損傷四肢頸項等處患腫不問軟硬赤白腫痛或日

晡發熱或潰而不斂

人參 黃耆 炒鹽水 當歸 川芎 熟地 芍藥 炒貝母 香附 陳皮 茯苓 各一錢 白朮 各一錢

柴胡 分甘草 桔梗 各五 右薑水煎服 〇口乾加五味子麥門冬往來寒熱加軟柴胡地

骨皮腹清加人參黃耆腹多加川芎當歸腹不止加人參黃耆當歸肌肉遲生加白薇官桂

補陰八珍湯 三二 治瘰癧等瘡足三陰虛者

人參 白朮 茯苓 甘草 當歸 川芎 熟地 芍藥 黃柏 炒知母 酒炒各七分 右水煎服

參朮薑附湯 三三 治瘡瘍真陽虧損或誤行汗下或膿血出多失於補托以致上氣喘急

自汗盜汗氣短頭暈泄瀉 人參 附子 各一兩 乾薑 白朮 各五錢 右作二劑水煎服

附子理中湯 三四 治瘡瘍脾胃虛寒或誤用攻伐手足厥冷飲食不入或腸鳴腹痛嘔逆吐瀉

附子 人參 白茯苓 白芍藥 各三錢 白朮 四錢 右水煎服

大物附子湯 三五 治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利或手足浮腫

附子 製防己 桂枝 各四錢 炙甘草 二錢 白朮 茯苓 各三錢 右作二劑水一鍾半薑三片煎一

鍾食遠服

附子八物湯三六 治瘡瘍陽氣脫陷。嘔吐畏寒。泄瀉厥逆。

附子炮乾薑 炮芍藥炒 人參 炙甘草 茯苓 肉桂各一錢 白朮二錢 右水煎食遠溫服。

四物湯三七 治脾腎虛寒。瘡屬純陰。或藥損元氣。不腫痛。不腐潰。或腹痛泄瀉。嘔吐厥逆。

陽氣脫陷等症。

人參 白朮 黃耆各三錢 乾薑炮 附子炮 甘草 陳皮 當歸各二錢 柴胡 升麻各五錢 右水煎服。如不應。倍加薑附。

水煎服。如不應。倍加薑附。

氏薛加減八味丸三八 治瘡瘍痊後。及將痊口乾渴甚。或舌上生黃。或未患先渴。此皆腎水枯。

渴。不能上潤。以致心火上炎。水火不能相濟。故煩躁作渴。小便頻數。或白濁陰痿。飲食不多。

肌膚漸消。或腿腫脚先瘦。服此以降心火。滋腎水。則諸症頓止。及治口舌生瘡不絕。

熟地八兩酒 山茱萸酒浸 山藥各四兩 澤瀉 蒸焙 白茯苓 牡丹皮各三兩 桂心一兩 北五味四兩 右為細末。入二膏。加煉蜜少許。丸桐子大。每服六七十丸。五更初言語前。或空心用鹽湯送下。此即陳氏加減八味丸也。○方在補陣一二三。

加味地黃丸三九 治肝腎陰虛瘡毒。或耳內癢痛出水。或眼昏痰氣喘咳。或作渴發熱。小便赤澀等症。

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味各為末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味各為末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味各為末 右將地黃

熟地 山藥 山茱萸 白茯苓 澤瀉 牡丹皮 柴胡 北五味各為末 右將地黃



搗碎。酒拌濕蒸爛。杵膏入諸藥和勻。加煉蜜為丸。桐子大。每服百丸。空心白湯送下。如不應

用加減八味丸。

當歸川芎散 四十

治手足少陽經血虛瘡證。或風熱耳內癢痛。生瘡出水。或頭目不清。寒熱

少食。或婦女經水不調。胸膈不利。脇腹痞痛。

當歸

川芎

柴胡

白朮

芍藥

山梔

牡丹皮

茯苓

甘草

蔓荊子

各五

分

右水煎服。

加味敗毒散 四一

治足二陽經熱毒流於脚根。焮赤腫痛。寒熱如瘧。自汗短氣。大小便不利。

或無汗惡寒。表裡邪實者宜之。

羌活

獨活

前胡

柴胡

桔梗

人參

茯苓

枳殼

甘草

川芎

大黃

蒼朮

各一

水二鍾。薑三片。煎服。

九味羌活湯 四二

方在散陣四四。

治瘡瘍風熱鬱遏。焮腫作痛。或遍身作痛。或拘急不利。

及頭痛惡寒。脊強。脈浮緊。

加味羌活湯 四三

即前湯加金銀花、連翹。用解毒。

白芷胃風湯 四四

治手足陽明經氣虛風熱。面目麻木。或牙關緊急。眼目睜動。

白芷

升麻

各二

葛根

蒼朮

各八分

炙甘草

當歸

各一

草豆蔻

黃柏

炒

柴胡

藁本

羌活

麻黃

去節

各

蔓荊子

各三

右水煎服。

各

右水煎服。

各

右水煎服。

各

右水煎服。

葛根牛蒡湯 四五

治時毒腫痛而便利調和者

葛根 管仲

甘草 豆豉 牛蒡子半炒半生 各二錢

右水煎服

犀角地黄湯 四六

治胃火血熱妄行吐衄或大便下血

犀角鎔為末 生地

牡丹皮 芍藥各一錢半 黃芩炒 升麻各一錢

右水煎熟入犀角末服

犀角升麻湯 四七

治時毒或風熱頭面腫痛或咽喉不利或醫疽非腮等症

犀角鎔 升麻

防風 羌活各錢半

白芷 白附子 黃芩各一錢

甘草六分 右水煎熟入犀角末服

玄參升麻湯 四八

治心脾壅熱舌上生瘡或木舌重舌或連頰兩邊腫痛或咽痛發斑并治

玄參 升麻

赤芍藥 犀角鎔末

桔梗 炒管仲 黃芩各一錢 甘草五分

水二鍾煎服

入犀角末食後服

升麻黃連湯 四九

治胃經熱毒腮腫作或發寒熱

升麻 川芎

當歸各一錢半 連翹

黃連 牛蒡子

白芷各一錢

右水煎服○若腫連太陽

加羌活連耳後加山梔柴胡

秘傳連翹湯 五十

治癰疽時毒腫痛焮腫

連翹 升麻

朴硝各一兩

玄參 芍藥 白薇 防風

射干各三錢

大黃一兩二錢 甘草五錢 杏仁

八十個去皮共

右每服五錢水煎服下惡物後服內托之類

五香連翹湯 五一

治腦疽癰疽時毒邪氣鬱滯不行者



中國醫藥大學圖書館藏

乳香 木香 沉香 丁香 香附 黃耆 射干 連翹 升麻 木通 獨活 桑寄

生甘草各一錢

右水煎服。

復元通氣散五二

治乳癰便毒腫痛。及一切氣滯腫毒。或打撲損傷。閃跌作痛。及疝氣尤效。

木香 舶上茴香炒青皮 陳皮 白芷 甘草 貝母去心 川山甲炙 漏蘆等分

有玄胡索 白牽牛炒用。無白芷 漏蘆。右為末。每服二三錢。溫酒調下。

當歸散五三

通經絡。行血滯。

當歸

川山甲炙炒 蒲黃炒各半兩 辰砂一錢 麝香少許

右為末。每服三錢。熱酒調下。如不飲

酒。薄荷醋湯亦可。

方脈流氣飲五四

治瘰癧流注。鬱結腫塊。或走注疼痛。或心胸痞悶。咽塞不利。脇腹膨脹。嘔

吐不食。上氣喘急。咳嗽痰盛。面目四肢浮腫。大小便秘。

當歸 川芎

芍藥炒 茯苓 黃耆炙 炙甘草 紫蘇 青皮 烏藥 半夏製 桔梗炒 枳

實炒

防風

陳皮各一錢

木香

大腹皮

枳殼炒

檳榔各五分

水二鍾。薑三片。棗一枚。

煎八分。食遠服。

瘡科流氣飲五五

治流注。及一切恚怒氣結腫痛。或胸膈痞悶。或風寒濕毒。搏於經絡。致成

腫塊。肉色不變。或漫腫木悶無頭。

人參 當歸酒拌

黃耆鹽水炒

芍藥

官桂

厚朴製

甘草

防風

紫蘇

枳殼

烏藥

桔梗炒各 檳榔七分 木香 川芎 白芷各五分 右水煎服。

陳氏獨聖散五六 凡患瘡瘍皆因氣血凝滯宜服香劑蓋香能行氣通血也如瘡初作便宜以此入茶飲之。

香附子薑汁侵一宿 焙乾研末 右無時以白湯調服二錢漬以局方小烏沉湯為尤妙。

乳香定痛散五九 治瘡毒損傷血凝氣滯壅腫拘攣筋骨疼痛。

乳香沒藥各另研 羌活 五靈脂 獨活各三錢 川芎 當歸 真緣豆粉 肉桂 白芷

白膠香各半兩 右為末煉蜜丸如彈子大每服一丸細嚼薄荷湯或酒送下手足損痛不能舉動加草烏五錢鹽湯送下。

消毒散五八 治乳癰吹乳並便毒如憎寒壯熱或頭痛者宜先服人參敗毒散一二劑方可服此藥如無前證即服此藥二三劑或腫不消宜服托裏散。

金銀花 青皮 天花粉 柴胡 殭蠶炒 貝母 當歸酒拌 白芷各二錢 水二鍾煎一鍾。

食遠服如治便毒加大黃一二錢煨用空心服。

清熱消毒散五九 治一切癰疽陽症腫痛發熱作渴。

黃連炒 山梔炒 連翹 當歸 甘草各一錢 川芎 芍藥 生地各一錢半 金銀花二錢 右水煎服。

東垣黃連消毒散六十 治腦疽背疽喉腫疼痛或麻木。

黃連炒 羌活各一分 黃芩 黃柏 桔梗 藁本 防己各五分 歸尾 連翹 防風 獨活

黃連炒 羌活各一分 黃芩 黃柏 桔梗 藁本 防己各五分 歸尾 連翹 防風 獨活

黃連炒 羌活各一分 黃芩 黃柏 桔梗 藁本 防己各五分 歸尾 連翹 防風 獨活



知母炒生地各四分

人參 甘草各三錢

黃耆 蘇木

陳皮

澤瀉各二分

右水煎服

連翹清毒散

六一

治癰疽濕熱諸症。○亦名清涼飲。亦即局方涼膈散。

連翹二兩

梔子

大黃

薄荷

黃芩各五錢

甘草半兩

朴硝二錢

右每服一兩。水煎溫服。

加味解毒湯

六二

治癰疽實熱。大痛不止。

黃耆鹽水炒

黃連炒

黃芩炒

黃柏炒

連翹

當歸酒拌各七分

甘草炙

白芍藥

梔子炒

米各二錢

右水煎服

鍾煎服痛即止

解毒防風湯

六三

治斑疹或瘡或痛。

防風錢

黃耆

芍藥

地骨皮

枳殼炒

荊芥各二錢

水煎徐徐服

陳氏解毒防風湯

六四

方在痘疹五六。治痘疹毒氣熾盛。

散腫潰堅湯

六五

治瘰癧堅硬。氣血無虧。宜用之。

柴胡

黃芩各四錢

白芍藥炒

升麻

連翹

黃柏酒炒

蓮朮

三稜酒炒

乾葛

歸尾各三錢

知母酒炒

龍胆草

天花粉

桔梗

昆布各五錢

炙甘草二分

右水煎服

瓜篋托裏散

六六

治瘡瘍毒盛者。未成則易消。已成則易潰。既潰則生肌。

黃瓜篋并碎

忍冬藤

乳香各一錢

蘇木五錢

沒藥錢三

甘草二錢

右用酒三碗。煎二碗。空心日午臨

睡分三服。○或以此為末。酒糊丸彈子大。硃砂為衣。細嚼。用當歸酒送下。治打撲損傷尤妙。

萬金散

六七

一名內托散。○治癰疽已潰未潰者。有消毒破血之功。



括萆一個沒藥研一錢大甘草節二錢右用酒二碗煎一碗去滓後入沒藥服

製甘草湯六八

治懸癰不拘腫潰亦治癰疽用大甘草一兩切三寸長用澗水一碗浸

以浸火炙乾仍投前水浸透再炙至水乾為度却挫細用無灰酒二鍾煎七分空心服當有

人患此已破服兩劑瘡即合○一國老膏方用大甘草二斤以河水浸取漿汁去滓用銀石

器熬成膏磁罐收貯每服一二匙酒調服或水亦可尤解丹藥之毒○一方治癰疽用生

草為末酒調服二錢連進數服自消

梅花飲子六九

癰疽初起服之可防毒氣內攻

川芎乾葛

天花粉黃耆烏梅甘草蘇木各一兩忍冬藤四兩右作四劑水煎服

牛膠散七十

治癰疽便毒不內攻不傳惡症有益無損

牛皮膠者四兩

右用酒一碗重湯煮化加酒服至醉不能飲者加白湯

明膠飲子七一

治一切癰疽腐毒

明廣膠炒粉

粉甘草各一兩橘紅錢五右作三劑水煎服

護心散七二

解金石砒硫發疽之毒

綠豆末一兩

明乳香研半兩

右以生甘草煎湯調時時與呷務使藥氣常在膈間

清心內固金粉散七三

一名金花散

解毒清心流行氣血散滯清火凡喉腫熱痛飲食如



綠豆四兩研末 硃砂另研

人參 甘草

白茯苓各三錢

朴硝另研

白豆蔻各五錢

麝香另研

雄黃各

錢冰片五分

右為末。每服一二錢。蜜湯調下。

蠟礬丸七四

一名黃礬丸。○治金石發疽一切癰疽。托裏止疼。護藏府神妙。不聞老幼皆

可服之。

黃蠟一兩黃色佳者溶開

白礬淨者研末

右二味和勻。眾手急丸。桐子大。每服二三

十丸。漸加至四五十丸。熱水或鹽湯送下。日進二三服。至三四兩之上。愈見其功矣。○如

服金石發疽。別用白礬末一兩。作三五服。酒溫下尤效。○有人遍身生瘡。狀如蛇頭。名曰蛇

頭瘡。凡宜用之。○治蛇蝎毒蟲咬傷。溶化熱塗傷處。痛止毒出。仍服兩許。○此方不惟止痛

生肌而已。其護膜止瀉。消毒化膿。及內癰排膿托裏之功甚大。

千金化毒丸七五

治諸惡毒。用白礬三錢。糊丸。以葱頭七莖煎湯送下。則腫痛俱退。再用

仙方活命飲二劑。以去其餘毒。此本方原用礬末。以葱湯調服。因湯難服。故易為丸。○一方

士治瘡疽。不問腫潰。先用此藥二三服。後用消毒藥甚效。常治芻蕘之人。用此即退。不用托

裏藥亦愈。若金石毒藥發疽者尤效。蓋礬能解金石之毒也。○一方用礬末五錢。硃砂五分。

熟酒下。亦效。此藥托裏固內。止瀉解毒排膿。不動藏府。不傷氣血。有益無損。其藥易得。其功

甚大。偏僻之處。不可不知此方。或毒蟲所傷。溶化熱塗患處。更以熱酒調末服。皆效。

五福化毒丹七六

治咽喉牙口瘡。毒腫痛。並小兒一切熱毒瘡癤。驚惕煩躁。口舌生瘡。夜卧

加批

卷六十四

上海廣益書局印行

此為試讀，需要完整PDF請訪問：www.ertongbook.

中醫藥大學圖書館版權所有