

弄丸心法

蜀新都楊鳳庭西山弄丸心法全集

共八卷

彭先春

張玉軒

金典書

楊克三

再傳門人

夏賡虞

章啟泰

同校

黃元吉

張福堂

傅子華

湯績成

目錄

一卷 脈訣

三卷 雜論

四卷 雜論

五卷 雜症

六卷 雜症

七卷 雜症

八卷 婦科

兒科

弄丸心法卷五

細症

新都張興龍校刊

方歌小引

方歌者。恐人臨症無方。彷彿立方。難免錯誤者也。故每症之下。立有數方。君臣佐使合宜。加減變化不錯。必至藥到病除之靈。而後選入。此古人立方之苦心。卽濟世之良藥也。何可不讀。臨局時。須審此是何症。應用何方。與我方歌中何方恰合。無疑。加減何藥更妙。然後開方治之。則藥到病除矣。此非我之能。記誦之能也。我輩得古人之便宜。其利多矣。豈可忽乎哉。

寅申二年。少陽相火司天。厥陰風木在泉。火勝金衰。
厥陰風木在泉之歲。主病主治。

風淫勝。地氣不明。洒酒振寒。善伸數欠。心痛支滿。兩脇
裏急。飲食不下。鬲咽不通。嘔腹脹。善噫。病本於脾。治以
辛涼。佐以甘苦。

桂枝湯 生黃芪湯 調中益氣湯 平胃二陳湯
逍遙散 補中益氣湯 玉屏風湯 補中合生脈飲
發散湯 茯苓補心湯 六味地黃湯 真元散
清解湯 金水六君煎 四君四物湯 大補元煎

傷風

邪從三陽皮毛而入。初則發熱不惡寒。只惡風。汗出頭痛。治法當先散表。外邪去後。則清解內熱。風乃百病之長。六淫之首。四時之中。風之寒暖不同。八方之間。風之虛實當分。風之變病難言矣。至四時不能謹護。易於感冒。其邪由皮毛而入腠裡。居於脈外之衛分。病名傷風。重者洒洒惡寒。翕翕發熱。鼻鳴。乾嘔。脈浮緩而有汗。有惡風卽發熱者。有惡寒不發熱者。久而身壯熱者。爲風傷衛。仲景用桂枝湯解肌。或加防風。桂枝湯治太陽風。甘棗芍藥姜棗同。桂麻相合名各半。太陽如瘧。此爲功。凡脈浮或浮緩浮弦微數。身熱自汗。頭痛鼻塞。鼻鳴。乾

嘔。面熱。咳嗽者。皆風也。病輕。桂枝一錢。防風八分。重者。加羌活五分。獨活八分。柴胡八分。前胡八分。此內傷加藥法也。

其有非時暴寒。人偶觸之。鼻塞。頭痛。咳嗽。清涕。惡寒。發熱者。人亦謂之傷風。不知卽三時之寒疫也。以生黃耆湯主之。

生黃耆湯。防風桂。羌活。川芎。炙草配。生姜作引用。熱服。隨抑米飲。風卽退。

若人元氣素弱。不能解者。以補中益氣湯。加蘇葉卽解。補中益氣者。朮陳升柴參草當歸身。虛勞內傷功獨擅。

亦治陽虛外感。因木香蒼朮易歸朮。調中益氣暢脾神。
如汗出不止。外無表症。以玉屏風湯主之。

玉屏風湯。炙黃耆。白朮。防風。生姜。齊內虛汗多。加肉桂。
補正祛邪。甚爲宜。

一傷風熱症。鼻塞。喉痛。咳嗽。清涕。或乾咳。煩熱。目赤腫
痛。以逍遙散加前胡主之。咳甚者。茯苓補心湯主之。
逍遙散用當歸芍。柴芩朮草加姜薄。散鬱除熱功最奇。
調經八味丹。梔着。

茯苓瀉心人參蘇。夏葛陳前枳桔芍。木香白芍歸地草。
心煩脈大細數需。

傷風解散後。咳不止者。以金水六君煎主之。邪不解加柴胡。

金水煎中當歸地。陳皮半夏茯苓貝。炙草姜煎食遠服。
肝腎虛寒痰嗽症。

然此或有內傷。而後外感者。或先有外感。而後內傷者。此則專因房勞兼病。非仲景傷寒所謂兩感也。人患此病。舉世不能有治。卽治全活者亦甚少。欲攻外邪。愈損正氣。而虛祛以死。欲補正氣。反助外邪。而燥熱以死。豈俗謂內外兩受風寒暑濕乎。且自古明公不惟仲景傷寒諸篇無一言及。卽東垣內傷外感論言之甚詳。尙悞

認內傷發熱爲外感發熱。因身若何爲內傷當補。若何爲外感當發。至於內外兼病。并未論及。亦無治法。丹溪亦言之未詳。古人未傳。安怪時醫之不能治此症也。患此病者。初起一二日。寒邪在表。以發散湯主之。繼則脈沉數在裏。以清解湯主之。

發散蒼桔赤防風。羌干陳皮白枳芍。內虛汗多加肉桂。
細草香附前胡蘇。兩感風寒此爲最。脈浮在表甚有功。
清解湯中葛根蘇。柴前赤壳與麥冬。朱澤十荷草知母。
脈來沉數此爲宗。

一汗之後。脈自平伏。體壯者自愈。如體弱者。神微神虛。

卽當補陽。用補中益氣湯主之。陰虛補陰。六味地黃湯。
主之。或逍遙散之類。自可取效。此先儒未發之蘊義也。
六味湯中君熟地。山藥澤瀉茯苓。丹棗二皮同爲使。
喘嗽麥冬加五味。舌黑芒刺甜花粉滋陰降火。此爲最。
若汗後不補。表虛發熱。陽氣外散。不可救也。然患此症。
更有日久而外邪入裏。遂至鬱熱。及庸醫誤投藥餅。引
表入裏。變生多症。卽高明鮮不爲之束手。余設有治法。
夫元氣固虛。邪熱又甚。必先清其鬱火。以清解湯主之。
數劑脈平。便當通利。定當補其內虛。脈下參詳。而酌用
之。且用藥不可太過。亦不可太雜。須緩進以候其天定。

靜處以候其神復雖危亦安

今人澆薄內傷亦多間有外感多係虛邪及不正之氣。真正傷寒熱病最少亦不待強邪。正氣早已困憊故治病全在一個內傷底子分別加減用藥。內傷底子有三般一氣虛一血虛一飲食氣虛。凡氣短倦怠不食少食或吐或瀉飲食不化心戰神怯畏寒背寒者是也。血虛凡面黃肌瘦夜熱潮熱心煩怔忡面赤口乾二便艱澁不能飲冷或咳或嗽衄血失血者是也。飲食凡飲食內停飲食不化吞酸吐酸胃痛腹滿五心煩熱惡食不食者是也。氣虛以四君湯加減作底。血虛以四物湯加減。

作底。飲食以平胃二陳湯加減作底。

四君子湯中和義參术茯苓甘草比益以夏陳名六君祛痰補氣陽虛餌除却半夏名易功或加香砂胃寒使四物地芍與歸芍血家百病此方宗八珍合入四君子氣血雙療甚有功除却著地與甘草加米煎湯名胃風平胃二陳合作湯蒼朮陳皮紫厚良炙草茯苓和半夏姜棗煎湯甚堪嘗痰飲食滯作底用加減在乎人之長凡遇風寒暑濕審其的症加入二三味去邪之藥立可解除若病久必傷根元腎中真水真火虧敗則八味六味丸兼用

六味湯中加附桂。上熱下寒必須用脈來浮洪。按微弱。
此是陰虛假熱候。麥冬五味應所加。鷀血齒血牛夕用。
甚加龜膠二三錢。大熱如烙盡皆退。

或脾氣下陷。則肺氣先絕。一切危症俱現。用補中湯合。
生脈散。多能轉危救敗。

補中益氣生脈合。麥冬五味參耆朮。歸陳升柴草生姜。
脾肺虛喘用元肉。

或陰虛氣浮。則獨用貞元飲。

貞元飲中歸地草。楊氏加入女真好。精不化氣子午煩。
呼吸難接喘不了。解散不退用此方。當在方內多加藥。

或精氣兩減。則必用大補元煎。此七方加減。神明而用之。

大補元煎參歸地。枸杞杜草山棗皮。精氣兩虛諸危症。扶元救敗寒熱宜。

凡遇久病。先固胃氣。飲食得入。藥乃有濟。參朮頻頻。勿厭多劑。若逢新病。先審宿根。或因血虛。或氣彫零。或挾宿食。痰飲氣凝。是三因者。病之根底。氣虛補氣。四君爲君。血虛補血。四物亦靈。痰食宿食。平胃二陳。氣鬱逍遙。以審其因。風寒暑濕。隨症加增。精專數味。重重輕輕。隨脈而施。合宜而行。用之得法。王道如神。

丑未二年。太陰濕土司天。太陽寒水在泉。土勝水衰。

太陽寒水在泉之歲。主病主治。

寒淫勝。小腹控睾引腰脊沖心痛。血見嗌痛領腫。病本於心。治以甘熱佐以苦辛。

麻黃湯 眞武湯 大青龍湯 人參白虎石膏湯

葛根湯 四君湯 大承氣湯 調胃承氣湯

貞元飲 四逆湯 小承氣湯 附子理中湯

猪膚湯 苦酒湯 六味地黃湯 甲己化土湯

烏梅丸 半夏湯 八味地黃湯 麻黃附子細辛湯

黃連阿膠湯 黃連解毒湯 通脈四逆散

溫散桂枝湯

溫散麻黃湯

涼散九味羌活湯

涼散小柴胡湯

涼散柴葛解肌湯

補中散人參桂枝湯

健中湯

理陰煎

補中益氣湯

大溫中飲

散肺五積湯

小青龍湯

葛花醒酒湯

香蘇散

靈散參甘草湯

參脈散

人參白虎湯

玉女煎

靈散七味湯

補陰益氣煎

右汗下和溫補五法之中。而又立五散法。曰溫涼補和滋五法。此五者施之得當。一汗而愈矣。

傷寒

傷寒另立一科。誠危劇大症。非精通仲景書。不能治之。今立六經大暑。以示初學。一日二日來在太陽。太陽分