

二

吳黼堂
評註

陳無擇三因方

上海棋盤街
文瑞樓印行



省中醫藥學會藏
 編目 11-185 $\frac{2}{8}$



三因極一病源論萃方卷之三

敘痺論

夫風濕寒三氣襍至合而為痺。雖曰合痺。其用自殊。風勝則為行痺。寒勝則為痛痺。濕勝則為着痺。三氣襲人經絡。入於筋脈皮肉肌骨。久而不已。必入五藏。凡使人煩滿喘而吐者。是痺客於肺。煩心上氣。噤乾恐噫厥脹滿者。是痺客於心。多飲數小便小腹痛如懷孕。夜卧則驚者。是痺客於肝。善脹尻以代踵。脊以代頭者。是痺客於腎。四肢懈怠。發咳嘔沫。上為大塞者。是痺客於脾。又有腸痺者。數飲而小便不利。中氣喘急。時發飧泄。又胞痺者。小腹按之內痛。若沃以湯。溢於小便。上為清涕。又六腑各有俞。風寒濕中其俞。而飲食應之。故循俞而入。各舍其府。治之隨其府俞。以施針灸之法。仍服逐風濕寒發散等藥。則病自愈。大抵痺之為病。寒多則痛。風多則行。濕多則着。在骨

則重而不舉。在脈則血凝而不流。在筋則屈而不伸。在肉則不仁。在皮則寒。逢寒則急。逢熱則縱。又有血痺。以類相從。附於此門。外有支飲作痺。見痰飲門。

合痺治法

附子湯

治風濕寒痺。骨節疼痛。皮膚不仁。肌肉重者。四肢緩縱。

附子

生去皮臍

白芍

桂心

人參

茯苓

各三分

白朮

一兩

甘草

右剉散。每服四錢。水三盞。煎七分。去滓。食前服。

黃芪五物湯

治尊榮人。骨弱。肌膚盛。重困疲勞。汗出。卧不時動搖。

加以微風。遂作血痺。脈當陰陽俱微。尺中小緊。身體如風痺狀。

黃芪

白芍

桂心

各等分

生薑

五片

大棗

三枚

食前服

黃芪酒

治風寒濕痺。舉體腫滿。疼痛不仁。飲食惡冷。嗇嗇惡寒。胸

中痰滿心下塞方見中風門

歷節論

夫歷節證疼痛不可屈伸身體尪羸脚腫如脫其痛如掣流注骨節短氣自汗頭眩喑喑欲吐者皆以風濕寒相搏而成其痛如掣者為寒多腫滿如脫者為濕多歷節黃汗出者為風多顧病源所載飲酒當風汗出入水遂成斯疾原其所因雖涉風濕寒又有飲酒之說似屬不內外因亦有不能飲酒而患此者要當推求所因分其先後輕重為治久而不治令人骨節蹉跌變為癰病不可不知

歷節治法

芍藥知母湯 治諸肢節痛身體尪羸脚腫如脫頭眩短氣喑喑欲吐

桂心 知母

防風

各四兩

白芍

炙草

麻黃

附子

炮去皮臍各三兩

每服四錢。加生薑五片。空心服。一法。加白朮、川芎、杏仁、半夏。

烏頭湯 治病歷節不可屈伸。

烏頭

五枚。剉以蜜二升。煎取一升。去烏頭。

麻黃 去節

炙草 芍藥 黃芪

右剉散。每服四錢。水二盞。煎七分。去滓。投前蜜煎一升。空心溫服。

千金方。有乾薑、桂心、大棗、無黃芪、麻黃。治寒散腹中絞痛。賊風入腹。攻五臟。拘急不能得轉側。叫呼發作。有時使人手足厥逆。

附子八物湯 治歷節風。四肢疼痛。如槌鍛不可忍。

附子 桂心 炮薑 白芍 茯苓 炙草

各三兩

人參 一兩

白朮 四兩

每服四錢。煎。去滓。食前服。一方。去桂。用地黃二兩。

獨活寄生湯 治歷節風。近人用之甚效。亦治腰背痛。及腳氣流注。

獨活 三兩

桑寄生 杜仲 薑製

細辛 牛膝 秦艽 人參

茯苓 炙草 白芍 川芎 當歸 熟地 防風 桂心 各
兩 每服四錢空心服

吳黼堂曰此兩症之漫性者考中西醫俱無速愈之方西醫每注
射皮下輕減其痛中醫必須通絡透濕及外治蒸熨抽拔之法然
往往以針法取效最捷此乃軀殼之症徒恃藥劑不足以愈病也
敘腳氣論

夫中風寒暑濕與腳氣皆有漸頓淺深之不同中風寒暑濕得之頓
而淺腳氣得之漸而深以其隨臟氣虛實寒熱發動故得氣名其如
循經絡入藏府證候雖不一然三陽多熱躁三陰多熱煩亦可推求
但腳氣不專主一氣亦不專在一經故與中風寒暑濕為異耳兼有
續生諸病混雜多端未易分別治之須尋其經絡病症所在去處然
後以脈察其虛實淺深為治假如三陽經絡其診多在足外踝及手

背三陰經絡其診多在足內踝及臂內以此粗分陰陽可知大概矣其如風寒暑濕性用各各不同所謂風為行寒為痛暑為頑濕為着乃不刊之論千金方論與董氏顓門類皆蹈襲舊說似難憑據惟留心斯道者必有至當之論焉

敘千金論

千金論脚氣皆由感風毒所致多不令人便覺或因他病乃始發動或奄然大悶經三兩日方始覺之庸醫不識慢或作餘疾治之莫不盡斃緣始覺甚微食飲嬉戲氣力如故惟卒起脚屈弱為異耳乃論風毒相冒云夫有脚未覺異而頭項臂膊已有所苦諸處皆悉未知而心腹五內已有所困或見食嘔吐憎聞食臭或腹痛下利或大小便秘濇或胸中衝悸不欲見光明或精神昏憤語言錯亂或壯熱頭痛或身體酷冷疼煩或覺轉筋或腫或胫腿頑痺或時緩縱不隨或



復百節攣急。或小腹不仁。皆謂脚氣狀貌也。至於婦人產後取涼。多中此毒。其熱悶掣。縱驚悸。心煩。嘔吐。氣上。臍下冷痞。幅幅然不快。兼小便淋漓。不同生平。皆係脚氣之候。頑弱為緩風。疼痛為濕痺。右件千金節文。備敘諸症。不說陰陽經絡所受去處。亦不分風濕寒熱四氣。及內藏虛實所因。後學從何為治。若一一信書。不若無書為愈。此之謂也。

脚氣脈證

脚氣證狀固多。但當以脈證分其陰陽。使無差悞。所謂脈浮為風。緊為寒。緩細為濕。洪數為熱。見於諸陽。病在外。宜發散之。則愈。沉而弦者。亦為風。沉而緊者。亦為寒。沉細為濕。沉數為熱。見諸陰。病為裡。宜溫利之。則愈。外證自汗走疰。為風勝。無汗疼痛攣急。為寒勝。腫滿重着。為濕勝。煩渴熱煩。為暑勝。四氣兼有。但推其多者為勝。治之當以

諸證互辨。而分表裡。寒則溫之。熱則寒之。在表則散。在裏則下。若夫虛氣乏。間作補湯。隨病冷熱而用之。不可拘不可服補藥。

敘太陽經腳氣證

病者頭痛。目脫。項強。腰脊連體樞。循臂外。出外踝之後。循京骨。至小指外側。皆痛者。乃足太陽膀胱經。為風寒暑濕流注。自汗者為風勝。無汗疼痛為寒勝。熱頑為暑勝。重着腫滿為濕勝。諸經皆當如此推。凡太陽經。宜隨四氣發散而愈。

太陽經腳氣治法

麻黃佐經湯 治風寒暑濕流注。足太陽經。手足攣痺。行步艱難。增寒發熱。無汗惡寒。或自汗惡風。頭痛眩暈。腰重。關節疼痛。

麻黃

去節

乾葛

細辛

白朮

茯苓

防己

桂心

羌活

防風

炙草

等分

右為粗末。每服四錢水二盞薑三片棗一枚煎七分去滓空心服。自汗去麻黃加桂枝白芍重着加白朮橘皮無汗減桂加杏仁澤瀉所加並等分。

陽明經腳氣證

病者淒淒寒熱呻欠口鼻乾腹脹髀膝臑中循脰外廉下足跗入中指內間皆痛者乃足陽明胃經為風寒暑濕流注之所為四氣偏勝並如上說治之宜隨四氣微利之。

陽明經腳氣治法

大黃佐經湯 治風寒暑濕流注足陽明經使腰脚痺痛行走艱難涎潮昏塞大小便秘澁腹痛嘔吐或復下利惡聞食氣喘滿肩息或自汗譫語。

大黃 細辛 茯苓 防己 羌活 黃芩 前胡 枳殼 厚

朴薑製

炙草

杏仁

麩炒去皮
尖別研

右剉散。每服四錢。薑三片。棗一枚。煎七分。去滓。空心熱服。腹痛加白芍。秘結更加阿膠。喘加桑皮。紫蘇。小便秘加澤瀉。四肢瘡痒。浸淫。加升麻。所加並等分。

荷葉藳本湯

治脚趺生瘡。浸淫腿膝。濃汁淋漓。熱痺痛痒。

乾荷葉

四張

藳本 等分

右以水二斗。煎減五升。去滓。溫煖得所。淋瀝。仍服大黃佐經湯佳。

少陽經脚氣證

病者口苦。善太息。脇痛面垢。體無膏澤。頭額目銳。背痛。缺盆并腋下馬刀腫。自汗。振寒發熱。胸中脇肋髀膝外至脗絕骨外踝。及諸節指皆痛者。乃足少陽膽經。為風寒暑濕流注之所。為四氣偏勝。例如前說。治之宜隨四氣和解。

少陽經脚氣治法

半夏佐經湯 治足少陽經為風寒暑濕流注發熱腰脇痛頭疼眩暈嘔吐宿汁耳聾驚悸熱悶心煩上氣喘滿肩息腿痺縱緩不隨
半夏 乾葛 細辛 白朮 茯苓 桂心 防風 炮薑 黃芩 遠志 炙草 柴胡 麥冬 各三分 每服四錢薑三片棗一枚煎七分空心服如熱悶加竹瀝半合喘滿加桑皮杏仁

料簡三陽并合脚氣

三陽經有并有合如太陽并少陽少陽并陽明陽明并太陽三陽合病皆于經絡中推考其診隨證治之所謂并者二經相并合者三經會合以此強分使名義易曉不必論其一二也

三陽并合脚氣證治

病者憎寒壯熱自汗惡風或無汗惡寒暈眩重着關節掣痛手足拘

攣。疼痛冷痺。緩縱不隨。心燥氣上。嘔吐下利。此皆三陽經中風寒暑濕。其脈必浮弦緊數。

大料神秘左經湯 治風寒暑濕流注足三陽經。手足拘攣疼痛。行步艱難。憎寒發熱。自汗惡風。頭眩腰重。關節掣痛。或卒中昏塞。大小便閉澇。或腹痛。嘔吐下利。惡聞食氣。髀腿頑痺。緩縱不隨。熱悶驚悸。心煩氣上。臍下冷痺。喘滿肩息。

麻黃 乾葛 細辛 厚朴 茯苓 防己 枳殼 桂心 羌

活 防風 柴胡 黃芩 遠志 炮薑 半夏 麥冬 甘草

分等

右剉散。每服四錢。加生薑三片。棗一枚。空心服。自汗。加牡蠣白朮。去麻黃。腫滿。加澤瀉木通。熱甚無汗。去桂。加陳皮。前胡。升麻。腹痛吐利。去黃芩。加芍藥附子。大便秘。加大黃。竹瀝。喘滿。加杏仁桑皮。

紫蘇所加並等分。凡有此病。詳認證狀。逐一加減。無不愈者。常服下氣消痰。散風濕。退腫。進食飲。令人不虛。江南諸師。固秘此方。雖父子兄弟。不傳。學者當敬用之。

加味敗毒散 治三陽經腳氣流注。腳踝上焮熱赤腫。寒熱如瘧。自汗惡風。或無汗惡寒。

羌活 獨活 前胡 柴胡 枳殼 桔梗 人參 茯苓 甘

草 川芎 大黃 蒼朮

右剉散。每服四錢。薑三片。薄荷一頭。煎七分。熱服。不過二服。愈。皮膚瘙癢如赤疹。加蟬退。

太陰經腳氣證治

病者腹滿。挾咽連舌系急。胸膈痞滿。循行骨下。股膝內前廉內踝過核骨後。連足大指之端內側。皆痛者。乃足太陰脾經。為四氣流注之

所為也。四氣偏勝。並如前說。治之各隨其氣所中輕重。溫散之。

六物附子湯 治四氣流注足太陰經。骨節煩疼。四肢拘急。自汗短氣。小便不利。惡風怯寒。頭面手足。時時浮腫。

附子

桂心

各四兩

白朮

茯苓

各三兩

防己

四兩

甘草

二兩

每服四錢。薑七片。煎服。

少陰經脚氣證治

病者腰脊痛。小指之下連足心。循內踝入跟中。上腠內。入脛中。內廉股內皆痛。上衝胸咽。飢不能食。面黑。小便淋閉。咳唾不已。善怒。心惕。惕若人將捕之狀。小腹不仁者難治。足陰腎經為四氣流注之所為也。四氣偏勝。並如前說。治之各隨其氣所中輕重。而溫補之。

八味丸

治少陰腎經。脚氣入腹。小腹不仁。上氣喘急。嘔吐自汗。此

證最忌。以腎乘心。尅火。死不旋踵。



熟地

八兩

牡丹皮

茯苓

澤瀉

各三兩

山萸肉

山藥

各四兩

附子

肉桂

各一兩

右為末。蜜丸。桐子大。酒服五十丸。溫酒米湯食前服。

厥陰經腳氣證治

病者脇肋偏疼。從足大指連足趺上廉上臑。至內廉循股內陰器抵小腹夾臍。諸處脹痛。兩腳攣急。咽乾嘔逆。洞泄者。足厥陰肝經為四氣流注之所為也。四氣偏勝。並如前說治之。各隨其氣所中輕重而調治之。

神應養真丹

治厥陰肝經為四氣進襲肝藏。左癱右瘓。涎潮昏塞。

半身不遂。手足頑麻。語言蹇澁。頭旋目眩。牙關緊急。氣喘自汗。心神恍惚。肢體緩弱。上攻頭目。下注腳膝。榮氣凝滯。遍身疼痛。兼治產後中風。角弓反張。墮車落馬。打撲損傷。瘀血在內。



中醫藥大學圖書館

川芎 當歸 酒浸

白芍 熟地 羌活 天麻

右等分。一法無羌活。加木瓜炒烏膏為末。蜜丸如雞子黃大。每服一丸。木瓜兔絲子浸酒下。脚痺米仁浸酒下。中風溫酒米湯下。

料簡三陰併合脚氣

傷寒三陽有併合。三陰無併合。脚氣則不然。以久滯藏氣隨其虛實。寒熱而流注。故病多併合。不可不知。

三陰併合脚氣治法

病者腹滿胸痞。骨節煩痛。四肢浮腫。上氣喘急。小腹不仁。腰節足心。臑膈皆痛。脇腰偏疼。陰氣抵小腹。夾腰諸處脹痛。此皆三陰經中風。寒暑濕。其脈必沉細遲澀。

抱龍丸 治肝腎藏虛。風濕進襲。流注腿膝。行步艱難。漸成風濕。脚氣足心如火。上氣喘急。小腹不仁。全不進食。