

卯9
68

苏州潘慎明

承刚

捐赠



奇方秘集目錄

喘門

腳氣

瀉痢

癰閉

瘡疾

癰癰

血門

秘結



喘門

喘者促促氣急喘喘痰聲張口抬肩搖身擷
壯其目衆多不越于火逆上而氣不降也

肺主清高無窒塞一有邪干便喘急治法雖云有胃虛氣虛痰火并食積

總以二陳湯減增臨症還須察端的喘而不食為胃虛桔朮木香焦杏實

吸吸短氣為氣虛木香味杏參枳朮若還痰喘有痰聲桔梗莎半與南星

乍進乍退為大喘黃芩山梔各等件桔梗五味麥門冬枳實蘓子同為伴

食後作喘為食積神曲山查並枳實桔梗五味大腹皮蘓子加之殊有益

加減瀉白湯

治肺脹哮喘

一方有貝母葶藶

治風寒痰喘咳嗽

桑白皮一兩

知母

陳皮

桔梗各五錢

青皮醋炒

地骨皮五錢

黃芩

甘草

炙各二錢

每服五錢水煎服

各方俱與嗽門通用故不另贅



定喘化痰湯

水煎服

白芥子

紫蘇子

萊服子

瓜蒌子

桑白皮

廣木香

葶藶

杏仁

桔梗

片苓

甘草

犀角

枳殼

半夏

定喘湯

治哮喘

一名千金定喘湯不拘時徐徐飲之愈

麻黃三錢

蘇子二錢

甘草一錢

冬花三錢

杏仁一錢

黃芩半錢

姜製炒

桑白皮

三錢

法製半夏三錢

白菓

二十一個去殼切碎炒黃

水煎薑引

含膏丸

治嗽喘三丸即効

葶藶

一兩炒黑色

知母

貝母各一兩

東肉五錢

砂糖一兩五錢丸如彈子大以新綿裹一丸含嚥

棗核丸 治冷哮喘重者十丸輕者五七丸即愈

紅豆蔻

二十一粒
去殼

砂仁肉

二十一粒
子去衣

公丁香

十二粒

胡椒

十粒

生半夏

十粒

廣木香

二錢

共研細末另用麵粉打薑汁糊為丸如

棗核樣每用一丸將黑棗一枚去核將藥入內用濕草紙裹數層微火煨

熟去紙連棗嚼碎咽下白滾水送之卧片時即効此藥兼治胃寒心口作

痛飽脹嘔酸鼻塞肚疼疾湧等症

定喘湯

治丈夫婦人遠年近日肺氣咳嗽上氣喘急喉中涎聲胸滿氣逆

坐卧不安飲食不下及治肺感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆

治之

半夏麴炒

阿膠炒

甘草

各一錢半

鴛粟殼

製半兩

北五味子

桑白皮

麻黃去節

人參各二錢半

右吹咀每服三大錢姜三片

烏梅半個水一盞半煎至七分去滓漸溫服食後臨卧日二服

方同和劑入兩

加減不
同有効

補肺湯

治症同前

滄州李官人宅
又名清金湯

鴛粟殼製二兩

人參粉草各半兩

陳皮

茯苓

杏仁

製

白朮

明阿膠炒

北五味子

桑白皮

薏苡仁

紫蘇莖各一兩

右以咀為末每服三大錢水盞半姜三片棗二枚烏梅半個煎至一盞臨

卧溫服

更加百合貝母心去

半夏麴款冬花

各一服之良驗

金不換散

治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿悶咳嗽涎盛腹脇脹

滿腰背倦痛或虛勞冷嗽唾紅痰及遠年近日一切喘嗽諸藥不効者並

治之

鴛粟殼半兩製

杏仁製

甘草各三錢

枳殼四錢

右吹咀每服三錢水

一盞半姜三片烏梅半個煎至八分食後臨卧漸漸熟服

神授湯 治上氣喘急不得卧

橘紅

苦梗

紫蘊

人參

各一錢

五味子

杆炒三分

右薑水煎服

真應散

治遠年喘急不能眠百藥不効者

白石英

四兩通明者以生絹袋盛用雄猪肚一具以藥入內縫定煮熟取藥出再換猪肚一具如前法者三次煮了取藥出晒乾研

右為末以官局款冬花散二錢入藥末二錢再加桑白皮二寸生姜三片

棗子一枚水一盞半煎至七分通口服猪肚亦可食只不得用醬醋鹽椒

姜等調和

款冬花散方用款冬花一錢貝母知母桑葉杏仁半夏阿膠甘草各二錢麻黃去節四錢為粗末是也

右用豉膏子和砒同杵極勻如麻子大每服五丸至十丸量大小與之並

用臘茶清極冷吞下臨卧以知為度



瘧疾門

夏傷於暑秋發瘧正氣與邪相擊搏陽分日發邪氣陰分深分間作在氣
早臨血晏臨居陽為熱寒為陰並則發時離則止醫者于朝著意尋主用
柴胡蒼白朮乾姜陳皮甘草入頭痛川芎軟石羔口渴石膏和與麥陽分
茯苓半夏著陰分芎歸酒炒芍熟地紅花知藥升氣血俱虛兼補藥有汗
要無、要有更別陰陽為斟酌陽汗參芪倍白朮陰汗四物加芪栝陰陽
無汗用本方午前午後須知悉食積枳實曲蘗連星半實只換常山若要
截分欲何如青皮芩梅烏再入

清脾飲

瘧疾脈來弦數或但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮炒

厚朴姜製

白朮土炒

黃芩酒炒

青果各八分

柴胡

白茯苓

半夏各錢半

甘草五分

生姜五片水煎服

二朮柴胡湯

諸瘧必用

白朮炒黑

蒼朮各四分

葛根七分

生姜五片煎八分服

一日一發及午前發邪在陽分加黃芩茯苓半夏各七分

熱甚口渴加石

黃知母麥冬各七分

間日或三四日發或午後發夜發者邪在陰分加四

物湯酒炒黃芪紅花各七分

提起陽分方可截之脉虛神倦加人參黃芪

各一錢

傷食者加神麴麥芽山查黃連各七分

痰多加生姜半夏各一錢

要截加檳榔常山炒透烏梅各一錢

姜參飲

瘧久必虛連進二服

人參

生薑各一兩

水煎一鍾未發前熱服

無參者用土炒白朮
血虛者用當歸代之



何首烏散

赤白何首烏共一兩

青皮

陳皮各三錢

甘草一錢

水二鍾煎半露一宿空心服虛人老人減半又有用黑豆四十九粒一萬

減青皮用厚朴參歸各一錢水酒煎亦妙

交加雙解飲

治瘴癘發時迷悶甚則狂妄不言并治食積癰并嶺南嵐瘴之毒

肉豆蔻二大枚

草豆蔻二枚

厚朴五錢

甘草五錢

生薑四錢

右五味俱用一半生一半熟肉果一枚麴裹生薑一片半濕草紙裹煨水

煎一鐘熱服

截瘧飲

治久瘧立効一方有陳皮

黃芪酒炙二錢

人參

白朮土炒

茯苓各錢半

草果

砂仁炒研



五味子研各八分 甘草六分 烏梅三個 水二鐘姜五片棗二枚煎服

風瘧 先熱後寒惡寒自汗煩燥頭痛

柴胡一錢 蘓葉二錢 北細辛四分 白芷一錢 羌活八分

生姜五錢 有痰加半夏陳皮只殼炒各八分 水煎服

溫瘧 亦先熱後寒受冬月之寒復因暑風而發

柴胡 半夏 黃芩 甘草此小柴胡湯熟多者用 半夏製 黃芩

人參秋涼發者用 各用姜棗煎服

壯瘧 但寒不熱陽氣素虛當乘暑時乘涼飲涼陰盛

柴胡一錢五分 黃芩 桂枝 乾姜炒黑各八分 甘草五分 姜三片煎服

二十四味斷瘧飲 治久瘧

常山 酒炒

草蓂

桤榔

知母 酒炒

陳皮

青皮

川芎

枳壳

柴胡

黃芩

荊芥

白芷

人參

紫蘇

蒼朮

白朮

半夏

良姜

茯苓

桂皮

葛根

甘草

杏仁

烏梅 各等分

右咀片每服一兩水二盞姜三片棗一枚煎八分發日早服

勝金丸

治一切寒熱瘧疾胸膈停痰發散不愈者神効

一方白薇一兩烏梅五錢

常山

四兩酒浸一宿曬乾

茅蒼朮

二兩米泔水浸一宿曬乾

桤榔

草果

各二兩

右為細末將浸常山餘酒煮糊丸梧子大每服五十九臨卧涼酒送下至

鷄鳴時再服七十九溫酒送下忌生冷草果湯亦可

人參養胃湯

加桂治感寒發瘧

草果

茯苓

人參各五錢

甘草炙七錢

橘紅七錢五分

厚朴姜製

蒼朮

炒湯泡

半夏

各一兩

藿香

洗去土五錢

右每服四錢水一盞半姜七片烏梅一枚煎至七分去渣熟服

六和湯

瘧虛服補劑不止者宜此

人參

知母

貝母

烏梅

白芷各錢半

枳櫟

常山

柴胡

各一錢

白水煎空心服

凡瘧一日一發者受病淺二日一發受病深三日又深連發二日住一日

者氣血俱病 瘧疾多主乎內傷鬱結或寒或熱或熱後大渴或出汗皆

宿食與痰之所為耳須消導化痰寬中理氣次隨症治數發之後人氣壯

實者可用截葉虛者只宜補中益氣兼化痰消導慎勿妄施猛劑損人天

年雖有風暑牝壯之分未必不由內傷而生寒熱柴平湯加枳柳草果即
小柴胡對平胃散也 如初起先寒後熱胃膈飽悶或戰後大渴宜清中
驅瘴飲主之即清脾飲加減 如發四五次脈弦寔而氣壯者須推盪之
宿滯已下而不止脈有力者六丁散主之 如痰滯胸膈大便燥寔不通
者滾痰丸主之若已服消導化痰尅伐不止脈弱體倦或脈來虛大者調
中益氣湯主之 夏月熱多寒少大渴脈虛細宜人參白虎湯煩燥渴極
或二三日後熱多來後渴燥宜凉水調六一散妙甚兼飲食作飽宜先消
導不能食者必於飲食上得當從食治 暑月汗多作渴宜解暑固元氣
虛者必用參朮一二貼托住其氣不致下陷後隨症治 若無汗要有
汗散邪為主帶補蒼朮川芎升麻葛根柴胡白朮之類若有汗要無汗扶

正氣為主帶發散參朮芪芍之類 四五發之後便宜截而除之若遷延

日久中氣大傷病邪轉深卒難取効 宿滯與痰膠于膈中痞悶多熱口

乾燥寔宜大柴胡湯利之或用枳實導滯丸 久瘧不得汗以二陳二朮

加枳榔倍蒼朮 老瘧係風暑入於陰分宜用血藥引出陽分而散芍歸

紅花二朮黃柏甘草升麻露一宿服胃不和膈有痰瀕用軟堅化痰健脾

葉小兒瘧疾治同大人日久不愈成痞塊者右方用生地芍藥各一錢半

陳皮川芎炒黃芩半夏各一錢甘草二分生姜煎成調醋烹鱉甲末服

瘧疾初起頭痛身拘急有表症者先以大羌活湯汗之瀕詳時令 日久

腹中有塊作寒熱者名瘧母用丸藥消化之醋炙鱉甲為君三稜莪朮香

附海石青皮桃仁紅花神麴麥芽隨症加減為丸醋湯下久病脾虛補養

為主驚甲等為佐可也

痰瘧老瘧也三日一發陰經受病也夫瘧得於

暑當以汗解或取風涼令汗不得泄鬱而成痰又復嗜慾縱飲及輕試截藥胃氣大傷其病難愈必須用參朮歸芍陳皮等補劑佐以本經藥引用之若得汗而體虛又須重補俟汗通身過安中方是佳兆仍節飲食避風寒遠房勞無不愈者此古法也今見膏粱家惟縱口腹不守禁忌病後傷脾有此者十居八九貧寒衣食不充勞役復損脾氣又不可不審大抵補中益氣消導化痰斷不可少苟驕恣不加調攝又非藥所可治者 內經有六經之瘧學者自宜搜究丹溪悉以二陳為主各加引經藥可見無痰不成瘧也一方凡發瘧時不可服藥如服須在未發之先否則藥病交爭轉為不安戒之或燥熱將止時服亦妙所謂避其銳氣擊其墮歸是矣