

痘科金鏡彙
四



增補保赤心法附卷上

信州翁仲仁著

上海

喬來初注釋

徐瀛洲原校
陶巖重訂

痘疹祕訣

共七十四症

凡看痘瘡要論稀密察色驗形辨其虛實

珠痘

紅活稀勻皮白瘡榮盤肥頂滿圓珠痘名

石痘

稀稀粟粒數不過百此名石痘最爲第

一

又

稀稀粟粒要察虛實密處分珠肥圓



南京中醫藥大學圖書館版權所有
1654

則吉

水

膿痘稀勻水痘稠密膿痘蠟黃水

痘粉白

細

雖細稀勻粒粒相等內無癰點

且放寬心

紫黑

深紅紫黑此兆不吉

淺紅淺色

桃紅却是真實

深紅

深紅肥厚表裏俱實

紅水

水紅光塌營衛少力

硬釘

硬若砲釘瘡肉一

色圓淨且勻誰知有失

泡痘

聊漿泡痘切莫

損漏若要乾焦直待漿臭

赤痘

紅斑尖瘦三

朝必覆見漿便焦此是赤痘

水痘

水紅尖瘦

此是水痘更若稠碎誰能榮秀

蛇殼

魚皮而

嫩竹膜而薄漿水不通俗名蛇殼

羊眼粟粒

稠密薄片席忽生羊眼難過二七

搔撓

損漏真元泄透寒戰咬牙此是死候

冷粥

結面方歪片片胖蠶形體死期即見

夾疹痘

出來疹玳瑁背皮腹脹氣急危在須臾

油

油光黍粥胎元多毒內有紅紫蚤辦棺木

蚊跡洒珠點墨青黛顏色速在三朝遲則七

蚤班

是死候

發廕

痘出發廕喘嗽作熱噎水失音

舌捲囊縮

汗出如濯髮直目惡狂言見鬼

定死不錯

四肢

手足多生四肢之痘身背皆

無有藥難救

無贈

痘出猶熱碎密顯光若無

贈痘早見乖張

泄瀉

先瀉後出手拳不直聲

啞熱蒸雖漿不吉

驚痘

兒出驚痘灑灑不茂

悶悶昏昏盧醫莫救

疔瘡

肌肉疔瘡漿不能

收七日之險八日之憂

軟脚

一見痘疹身熱

未除足立不起扁鵲難醫

吐瀉

吐則去熱瀉

則去毒醫莫止之吉凶未別

稠碎

蚊癰蚤色

帶熱便出稠碎爲凶肥大則吉

胎胎

肉色胎

胎不貫其膿若欲收成神天造功

先紅

未癰

先紅腹脹成凶再加氣急厥命如風

有根

上

出地閣下出足心根窠圓暈總謂有根

兩顴

出於兩顴金受火煎密之有害稀朗無愆

監門出於脣角號曰監門五日之後瀉利臨身

痘珠 痘稀勻紅潤鮮明氣旺血順不藥而

甯

陷頂

中間黑色四圍灰白陷頂之痘

醫術

反關

初出紅影後反沉伏反關之痘

五

日必卒

血疔

痘大黑陷中有血疔七朝定死

血裏心經

賊痘

痘色純黑更不光澤賊痘為

名徒勞藥石

紫雲

紫雲成片痘不分珠血熱

之過十日而死

逆驚

逆驚之痘痘已出齊風

火交作發搐難醫

折腰

痘出腎上為之折腰

紫大而黑難過七朝

四肢痘出四肢陽明所

主一逢泄瀉不測之虞

無根四肢皆有足心

獨無無腳之痘有術難扶

空殼內外皆空

聯乾索漿水不通俗名蛇殼

水患水泡縣密

瀉癢不息痘名水患空費神力

九焦須顧耳

額手足背脊腹肋心胸九焦痘卒

關門痘出

紅活大便祕結俗名關門滋陰最捷

向陽痘

出紅潤渴飲水漿狂言譫語名曰向陽

順痘

點子初分多在下身身上減少順痘之名

兩截痘出兩截腰中空缺水火未濟畢竟死絕

夾疹之痘兩感而得表裏和平溫涼是

則濕熱痘瘡漿來臭氣滿懷濕熱所致清熱

无災紅靨紅痘瘡經水相干紅變灰色搔

癢難當結胸痘疹正出胸中痞塞症號結胸

貝陳煎汁倒靨氣血乖離痘瘡倒靨毒不化

漿保元可參驚未痘先驚痘出鮮明發搐

九次難保生靈

茱萸

青紫不一大小稠密俗

名茱萸九日必卒

搭額

初出天庭爲之搭額

以臣犯君不過七日

托腮

痘出耳下謂之托

腮發於虛處九日受災

穿心

胸中密出謂之

穿心投藥速救不見成功

藥患

初起紅潤後

復陷阱將受虛寒藥患之症

夾班

痘出來班

血熱之故歸芍升麻金銀甘輔

針孔

中有一

竅黑色如綜俗名針孔七日途窮

蟲碎

痘臭

蛆生謂之蟲碎濕熱變成大命必敗

夾風痘

夾風寒出而不快發散外邪自然通泰

諸痛爲實腠理密密解散風邪調和血脈

癢諸癢爲虛榮衛不肥亟扶表裏歸芍參芪

伏痘不成膿內而瀉利名曰伏陰急當溫

裏寒戰寒戰之痘陰陽乘媾閉目無魂靈丹

莫救

痘疹心話



肉肫膳火珠癰不回漿反生痰磨羅元氣盡
死在二七間 白痘生來似粉醫人不識難
猜有盤有頂軟漿來紫草散兒無賽
根紅須大有盤有頂名碁平頭砲鏃頂無兒
號曰鼓釘難治 根肥頂焦灰白色生來未
熟人不識但逢八九收漿時紅活鮮明依舊
吉 報痘先須六七枚再停數日看芳菲若
還旬日無花蕊且喜平安果實奇 淡黑灰

白無點墨瘡若依稀凶中吉最怕乾燒鍋底
焦便是神仙醫不得一盤三四頂犯此命
難存毒氣來歸腎中間生黑疔根肥頂生
焦不須要煩惱不用諸熱藥涼劑自然好
淡黑色光榮後來又變黑根好色不好後來
好消息怪痘出半邊歪斜又不圓雖朗見
分珠七日赴黃泉一發徧身紅後來又變
黑分珠根窠肥醫人難救得漿清頂不足

元氣不發陸如若要收功必須發痘毒

將

清頂不足條款多來續如若食不食醫者難

伸縮 輕者三四出大小不等粒頭面稀少

佳兩脇不宜密 兩頤不宜多根窠紅活色

肥滿光潤澤眼中無者吉 初出尖圓光亮

分珠盤頂口肥瘡中無異肉平肌雜症不汗

何慮用藥調表裏七朝微熱休疑稀稀朗朗

正根枝首尾分明牢記 蚊點雲邊蚤刺皮

膚疹隱乾，癩蠱形頂突，紫疔兒盤頂，俱無莫治。最怕赤紋紅腳，青黃露白，灑硃瘡肉一色，不須醫祕受之人，切記。

痘疹祕旨

熱去熱來，熱又增，卒然發搐，是驚人先凶。後吉，休憂慮。兩道眉邊先有形，痘發當先太陽。左熱剛一日，兒真苦。四肢頭面密稠多，醫者須知好修補。七八朝來，胖起初不作膿。



南京中醫藥大學圖書館版權所有

窠水泡如霎時發喘瀉而膨總是軒岐無藥
與兩顴之上來密密其兒孔竅俱填實膽
生紫泡紫疔兒血熱症候人宜識發熱連
縣四五日印堂眉上預先出縱然稠密亦無
妨但怕其中灑硃墨報痘當先發印堂其
兒體健更無雙數不過百形如粟二七之期
痂落光又有一熱俱湧出先於耳後生形
跡四五日來紫黑枯發疔而死真堪惜熱