

16

新定傷科藥方註釋



癰 瘰 方

粉	若	土	黑	梅	川
粉	桔	貝	山	川	防
粉	搜	母	槐	芎	風
半	半	半	半	半	半
連	生	雲	決	杞	廣
澤	甘	茯苓	黃	白	陳
澤	草	半	苓	菊	皮
半	半	半	半	半	半
炒	皂	連	小	法	
當	角	翹	川	半	
歸	針	壳	連	夏	
半	半	半	半	半	
桑	研	夏	蜜	明	
葉	牛	枯	銀	廣	
出	子	柴	花	梨	
公	半	半	半	半	

以上為共研極細末煉白蜜為丸如小桐子大每服
每晨服一次或早夕二次

糖尿病特效方

鹽 卅 四 卅 卅

五倍子 一斤 茯苓 半斤 龍骨 半斤

用水調成丸藥 每日服二一三錢 連服半年

二 藥中加穀子用水煮熟飲汁服

1.

新定傷科藥方註釋

消毒類

(一) 簡易消毒液

硼酸^砂 100 蒸溜水 1000

(製法) 硼砂研細末以微溫蒸溜水溶解之製成爲百分之十溶液瀘淨瓶貯本品須新製製久置逾二週即失效。

(用法) 洗滌創口或罨創口及置創口。

按硼砂功能防腐殺菌西藥硼酸即是用硼砂加鹽酸製煉而成(亦有火山中天然產者)其性^純和入眼

而不刺激入創而不疼痛是其優點。但只能制細菌之發育。消毒功用不全。須多用。今濃厚飽和方有收效。本方以百分之十之溶液為輕創。是之消毒劑。今仿科學理消毒不可太過。免傷支。硬化壞死。生肌收口較難。雖是本方為消毒之良劑。雖曰簡易。即良法也。

再按用溫水溶解硼砂。今濃厚。至不可再溶解為度。以消毒砂。~~本~~浸之。置創口良好。又以硼砂研細末。一分。軟膏基質九分。製衣為硼砂軟膏。治電火等傷亦甚合。

(二) 神效消毒液



生石灰二〇 食鹽〇・五 硼砂二五〇 蒸溜水一〇〇〇 製
 法以蒸溜冷水浸石灰一宿 澄清去澱滓 溶入硼砂
 末食鹽製為百分五之溶液 濾淨瓶貯 本品須新
 製不可久置逾二週失效

(用法)洗滌創口或置創口及置創口

按生石灰即礮石灰 化學名鈣氧 舊名鈣養 含有
 強毒之亞而加里質 殺菌堅肌 肉 弥創口 能助長白
 血球繁殖 使血液中多加凝固力 但有腐蝕食性 每食
 鹽含菌殺菌消毒力尤大 故本方用量極少 且以
 硼砂中和之 硼砂功能已詳為前第一條項下 食

鹽為天然綠化物之一種，其主要成分為綠化鈉。此外含有加里苦土石灰等之鹽化物。凡純粹之鹽，其綠化鈉在百分之九十五以上，與石灰同用即綠化石灰。綠化鈣之意，與克魯爾石灰功用相同（即漂白粉）。第一次歐戰，京物缺乏時，用漂白粉廿五格蘭姆，硼酸廿五格蘭姆，以蒸溜水二公斤，製成溶液，其消毒有特長。現今普通盛行之攪銷水溶液，亦即此二物製成，但藥量均減半，為百分之二五。本方用生灰、食鹽、硼酸合劑，與此正合，且純粹國產，價值廉，產量豐富，取之不尽，用之不竭也。

止血類

(三) 簡易止血散

陈石灰二兩、大黃二兩、

(製法) 石灰必須陈者、擇淨同大黃研末、乳杵細、

(用法) 輕擦創口、

按石灰功能、弥補創口、凝固血液、以詳前第二條項下、故可用為消毒藥、又可用為止血藥、外人不謂其為有力於血剂、及有收斂作用、故以此石灰含亞尔加里质、遇酸類成鹽類、故又名鹽基、血遇鹽則凝固成晶、故能止血也、大黃能消毒、但中含鞣質、設含子酸、具收瀉作用、外用則消果、

力大黃色濃厚。又含卽素療法。與石灰同用。並可化其燥烈。上方石灰用煖土取其鹼性強。本方石灰用陳土取其鹼性弱。變暴悍為中和。變腐蝕為收瀉。神而明之。存乎其人。
(四)神效止血利散

烏鰂骨二兩、枯礬石二兩、五倍子一兩、

(制法)烏鰂骨三味共研末乳極細、

(用法)輕搽創口、

按烏鰂骨由煇發鈣炭發鈣膠質而成。枯礬石化學上謂硫發亞爾密細礬。加偏礬一名加里明礬。二物於固澀瀉性大。為止血藥五倍子。百分中含鞣質二十至七十七分。

之多，此則為析脂、肪、糖、獲膜、越幾斯、質、故、以、收、斂、粘、濡、性、強、效、用、與、蘇、後、同、（即、車、寧、後）長、於、止、血、中、外、醫、家、止、血、多、用、之、本、方、以、本、藥、之、粘、濡、合、枯、槁、之、燥、濡、與、烏、雞、骨、之、滋、濡、相、互、功、用、止、血、力、大、誠、止、血、之、西、女、劑、也、

又按烏雞骨為海濱產恐我時缺乏可以赤石脂代之蓋赤石脂含強化硅素及鐵心血之力不遜烏雞骨也

止痛類

（五）簡易止痛液

甘松 100 份 10000

（製法）甘松洗淨切碎浸四星期或久火煎一服即愈

三小时以上候冷滤净，瓶封固勿泄气。

（用法）每服一钱至一钱五分，加蒸糯米水少许冲服亦可。

甘松即每药搽草^草有特異之香氣，其有效成分为挥发

油。此挥发油中含有塞土司^紫甙、鞣质、鱼肝油等为主要成分。

之一功用理气止痛。国外学说凡脑神经及心胃运动衰

弱，此药能使健运。失氣氏曰：迷^指此能令其苏醒，此服吸

之^攝其^攝运^攝虚^攝弱^攝懈^攝弛^攝也。能^攝发^攝筋^攝骨^攝之^攝而^攝扶^攝其^攝强^攝健^攝以^攝之^攝。

代^攝糖^攝尔^攝扁^攝答^攝良^攝用^攝于^攝神^攝经^攝病^攝有^攝特^攝效^攝。本^攝方^攝仿^攝西^攝法^攝製^攝为^攝

到^攝效^攝为^攝简^攝易^攝之^攝止^攝痛^攝散^攝剂^攝。

（六）神效止痛散



硃砂一錢二分。麝香一分二厘。冰片一分二厘。乳香一錢五分。沒藥一錢五分。紅花一錢五分。兒茶一錢五分。四錢二分。

(製法) 硃砂、八味共研末。乳、沒細瓶貯封固。勿洩氣。

(用法) 內服外擦均可。內服每次七厘至一分。

按麝香、冰片、乳香、沒藥均有特異之香氣。麝香能作

大腦神經異常興奮。又能增多分泌。冰片亦與麝

香神似。並能促血液循環迅速。心臟跳躍促進。麝香外

人用為興奮劑。及回蘇醒藥。冰片則少用之。並謂多用則由

興奮而變麻痺。然性生麻痺止痛之功更大也。乳香、沒

藥俾血而氣。乃能活血散瘀消腫定痛。外科心

痛多用之。四药合用，止痛力强。而不用红花，血竭以通血
分。红花为红色素，之加密克，并含有黄色素。硫酸
盐，硫酸铁，硫酸锰，为行血之力大。晚近以疗法，主药即是由
车马制成。血竭则散血，活瘀之中，兼能收斂止血。国外学说
谓其能使稀薄之血液，凝固而受稠粘。免瘀成分，为阿仙
鞣酸。每分中，含有鞣酸五十四。其功用，亦能止血。砒砒成分，百分
中含水银八十六，硫磺十四。化学上谓之硫化水银。有直接殺
滅微菌之能。合观本方，行气和血，以止痛。而又兼具止血
消毒之用，诚良方也。

排膿生肌散

山簡易生肌散。熟石膏一兩黃丹二錢冰片二分

(製法)熟石膏三味研末乳極細瓶貯封固勿洩氣

(用法)輕擦創口

按石膏主要成分為硫酸加爾東謀此外則夾雜硫酸礬

土養化鉄等化名鈣礬養四舊名鈣養硫^收功功能清涼解熱沉靜

循環鎮定神經熟用則吸收水分而又具於固堅結之用故為

生肌要藥黃丹係黑鉛礬礬石煅煉而成味鹹立血功能

解熱生肌解毒拔毒為外科膏藥要品冰片^用芳香通

化濁去腐生肌其功已詳前第六條項下三物合用生肌結

痂之功可告凡其簡便而易為也



(八) 簡易排膿散

黃耆兩、當歸三錢、皂角刺一錢、穿山甲一錢、

(製法) 黃耆、芍藥、甘草、味共研細末、

(服法) 每服三錢、五錢、日二服或三服、白飯下、

按此即當歸補血湯加皂角刺、山甲、黃耆、功能興奮神經、
增高體力、入胃能助胃消化、入血中能促血液運行、為托瘡
生肌之要藥、當歸入胃能進胃液分泌之功、多入血中刺
激血液中之養料、^化令血液之養料^化迅速化膿、此血行血氣、
故云、為補氣補血之乾行血、即此以排膿而又加皂角刺、山甲
道之、此曰簡易即根本治療之大法也、



7.

(九)神效抗膿生肌膏

兒茶一錢 輕粉一錢 冰片三分 黃腊三錢 麻油二兩

(製法) 兒茶輕粉冰片研末乳極細再將麻油熬至滴水成珠加入黃腊使溶化稍冷再入三末攪和待冷成膏可也

(用法) 搽消毒紗布上傳創口

按兒茶凝固收斂易於結痂收口冰片芳香能化濁防腐生肌已詳前第六條項下輕粉為質地疎鬆之甘汞能直接補滅細菌此外人用為驅黴菌且局部有刺激性能增進分泌加多於鮮毒防腐之中實有促進生長之效合之兒茶冰片生肌之功較大黃腊功能凝固定痛生肌合麻油之鮮毒固皮

此同用相的益彰。外人用此為軟膏基質。隨各証而加
入對証藥末。我若稍加乳魚肝油。令其更緩。用為軟膏基
質。其效能。在番士林以上。本方用此。合兒茶。輕粉。冰片。
三藥為膏。生肌。養血。之功全矣。

(十) 神效挑膿生肌散

血竭六兩。赤石脂。牡蠣。龍骨。陀僧。五倍子。各三錢。冰片三錢。

(製法) 血竭。苦味。共研末。乳極細。瓶貯。封固。勿洩氣。

(用法) 輕擦創口

按血竭。五倍子。冰片。已詳前。第二條。項下。不贅。陀僧。在化學
上。為氯化鋁。其功用。能收縮。黏膜。及潰傷。之血管。使分泌

減少、同時又與白血球化合而成蛋白質、能令患處與空氣間
 隔、以免陳腐性、為生肌之特效藥、牡礬成分為炭、磷酸、
 多鈣、磷酸、動物質、皆能促進細胞之新陳代謝、而於腦神經尤有
 顯著之功效、入血能增大白血球、使血液凝固、強硬、不僅收斂已
 也、就骨與牡礬功用同、而能斂神經、吸收水分、過之亦石脂為
 石中脂、膏質膩而細滑、有黏性、兼可活血、促進血液之循環、
 俾創口益易於平復、能濡潤而補血、消有非人工仿製藥物
 成分、故可與此合之、其藥收斂性大為生肌之特
 效、利便、謂國藥不能代西藥也

選定傷科藥方註釋