

增輯
驗方新編
石部

二卷

肩部
胸部
各種氣痛
脾胃
噎膈

手部
肋部
咳嗽
痰疾
呃逆

腋部
心部
勞傷
三消
吐血

乳部
肺部
哮喘
飲食
滯積



驗方新編卷二目錄

肩部

擔肩癰癤

肩甲縫中積痛

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

脫骨疽

甲疽 又名嵌甲

灌甲初起

油灰指甲

指頭麻木痛癢

指頭畏冷

手足指頭羅紋生瘡

指頭生瘡

指甲下生瘡



十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠毛

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍

手了枝痛不可忍

手指觸着衣服痛癢破爛

手指斷落

手被咬傷

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已

手指手掌皮厚如鐵

掌中紅絲斷之血流不止

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

鵝掌風

手腕生物如豆紅紫疼痛

手臂生瘡腫大如拳

熱毒攻手腫痛欲脫

四肢節脫但有皮連不能舉動



手足作痛

手足生瘡久不收口

小兒手軟

腋部

肩下卽是

腋下腫硬形如鴨蛋

腋下疙瘩

音隔答

腋下癭瘤

腋下狐臭

乳部

乳頭破裂

乳上濕瘡

乳頭生瘡痛不可忍

乳癰

乳癰多至二三百頭者

乳癰腫及頭面

乳癰日久腫痛不愈

乳癰久不收口



北京中医药大学图书馆

乳岩

男子乳忽壅腫如婦人乳

婦人乳忽縮入

婦人產後兩乳長細垂下

婦人乳內吹氣有聲

婦人乳孔塞痛

婦人乳汁不通

乳汁自流不止

乳多發脹

無子食乳腫痛難傳

胸部

胸膈閉結不通

胸滿腹脹

胸前生孔

胸旁生瘡

龜胸

肋部

肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭



驗方新編卷二

肩部

擔肩癰癤

此惟擔夫有之

五楮子

燒存性

爲細末加黃丹

用水飛過

醋調敷之甚效

又方

照癰毒各方治之

肩甲縫中積痛

查中風筋骨各方治之



北京中醫藥大學圖書館藏



南京中医药大学图书馆版权所有

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

此症初起痛甚急用頭髮紮住指根取癩蝦蟆一個

一個腹無赤

八字文

破去腸雜

不可破胆胆汁沾指更痛

將瘡頭套住用繩紮好並

將蝦蟆心肝焙枯研末沖酒服以免毒氣攻心約一對時

對時

破口出膿而愈套住之後瘡頭猶如針刺痛更難忍甚至

心中難過遍身發熱或嘔吐惡心不必驚慌急服護心散

見癰毒諸方

或服麻油一盞

菜子油亦可

心自安定蝦蟆能拔極重

惡毒切不可輕易揭去忍耐片時自然破口出膿而愈倘

誤將蝦蟆揭去別藥難醫爲害不小去膿後如發昏暈亦



不必驚慌用高麗參三四錢以砂罐煮濃汁服之自然無
事參不宜蒸一時蒸不出汁其色只如淡茶煎則其色濃
厚易見功效無力者用好黨參一二兩煎服亦可愈後若
再腫痛此毒氣未盡之故再用蝦蟆套上少頃膿盡即不
再發此瘡最爲陰惡此方極屬神效不可輕視

又方

鳳仙花

下半截連根用不用水洗

和甜酒糟搗融敷有人指頭

生瘡腫大如李痛不可忍用此敷之半日腫消痛止較蝦

蟆方尤爲神速

又方

用磁片將瘡刺破查照疔瘡方

內蜘蛛拔毒治之

見癰毒諸疾疔瘡門

止痛消腫最爲神效

又方蜈蚣

焙枯爲末

猪膽調搽神效

又方 鷄蛋一個穿一小孔入信石壹分套指頭上熱刺

再換立刻止痛如神真仙方也較前各方功效更大

又方 雄黃 枯礬 各等分研末用麻油或醋敷亦極

效驗 又方 白蘿蔔挖孔入雄黃三分蒸半熟套指頭

或用真烏梅仁嚼爛敷之均極效驗 又方 如色白者

照後脫骨疽陽和湯各方治之又方雞子清磨雄黃敷之
又方陳柿餅雄黃搗敷

脫骨疽

此症生手足各指或云生手足
第四指者是或生指頭或生指節指縫

初生或白色痛極或如粟米起一黃泡其皮或如煮熟紅

棗黑色不退久則潰爛節節脫落延至手足背腐爛黑陷

痛不可忍古方有截去指頭一法斷不可用宜用頂大

甘草研極細末用香麻油調敷要敷極厚一日一換不可

閒斷忌食發物不出十日必愈真神方也再用金銀花

元參

各叁兩

當歸

貳兩

甘草

壹兩

水煎服一連十劑永無

後患藥味不可減少減則不效並忌抓擦爲要

又方大人用陽和湯小兒用小金湯重則用犀黃丸

見博

陰疽色紅者照上蛇頭惡毒方治之此林屋山人百發百

中之方也又方甘草嚼融厚敷乾則隨換日夜不斷

數日必愈神效

甲疽

又名嵌甲

凡指甲邊生一赤肉突出時常舉發者甲疽也用狼毒

兩黃芪

貳兩

醋浸一宿入猪油

五兩

微火上煎取一兩絞

去渣退火氣敷之日換三次神效此林屋山人方也

又方乳香外膽礬

研細時時敷之此病須別去甲不

藥亦愈若已成瘡久不愈者此方甚效

又方

皂礬

五錢火煨候冷研末

先以鹽湯洗瘡拭乾以礬末敷之

舊紬裹定一日一換神效或用枯礬亦可惟敷之微覺疼

痛又方陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手剪

去肉中爪甲外用蛇退燒灰雄黃

壹錢

爲末乾摻或香油

調敷

又方

輕粉

乳香

沒藥

各壹錢

黃丹

貳錢

赤石

脂五錢

寒水石

叁錢

共爲末濕則乾摻乾則油調最妙

又方甘草嚼融厚敷乾則隨換數日全愈神效

又方見頭部頭角太陽生瘡方

灌甲初起

用磁鋒於甲上刨去一層並用枯礬末敷之其效如神

油灰指甲

每日取鳳仙花

又名指花

連根蒂葉搗敷指甲上用布包好

一日一換月餘乃愈此林屋山人方也

指頭麻木痛癢

取蜒蚰

查藥物備要便知

和銀硃共搗擦之若延遲不治必生蛇



南京中医药大学图书馆藏

頭蛀節等疔痛苦難受初起多擦幾遍決不生矣

又衣指頭畏冷

天氣不寒指尖作冷名曰螺瘡用醋和鹽調勻將指頭泡

入自愈

主手足指頭羅紋生瘡

生橄欖核

有鹽者煮去鹽味用

切兩段醋磨鷄毛蘸搽二十日後漸

消

此各指節生瘡

名曰蛀節生黃豆嚼融敷

須先漱

口再嚼即愈

各指甲下生瘡



名曰蛙甲治與上蛙節同

十指節斷壞惟有筋連蟲出長數尺遍身綠毛

此名血餘症用

赤茯苓

白茯苓

胡黃連

各錢半

煎服

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍若不早

治卽爛入手

大指二指間爲虎口又名叉指

生蒲公英搥融敷之數日卽愈

又方

生黃豆嚼融敷

將口漱淨再嚼

甚效

又方

通草爲末用雞蛋清調敷其腫卽消

又方

白芨

叁錢研末蟾酥壹錢

共研雞蛋清搽神效

又方

白芷

滑石

黃丹各等分研極細末敷之神效

此等手子枝痛不可忍曰并盤用生桐子灰中根

通草研末生雞蛋白調敷即愈如不愈更敷如

用發手指縫觸着紙角衣角痛癢破爛

雖癢極難受斷斷不可抓擦務必忍住並忌沾水數日自

好倘一經抓擦則纏綿難愈用神白芷煎黃丹 滑石各

等分研極細末敷之神效或用玉真散見跌打損傷門敷之亦極

更效手指斷落

方見卷十五跌打損傷門之輒效如用白掛膏見跌打損傷門

手被咬傷

方見卷十三人畜蛇蟲咬傷門蘇頌謂蘇頌不曰內必

金方新編 卷二 手部

石



中國醫藥大學圖書館藏

手足及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已內必育

手蟲

猪肝切片和桃葉槌融敷之神效或用白油膏貼之

更妙

手指手掌皮厚如鐵

苦參酒煎服外用苦參末酒敷極效如神

掌中紅絲斷之血流不止

用燈火燒之自能漸收平愈

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

此名穿掌又曰擎疽又曰托盤用生附子切片貼之或用



南京中医药大学图书馆