

科卷四

傷寒論附乳子傷寒傷風論傷暑論傷濕論
傷食論附食積霍亂論瘧疾論
破傷風附癰疹赤白遊風丹毒黃水瘡頭面諸瘡天泡瘡露丹
楊梅證論附疔瘡癰癰時毒流注天蛇毒附湯火便方

金匱啟鑰

金匱啟鑰幼科卷四

澠江黃朝坊妙山韓著

傷寒論 附乳于傷寒

傷寒原同一病。而乳于與小兒。治各有異。何也。蓋曰。小兒八歲以後。氣血充足。經脈完固。傷寒與強冠同治。乳于筋骨柔脆。傷寒初入太陽。即人事昏沉。渾身壯熱。筋脈牽強。醫不詳辨。誤指驚風。其禍立至。所以乳于傷寒。貴于急治。是以歷古調治。辨症既不繁雜。用方亦甚簡約。倘遷延時日。則無力耐之矣。所以與小兒論治不同也。特吾參考群書。議論雜出。而得其宗者。惟集成一書。今并宗之。試詳論治。明

者察之。稽夫經義。凡治小兒傷寒。仍自表達裡。先皮毛。次肌肉。又次筋骨腸胃。絲毫不爽。其始也。先從大陽寒水。一經有惡風惡寒頭痛脊強等症。寒鬱皮毛。是爲在表。脈浮緊無汗。是爲傷寒。麻黃湯發之。得汗卽解。脈浮緩有汗。爲傷風。以桂枝湯散之。汗止卽解。大陽旣罷。無頭痛惡寒。脈又不浮。爲表症罷。而在中。乃陽明。少陽之間。脈不浮不沉。則在乎肌肉之間。皮毛之下。然有二焉。若微洪而長。陽明脈也。外症鼻乾不眠。用葛根解肌。脈弦而數。少陽脈也。外症脇痛耳聾口苦寒熱往來。以小柴胡湯和之。蓋陽明少陽不從標本。從乎中治。若有一毫惡寒邪尙在表。雖入中。還當兼散邪。若邪在陽明。則解肌邪。

之間所謂陽明胃府病也。與經病不同。蓋陽明經病已罷。至此傳入
脈中之胃府矣。若脈沉寔有力。外症不惡寒而反惡熱。譫語大渴。六
七日不大便。皆腸胃燥寔致之。輕則用大柴胡湯。重則用大承氣湯。
大便通而熱自愈矣。至若寒邪直入三陰之經。名曰直中三陰。乃三
陽主氣已衰。無熱拒寒也。故初起而卽手足厥冷。或戰慄。踰臥不渴。
或腹痛。嘔吐瀉痢。或口吐涎沫。而如刀割。不發熱而脈沉遲無力。此
不從陽經傳入。同治之例。更當看外症如何。輕則用理中湯。重則用
薑附湯。四逆湯治之。雖然。不可概論矣。症有反平常者。如發熱面赤。

煩燥揭衣去被飲命脈大非陽症乎乃多投涼劑而死者何也。內有
伏陰也。切其脈不論浮沉大小必指下無力。按之筋骨之間皆然。甚
者服一切茶湯及葯皆吐。此陰盛格陽。乃白通湯加人尿猪胆汁症。
仲景將傳經直中並論。正謂有陰症似陽。陽症似陰耳。如大陽症頭
痛發熱。營脈浮而反沉。又似少陰矣。故用麻黃附子細辛湯。少陰症
脈沉應無熱而反發熱。又似大陽矣。須用甘草干薑附子湯。陰症四
肢厥逆而陽症亦有厥逆。此四逆湯與四逆散不同也。陽症下利。陽
症亦有漏底。此理中湯與黃龍湯不同也。總之治小兒傷寒與大人
無甚分別。凡遇脈浮發熱身疼惡寒脊項強而氣喘咳嗽頭痛而四

青龍湯之屬主之。此謂病在表宜發表也。若尺寸俱長。目痛鼻乾。漱水不欲嚥。以葛根湯升麻葛根湯之屬主之。此謂病在肌當解肌也。若脈不浮不沉。往來寒熱。嘔吐脇痛。胸前脹滿。耳聾頭汗盜汗。目眩口苦。以大小柴胡湯主之。此謂病在表當和解也。若脈至沉而有力。潮熱惡熱。腹痛下利。轉失氣。手足心腋下。有汗咽乾。齒燥。目不明。譫語發狂。小腹滿。下利清黃水。不得眠。小便多而自汗。外症頭痛發熱。俱罷。以白虎湯小承氣湯六一順氣湯之屬主之。此謂病在裏宜攻裡也。若脈沉無力。下利清谷。小便清長。四肢厥冷。嘔吐清水。涎沫苛。

惡寒倦卧多眠。蜷縮爪甲青。吐衄乾嘔。舌卷。手足拘急。身體痛如被杖。以理中湯。四逆湯。真武湯。白通湯之類主之。此謂陽微當救裡也。此上言通治小兒傷寒之病也。然此特姑舉大畧。其詳須參前傷寒門治。但有所謂乳子異乎小兒之治者何哉。則又當驗症施方。大凡初起。男體重面黃而帶慘色。女面赤而帶慘色。喘急惡寒。口中氣熱。呵欠煩悶。項急者。爲傷寒。治法風寒者。必偃藏其身於母懷。是爲藏頭伏面。爲表症。可與解肌桂枝。防風湯。如惡熱出頭露面。揚手擲足。煩渴便秘。掀衣氣促者。是爲裡症。畧疎通之。宜小柴胡湯加大黃。中病卽止。若頭額手足口中氣出俱冷。面色闇淡。大便瀉青。此爲陰

宜和解之。宜柴胡白虎湯清之。抑有先傷風寒後傷飲食。或先停飲食後感風寒者。名夾食傷寒。其症壯熱頭痛。暖氣腹脹。大便酸臭。留連不解。宜大柴胡湯下之。體素弱者。以惺惺散主之。此言治孔子之傷寒病也。或有謂小兒八歲以前無傷寒。此則不經之談。集成已詳闕之。茲無容贅。

証治歌

孔子傷寒異小兒。骨節柔脆病難支。初入大腸身壯熱。筋脈牽強症昏迷。誤作驚風端速禍。是宜急治莫游移。日久病延無力耐。古人論

治可詳披厥病仍由表達裡。次在肌肉。先在皮。又次筋骨和腸胃。此
中原不爽毫釐。始自大陽風寒惡。頭痛脊強。證如斯。寒鬱皮毛。爲在
表。傷寒脈與傷風歧。浮緊無汗。傷寒症。麻黃湯進。勿猜疑。傷風有汗。
脈浮緩。止汗湯宜用桂枝。大陽既罷。猶須辨。頭痛惡寒。病早離。脈又
不浮。仍爲表罷。而在中。當細思。此在陽明。少陽界。脈不浮沉。又貴知。
肌肉之間。皮毛下。中有二端。莫混窺。微洪而長。陽明脈。鼻乾不眠。宜
柴葛解肌湯。少陽脈。見弦而數。外症寒熱往來。隨脇痛耳聾。兼口苦。
和解小柴胡湯。最宜。邪在陽明。肌宜解。邪在少陽。和解是成規。病猶
未退。傳裡熱。脈沉不浮。宜審之。陽明經病原已罷。脈中胃府已傳施。

寔羅輕則大柴胡湯可用重則大承氣湯莫辭直中三陰陽氣敗初

起厥冷在四肢戰慄踈卧兼不渴腹痛嘔吐瀉瘕危口吐涎沫身不

熱脈無力兮并沉遲重用薑附湯四逆輕用理中湯可醫症有似陽

涼反死內有伏陰理可推陰盛格陽白通湯妙人尿猪胆汁加莫遺

大陽反似少陰脈麻黃附子細辛湯持少陰反似大陽症甘草干姜

附子奏勳奇陰陽俱有厥逆證四逆湯散各分司陽症下痢陰漏底

理中湯黃龍湯亦差池小兒母以成人治憑脈施方古法垂脈浮發

表桂枝好麻黃湯青龍湯可挽頽尺寸俱長肌宜解升麻葛根效可

金匱要略卷四少陰篇第五

期不浮不沉和解妙。大柴胡湯有必需。沉而有力病在裏。小承氣湯

白虎湯六一順氣湯。齊沉而無力宜救裏。理中湯真武湯解人頤。或

投白虎湯與四逆湯。傷寒門悉可參稽。孔子原與小兒異。初起男女

不同達。男則面黃女面赤。俱帶慘色不揚眉。喘急惡寒口中氣熱。呵

欠煩悶項急弛。此為傷寒尋治法。表裏虛實圖。維伏面藏頭為表

證。解肌桂枝防風湯一卮。惡熱出頭揚手足。煩渴便閉復掀衣。氣促

為裡症。大柴胡湯加入大黃其庶幾。頭額手足口中氣俱冷。面色

闇淡不怡怡。大便瀉青為何症。陰症裏虛此其時。葯當救裏方為妙。

理中湯進定無疵。大熱口渴兼自汗。表裏定為定熱。羈柴胡白虎湯

食傷寒症壯熱頭痛氣欬。大便酸臭兼腹脹。大柴胡湯。
體素弱者惺惺散。通治乳子法堪依。
進我心夷。

方

麻黃湯

麻黃

桂枝

杏仁

炙草

右水煎熱服。

桂枝湯

桂枝半斤

白芍仁

生薑半斤

紅棗枚五

炙草一

右水煎熱服得微汗不可大汗

葛根解肌湯

葛根

麻黃

桂枝

芍藥

炙甘草

生薑

紅棗

黃芩

右等分水煎服

大承氣湯

莊黃

厚朴

枳實

芒硝

右加生薑水煎熱服

薑附湯

附子 乾薑

右等分水煎。冷服。

四逆湯 卽薑附湯加炙草

白通湯 卽薑附湯加葱白三莖。濃煎。冷服。

麻黃附子細辛湯

麻黃 熟附子 細辛

右等分水煎。冷服。

甘草干薑附子湯 卽前四逆湯

四逆散

柴胡

白芍

枳實

炙草

右等分。水濃煎。熱服。

黃龍湯

柴胡

三小

黃芩

炒

赤芍

炙草

各二小

右加生薑三片。大棗三枚。水煎。熱服。

大青龍湯

麻黃

熟石羔

各二小

桂枝

一小

杏仁

五粒

炙草

四小

右加老生薑一錢。大棗一枚。水煎。溫服。惟恐汗多。

小青龍湯

麻黃

桂枝

白芍

各一分

炙草

干薑

細辛

分

五味

十二半夏

姜水製二分

右水煎溫涼得所徐服。

葛根湯

干葛

一分

赤芍

桂枝

炙草

各六分

麻黃

去節一分

葱白

三莖

老生薑

三大棗二枚

右水煎熱服

升麻葛根湯

升麻

干葛

赤芍

炙草

右等分水煎熱服。

白虎湯

熟石膏三斤

知母二斤

炙甘草一斤

右加梗米一撮水煎熱服。

小承氣湯

莊黃二斤

芒硝一斤

桂枝一斤

桃仁十粒

炙甘草一斤

右水煎空心熱服。凡用三承氣湯須以手按病人白胸至小腹。果

有硬處手不可近。又看其舌之燥滑何如。然后分別當急下者。

又大承氣湯可與少者小承氣湯宜微和胃氣者。調胃承氣湯。