

重修植物名實圖考

小野職懿重修
水類

世三下

衛矛



木葉堅實，冬不凋落，有刺，葉背有紅斑，大樹，果

紅，山溪旁，八月，十月，十二月，果熟，葉紅

令，葉背有紅斑，果熟，葉紅，果熟，葉紅

令，葉背有紅斑，果熟，葉紅，果熟，葉紅

令，葉背有紅斑，果熟，葉紅，果熟，葉紅

令，葉背有紅斑，果熟，葉紅，果熟，葉紅

令，葉背有紅斑，果熟，葉紅，果熟，葉紅

令，葉背有紅斑，果熟，葉紅，果熟，葉紅

令，葉背有紅斑，果熟，葉紅，果熟，葉紅

令，葉背有紅斑，果熟，葉紅，果熟，葉紅

令，葉背有紅斑，果熟，葉紅，果熟，葉紅

令，葉背有紅斑，果熟，葉紅，果熟，葉紅

令，葉背有紅斑，果熟，葉紅，果熟，葉紅

衛矛

衛矛、本經中品、卽鬼箭羽、湖南俚醫、謂之六月凌、用治腫毒、按圖經、曲節草、有六月凌、綠豆青諸名、此木、春時枝葉極嫩、結實如冬青而色綠、性味苦寒、殆卽一物、

〔長篇〕本草經、衛矛、味苦寒、主女子崩中、下血、腹滿汗出、除邪、殺鬼、毒蠱、疰、一名鬼箭、

別錄、無毒、中惡、腹痛、去白蟲、消皮膚風毒腫、令陰中解、生霍山山谷、八月採陰乾、陶隱居云、山野處處有、其莖有三羽、狀如箭羽、俗皆呼爲鬼箭、而爲用甚稀、用之、削去皮羽、

圖經、衛矛、鬼箭也、出霍山山谷、今江淮州郡、或有之、三月以後、生莖、苗長四五尺許、其幹有三羽、狀如箭翎、葉亦似山茶、青色、八月十一月十二月、採條莖陰乾、其木亦名狗骨、崔氏方、療惡疰在心、痛不可忍、有鬼箭羽湯、集驗方、療卒暴

心痛、或中惡氣、毒痛、大黃湯、亦用鬼箭、皆大方也、
本草綱目、李時珍曰、鬼箭、生山石間、小株成叢、春長嫩條、條上四面有羽、如箭
羽、視之若三羽爾、青葉、狀似野茶、對生、味酸澁、三四月、開碎花、黃綠色、結實、大
如冬青子、山人不識、惟樵採之、

梔子



梔子

梔子、本經中品、卽山梔子、以染黃者、以七棱至九棱者爲佳、

〔長篇〕本草經、梔子味苦寒、主五內邪氣、胃中熱氣、面赤酒皰、皸鼻、白癩、赤癩、瘡瘍、一名木丹、

別錄、大寒無毒、療目熱赤痛、胸心大小腸大熱、心中煩悶、胃中熱氣、一名越桃、生南陽川谷、九月採實暴乾、陶隱居云、解玉支毒、處處有、亦兩三種、小異、以七棱者爲良、經霜乃取之、今皆入染用、於藥甚稀、玉支卽羊躑躅也、

圖經、梔子生南陽川谷、今南方及西蜀州郡皆有之、木高七八尺、葉似李而厚硬、又似樗蒲子、二三月生白花、花皆六出、甚芬香、俗說、卽西域薝蔔也、夏秋結實、如訶子狀、生青熟黃、中仁深紅、九月採實暴乾、南方人競種以售利、貨殖傳云、梔菑千石、亦比千乘之家、言獲利之博也、此亦有二三種、入藥者山梔子、方書所謂越桃也、皮薄而圓、小刻房、七棱至九棱者爲佳、其大而長者、用作染色、


又謂之伏尸梔子、不堪入藥用、張仲景傷寒論、及古今諸名醫治發黃、皆用梔子、茵陳、香豉、甘草等四物、作湯飲、又治大病起、勞復、皆用梔子、鼠矢等湯、並小利而愈、其方極多、不可悉載、梔子亦療血痢、挾毒熱下者、葛洪方、以十四枚、去皮、搗蜜丸、如梧子、三丸、日三服、大效、又治霍亂轉筋、燒梔子三枚、末服、立愈、時行重病後、勞發、水煮十枚、飲汁溫臥、微汗乃愈、挾食、加大黃、別煮汁、臨熟內之、合飲、微利遂差、

本草綱目、李時珍曰、梔子葉如兔耳、厚而深綠、春榮秋瘁、入夏開花、大如酒盃、白瓣黃蕊、隨即結實、薄皮細子、有鬚、霜後收之、蜀中有紅梔子、花爛紅色、其實染物、則赭紅色、

諸番志、梔子花、出大食、啞巴閑囉施美二國、狀如中國之紅花、其色淺紫、其香清越、而有醞藉、土人採花曬乾、藏之琉璃餅中、花亦希有、即佛書所謂薝蔔是也、

廣雅疏證、梔子梔桃也、說文云、梔黃木可染者也、梔與梔同字、一作卮、漢書貨殖傳云、千畝卮茜、孟康注云、茜草卮子可用染也、述異記云、洛陽有卮茜園、漢官儀云、染園出卮茜、供染御服、是其處也、又名鮮支、史記司馬相如傳云、鮮支黃礫、索隱引司馬彪云、鮮支卽今支子也、支與梔亦同、又名林蘭、謝靈運山居賦、林蘭近雪而揚猗、自注云、林蘭支子也、神農本草云、梔子一名木丹、生南陽川谷、名醫別錄云、一名越桃、九月採實、陶注云、處處有、亦兩三種、小異、以七棱者爲良、經霜乃取之、今皆入染用、於藥甚稀、御覽引吳普本草云、支子葉兩頭尖、如檮蒲、剝其子、如鹽而黃赤、酉陽雜俎云、諸花少六出者、惟梔子花六出、陶真白言、梔子翦花六出、刻房七道、其花香甚、相傳卽西域膽蔔花也、

枳實



枳實

枳實、本經中品、橘踰淮而北爲枳、或云、江南亦別有枳、蓋卽橘之酸酢者、以別枸橘耳、補筆談、辨別枳實枳殼、極晰、

〔長篇〕本草經、枳實味苦寒、主大風在皮膚中、如麻豆、苦痒、除寒熱結、止痢、長肌肉、利五臟、益氣輕身、

別錄、酸微寒、無毒、除胸脅痰癖、逐停水、破結實、消脹滿、心下急痞痛、逆氣、脅風痛、和胃氣、止清洩、明目、生河內川澤、九月十月採陰乾、陶隱居云、今處處有、採破令乾用之、除中核微炙、令香、亦如橘皮以陳者爲良、枳樹莖及皮、療水脹、暴風、骨節痛急、枳實俗方多用、道家不須、

唐本草註、枳實日乾、乃得陰便濕爛也、用當去核及中瓢、乃誤、今或用枳殼、爾、若稱枳實、須合核瓢用者、殊不然也、

圖經、枳實生河內川澤、枳殼生商州川谷、今京西、江湖州郡、皆有之、以商州者

爲佳如橘而小、高五七尺、葉如楫、多刺、春生白花、至秋成實、九月十月採陰乾、舊說七月八月採者爲實、九月十月採者爲殼、今醫家多以皮厚而小者爲枳實、完大者爲殼、皆以翻肚、如盆口脣狀、須陳久者爲勝、近道所出者、俗呼臭橘、不堪用、張仲景治心下堅大如盤水飲、所作枳實朮湯主之、枳實七枚、朮三兩、以水一斗、煎取三升、分三服、腹中軟卽稍減之、又胸痺、心下痞堅、留氣結胸、胸滿、脅下逆氣搶心、枳實薤白湯主之、陳枳實四枚、厚朴四兩、薤白半斤、切括樓一枚、桂一兩、以水五升、先煎枳實厚朴、取二升、去滓、內餘藥於湯內、煎三兩沸、分溫三服、當愈、又有橘皮枳實湯、桂生薑枳實湯、皆主胸痺、心痛、葛洪治卒胸痺痛、單用枳實一物、搗末、服方寸匕、日三夜一、其根皮治大便下血、末服之、亦可煮汁常飲、又治卒中急風、身直不得屈伸反覆者、刮取枳木皮屑、謂之枳茹、一升酒三升、漬一宿、服五合、至盡再作良、

補筆談、六朝以前醫方、唯有枳實、無枳殼、故本草亦只有枳實、後人用枳之小

嫩者爲枳實、大者枳殼、主療各有所宜、遂別出枳殼一條、以附枳實之後、然兩條主療、亦相出入、古人言枳實者、便是枳殼、本草中、枳實主療、便是枳殼主療、後人既別出枳殼條、便合於枳實條內、摘出枳殼主療、別爲一條、舊條內、只合留枳實主療、後人以神農本經、不敢摘破、不免兩條相犯、互有出入、予按神農本經、枳實條內稱、主大風在皮膚中、如麻豆、苦痒、除寒熱結、止痢、長肌肉、利五臟、益氣輕身、安胃氣、止瀉泄、明目、盡是枳殼之功、皆當摘入枳殼條、後來別見主療、如通利關節、勞氣、欬嗽、背膊悶倦、散留結、胸脇痰滯、逐水、消脹滿、大腸風、止痛之類、皆附益之、另爲枳殼條、舊枳實條內稱、除胸脇痰癖、逐停水、破結實、消脹滿、心下急痞痛、逆氣、皆是枳實之功、宜存於本條別、有主療亦附益之可也、如此、二條始分、各見所主、不至甚相亂、

枳殼

嘉祐本草、枳殼味苦酸、微寒無毒、主風痺、麻痺、通利關節、勞氣、咳嗽、背膊悶倦、散留結、胸膈痰滯、逐水、消脹滿、大腸風、安胃、止風痛、生商州川谷、九月十月採陰乾、

本草拾遺、根皮主野雞病、末服方寸匕、本經採實、用九月十月、不如七月八月、既厚且辛、舊云、江南爲橘、江北爲枳、今江南俱有枳橘、江北有枳無橘、此自別種、非于變易、

本草綱目、李時珍曰、枳實枳殼、氣味功用俱同、上世亦無分別、魏晉以來、始分實殼之用、潔古張氏、東垣李氏、又分治高治下之說、大抵其功皆能利氣、氣下則痰喘止、氣行則痞脹消、氣通則痛刺止、氣利則後重除、故以枳實利胸膈、枳殼利腸胃、然張仲景治胸痺痞滿、以枳實爲要藥、諸方治下血、痔痢、大腸祕塞、裏急後重、又以枳殼爲通用、則枳實不獨治下、而殼不獨治高也、蓋自飛門至

臍門、皆肺主之、三焦相通、一氣而已、則二物分之可也、不分亦無傷、杜壬方載、湖陽公主、苦難產、有方士、進瘦胎飲、方用枳殼四兩、甘草二兩、爲末、每服一錢、白湯點服、自五月後、一日一服、至臨月、不惟易產、仍無胎中惡病也、張潔古活法機要、改以枳朮丸、日服令胎瘦、易生、謂之束胎丸、而寇宗奭衍義言、胎壯則子有力、易生、令服枳殼藥、反致無力、兼子亦氣弱難養、所謂縮胎易產者、大不然也、以理思之、寇氏之說、似覺爲優、或胎前氣盛壅滯者、宜用之、所謂八九月胎、必用枳殼蘇梗以順氣、胎前無滯、則產後無虛也、若氣稟弱者、卽大非所宜矣、

棟



棟

棟、本經下品、處處有之、四月開花、紅紫可愛、故花信有棟花風、湘陰志、苦棟、掘溝埋之、可成棟城、植當風處、可辟白蟻、

〔長篇〕本草經、棟實味苦寒、主溫疾、傷寒、大熱、煩狂、殺三蟲、疥瘍、利小便水道、別錄、有小毒、根微寒、療虬蟲、利大腸、生荆山山谷、陶隱居云、處處有之、俗人、五月五日、皆取葉佩之、云辟惡、其根以苦酒磨塗疥、甚良、煮汁作醃、食之、去虬蟲、唐本草註、此有兩種、有雄有雌、雄者根赤、無子、有毒、服之多使人吐不能止、時有至死者、雌者根白、有子、微毒、用當取雌者、

圖經、棟實卽金鈴子也、生荆山山谷、今處處有之、以蜀川者爲佳、木高丈餘、葉密、如槐而長、三四月開花、紅紫色、芳香滿庭間、實如彈丸、生青熟黃、十二月採實、其根採無時、此種有雌雄、雄者根赤無子、有大毒、雌者根白有子、微毒、嘗用雌者、俗間謂之苦棟子、韋宙獨行方、主蟻蟲、攻心如刺、口吐清水、取根剉、水煮

令濃赤黃色、以汁合米、煮作糜、隔宿勿食、來旦後、一匕爲始、少時復食一匕半、糜便下蟻、臨川人苦消渴、累歲、更十名醫、不效、嘗坐茶坊、見道人行乞、漫呼與茶、又且飯、問其有何術、曰、無所能、只收得幾道藥方耳、主人喜、復問有治消渴方乎、曰、正有之、用苦楝根新白皮一握、切焙、入麝香少許、以兩盞水、煎一半、空心飲之、雖困頓一二日、然疾可愈、乃延留之、按方服藥、下蟲三四條、狀如蛔、而具紅色、以語道人、道人曰、尚有食蟲三條、不必再服、恐取盡、則困不可支、自此渴頓止、臥而將理、再宿脫然、

齊民要術、以楝子於平地耕熟、作壟種之、其長甚疾、五年後、可作大椽、北方人家、欲構堂閣、先於三五年前種之、其堂閣欲成、則楝木可椽、

爾雅翼、楝木高丈餘、葉密、如槐而尖、三四月開花、紅紫色、芬香滿庭、其實如小鈴、至熟則黃、俗謂之苦楝子、亦曰金鈴子、可以練、故名楝、淮南子、記十二月之