

四庫

全書

四庫全書

全書

第七五八冊

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

四庫全書

普濟方(二)

明朱橚撰……………一

卷十五八冊

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百三十六

詳校官金匱院醫官 汪 養 最

編修 臣 倉 聖 脈 覆 勘

總校官 進士 臣 楊 樵 珩

校對官 中書 臣 吳 甸 華

謄錄監生 臣 張 魯 秀

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六 明 周王朱楠 撰

姪 娠 諸 疾 門

附 論

夫有夫婦則有父子婚姻之後必求嗣續故聖人謂不
孝有三無後為大者言嗣續之至重也凡欲求子當先
察夫婦有無勞傷故害之屬俟方調治便內外和平則
夫婦人樂有子矣 素問云天地者萬物之父母也陰

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

陽者血氣之男女也有夫婦則有父母婚姻之後則有
生育生育者人倫之本也且男女之合二情交暢陰血
先至陽精後銜血開聚精陰外陽內陽精先至陰血後
生精開聚血陽外陰內陰含陽胎而女形成矣陽含陰
胎而男形成矣若夫受形之異者男女必當其年男子
二八精氣溢瀉必三十而娶女子二七天癸至必二十
而嫁欲其二氣充實然後交合而孕孕而育育而壽
儻若婚嫁不時真氣早泄未完而傷是以交而不孕孕

欽定四庫全書

卷三百三十六

三

而不育育而不壽者多矣以此觀之男女婚嫁貴乎及時夫婦貴乎益壯則易於受形也且父少母老生女必羸母壯父衰生男必弱誠有斯理或男子真精氣不濃婦人血衰而氣旺是謂夫病婦疼皆使人無子治療之法女子當養血抑氣以減喜怒男子益腎生精以節嗜欲依方調治陰陽平和則婦人易有子矣 又曰無子者蓋有三馬一者墳墓不嗣二者夫婦年命相尅三者夫病婦疼皆令無子若是墳墓不嗣年命相尅此二者非藥能益若夫病婦疼須用藥餌乃能有効也然婦挾疾無子皆由勞傷血氣生病或月經閉澀或崩泄帶下致陰陽之氣不和經血不行乖候故無子也診其右手關後尺脉浮浮則為陽陽脉絕無子也尺脉為瀉中年得此為絕產也少陰脉如浮緊則絕產後惡寒尺寸俱微弱者則絕產也又有因將攝失宜飲食不節乘風取冷或傷過度致冷風之氣乘其經血結於子臟結冷故令無子也 凡婦人二三十而無子經血如常或有時經血不

欽定四庫全書

卷三百三十六

三

調者乃陰不升而陽不降此上下不得交通有所滯礙不能為用故也可用獨聖散瀉訖寒痰三二升後用導水九禹攻散泄三五行或十餘行單用無憂散泄十行處寒熱虛實用之次服葱白粥三五日胃氣宜通腸中得實可服玉燭散更服白朮散茯苓之類降火益水既濟之道當不數月而有孕成胎內經曰婦人有瘕瘕遺溺嗌乾諸證須服妙藥針灸亦終不能孕蓋衝脉腎脉任脉有此病故不孕也 婦人所以無子者衝任不足腎氣虛寒也內經云女子二七天癸至任脉通太衝脉盛陰陽和故能有子若衝任不足腎氣虛寒不能繫胞故令無子亦有本於夫病婦疼者當原其所因而調治之要之男服七子散女服紫石門冬丸及坐導藥鹽胞湯無不有子也

方

秦椒丸

出聖方

治婦人斷緒生來未產盪滌臍臟使玉門受紫精子臟風虛冷氣致陰陽二氣不能和合故

令久無子

秦椒 白朮各三錢沙參 露蜂房 鼠婦 桃仁

卷栢 細辛 白殭蠶 牡蒙 石斛 甘草

蕪荑各一兩牛膝 人參 芍藥 牡丹皮 大黃

桔梗 栢子仁 桂心 玄參 白薇 茯苓

天雄各八錢黃芪 五味子 當歸 白芷 蟾蜍

白欬 乾薑各一兩澤蘭 乾地黃 芎藭各一兩

乾漆 白石英 附子各二兩鍾乳二兩水蛭七枚

欽定四庫全書

普濟方 卷三百三十六

紫石英 蘇布叩復頭燒 蠱蟲一百枚

右為細末蜜為丸如梧桐子大酒服日再稍加至二

十九若有所去如豆汁鼻涕此是病出覺有異日即

停一方無鼠婦

栢子仁九出聖惠方 治婦人子臟虛冷產後續斷無子多

時

栢子仁 澤蘭 防風去蘆 當歸剉碎 白石英細研

水飛厚朴去麁皮塗生薑汁炙香熟 熟乾地黄 牛膝去苗各一兩

杜仲去麁皮炙 乾薑炮製 紫石英細研水飛過 川椒目

炒出汁三分甘草炙微赤細辛 白朮 蕪荑

桂心 赤石脂細研 人參去蘆 石斛去根 桔梗去頭

肉蓯蓉 白芷 龍骨 五味子 白芍藥 藿

本 防葵 白茯苓 鍾乳粉二兩獨活 秦朮

黃芪各一兩

右為末入研藥料多研令勻煉蜜和丸梧桐子大每

服三十九丸空心晚溫酒下

欽定四庫全書

普濟方 卷三百三十六

白薇九出聖惠方 治婦人子風臟虛積冷經絡不調面無

血色肌肉消瘦不能飲食及帶下久無子

白薇 細辛 防風 人參 秦朮 秦椒 白

欬白一兩桂心 牛膝 蕪荑 沙參 芍藥 五

味子 白殭蠶 牡丹 蟾蜍各一兩乾漆 栢子

仁 乾薑 卷栢 附子 芎藭各三錢桃仁 紫

石英各一兩鍾乳 乾地黄 白石英各三兩鼠婦兩

水蛭 蠱蟲各五枚吳茱萸十八枚蘇布叩復頭燒

右為末蜜為丸如梧桐子大酒服十五丸日再稍加至三十九丸當有所去小覺有異即停服

又方

出千金方一名白薇丸

治久無子或斷緒上熱下冷百病

皆治之

白薇 乾地黄 乾薑 車前子 蜀椒 紫石

英 葉本 石膏 菴蘭子 卷柏 各三錢澤蘭

赤石脂 白龍骨 遠志 麥門冬 茯苓 太

乙餘糧 各三兩 當歸 芎藭 蛇床子 白芷 覆

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六

盆子 桃仁 人參 各一兩 桂心 蒲黃 各二兩 細辛

三兩橘皮兩半

右為末蜜和為丸如梧桐子大酒服十五丸日再漸

增以知為度亦可至五十九慎猪鷄生冷酢滑魚蒜

驢馬牛肉等覺有娠即停三月正擇食時可食牛肝

及心至四月五月不用

唐膚丹 出御藥方

治久無子息

黃芪 剉細一兩 人參 上黨者 川續斷 剉 澤蘭葉 去枝熟

地黄 焙 牡丹皮 淨 延胡索 白芍藥 川芎 白

薇 嫩鹿茸 茸去毛酥酒炙乾另研稱 白茯苓 去皮常歸去苗洗切焙乾 防風 去苗葉本去苗淨切炒

乾肉蓯蓉 酒浸軟破切焙乾 蓬莪茂 京三稜 二味和白麵

華細辛 去苗葉土細搗羅過 乾薑 炮製一兩 木香 山茱萸 肉

桂 去麋皮各半 黑附子 炮製去皮臍二錢 甘草 剉 覆盆子 去枝各

右為細末煉蜜和丸如彈子大每服一粒空心食前

二

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六

細嚼溫酒下日進三服有孕住服昔有人常服此藥

而生七男以此常合與人服而皆應也

白薇丸 療百病斷絕緒產

白薇 細辛 厚朴 椒 妙出桔梗 鯊甲 炙各五分

防風 大黃 附子 炮 石硫黃 研各六分 人參 桑上

寄生 各四分 半夏 牡蒙 白殭蠶 續斷 秦朮

紫苑 杜蘅 牛膝 蟲蟲 去翅足熱水蛭 紫石英

研 朴硝 桂心 鍾乳 當歸 各八分

右搗篩蜜丸空心服溫酒下如梧桐子大十五九日

二漸加至三十九不吐不利忌生冷油膩錫生血物

大莧生蔥生菜猪肉冷水粘食陳臭

紫石門冬丸

出聖惠方

治婦人久無子及數經墮胎皆因

衝任之脉虛損胞內宿寒疾經水不時暴下不止

月內再行或月後子宮臟積冷虛羸百病崩漏帶下

三十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小腹急重小便白濁

以上疾症皆令孕育不成以至絕嗣不孕此藥並能

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六

八

主療常服除瘀血溫子臟令有孕臨產易生子及生

子充實無病

紫石英

天門冬

各三兩

當歸

芎藭

紫苑

卷

栢桂心

烏頭

乾地黄

牡蒙

一作牡

禹餘

糧石斛

辛夷

各二兩

人參

桑寄生

續斷

細辛

厚朴

乾薑

食茱萸

牡丹

牛膝

各三兩

針栢仁

一兩

烏賊骨

甘草

各一兩半

右為末蜜和丸如梧桐子大酒服十五丸漸增至三

十九以腹中熱為度不禁房室丈夫出外不可服藥

或溫米飲下空心食前日二服

七子散

出大聖方

治丈夫風虛目暗精氣衰少無子補

不足兼治婦人無子皆因五癆七傷虛羸百病所致

五味子

鍾乳粉

牡荊子

兔絲子

車前子

荊蒿子

石斛

乾地黄

薯蕷

杜仲

鹿茸

遠志

各八兩

附子

蛇床子

芎藭

各六兩

天雄

人參

茯苓

黃芪

牛膝

各五兩

欽定四庫全書

普濟方卷三百三十六

九

肉蓯蓉

一兩

巴戟天

一兩

桂心

一兩

右為末酒服方寸匕日二不瘥增二以知為度禁亦如

藥法不能酒者蜜和丸服亦得一方加覆盆子八銖

女服紫石英丸

紫石英

砂鍋盛之以火焙

禹餘糧

熟地黄

湯洗淨

辛夷仁

紫桂

去皮不

卷栢

石斛

去皮到

斷栢子仁

川烏

炮去

川芎

海螵蛸

醋炒

皮川當歸

去蘆

粉草

炙各

桑寄生

華陰細辛

山藥

吳茱萸

乾薑

人參

天門冬

心

一兩

紫朴

去皮薑

汁蜜炙

右為細末醋糊為丸如桐子大每服七十九至百九

空心米飲吞下以腹中熱為度不禁房事夫出不可

服盡劑當有妊

卷栢丸

治婦人子臟冷久無子由風寒邪氣客於經

絡

卷栢

壯蒙

藁本

當歸

熟地黃

栢子

欽定四庫全書

卷三百三十六

香清方

仁

乾薑

禹餘糧

白薇

人參

五味子

石斛

桂心

附子

芍藥

防風

吳茱萸

湯浸七通

甘草

炙微

牛膝

去

桑寄生

川椒

去目及開口者微炒

去汁以上各三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心及晚食前

以溫酒下三十九

紫石英丸

治婦人久無子由于臟久積風冷陰陽不

能施化

紫石英

細辛

桔梗

厚朴

去皮

薑炙

附

汁炙

防風

川大黃

川椒

若微炒

去汗

附

子

硫黃

白薇

當歸

桂心

各一

驚

甲二兩

牡蒙

人參

桑寄生

半夏

湯洗

去

用

白僵蠶

續斷

紫苑

杜蘅

牛膝

去

各一

兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心及

晚食前溫酒下

養真丸

治婦人血虛氣微陰不升降久不成妊娠

鹿茸

當歸

肉蓯蓉

禹餘糧

兔絲子

覆

盆子

熟地黃

紫石英

桑螵蛸

各二

五味子

覆

真琥珀

白石藥

川芎

桑寄生

卷栢

艾

葉

川薑

堅茯苓

人參

牡蠣

酸棗仁

各

兩

鍾乳粉

兩四

右為末酒煮麵糊丸如梧桐子大食前溫酒吞下五

十九日三服喫後用粥飯壓之

白薇丸 治補調銜任服溫暖子宮治胞絡傷損宿受

風寒久無子或受胎不牢多致損墮久服去下藏風冷令人有子

白薇 去苗 壯蒙 薑本 各五 薑黃 當歸 去苗 熟地

黃 各七 川芎 柏子仁 炒 石斛 去根 桂心 去皮 附子

地 去皮 歸 五味子 去根 防風 去苗 甘草 炙 牛膝 去苗 酒

菜 湯 桑寄生 各六 秦椒 分 禹餘糧 分

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心酒下三十九日二

欽定四庫全書

普濟方 卷三百三十六

服忌生菜葱熱麵蕎麥蒜猪肉炙烤葵菜無忌松菜

海藻粘食臭物一方有紫參無壯蒙米飲亦得纔覺

妊娠即住服已懷孕者尤不宜服之

白薇丸 治婦人無子斷緒上熱下冷飲食減退肢體

黃痺凡有一切疾病皆主之

白薇 熟地黃 川椒 去目及開口 白龍骨 各一

車前子 當歸 炒 芎藭 蛇床子 細辛 乾

薑 地 梨 刺 藟 本 桂心 卷栢 白芷 覆盆子

菖蒲 人參 去苗 桃仁 湯洗去皮尖 白茯苓

遠志 去心 各 麥門冬 去心 焙

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心

及晚食前溫服

續嗣降生丹 治婦人稟受氣弱胎臟虛損子宮冷億

血寒痼冷難成子息功效如神

當歸 桂心 龍齒 烏藥 真天台 益智 杜仲

石菖蒲 吳茱萸 各一 茯神 川牛膝 秦艽

欽定四庫全書

普濟方 卷三百三十六

細辛 苦桔梗 半夏 防風 白芍藥 各三 乾

薑 生 兩半 川椒 三兩 湯泡 附子 一隻 重八錢 者 臍

大入 珠砂 一錢 壯蠟 用童子小便浸四十九日 五

日一換 取出 用硫黃末 一兩半 醋塗 通却 用度 煎

聚 又用 米醋 浸令 熟 溫 鹽 泥 厚 固 濟 乾 用 炭 五 煎

右為細末取附子入內珠砂別研為細末糯米糊為

丸如梧桐子大每服三十九至百丸空心吞淡醋溫

酒鹽湯俱可送下一日二服 此藥兼療男子精氣

不固陽事衰弱白濁夢泄及治婦人血虛帶下肌瘦
寒熱但是男女諸虛百損客熱盜汗氣短乏力面無
顏色飲食少味並皆治之更有奇效難以具述君子
宜預行善事調服此藥無不感應

秦桂丸 出在本方 治婦人無子

秦朮 桂心 杜仲 防風 牡丹皮 厚朴 薑汁
附子 陽起石 服 白茯苓 各一兩 白薇 人參

卷栢 鹿茸 各一兩 細辛 二分

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

五

右各為末以蜜和丸如梧桐子大每服三四十九溫
酒下食前服

朴硝鹽胞湯 出理惠方 治婦人破身以來全不產及斷緒

久不產三十年者

朴硝 牡丹皮 當歸 大黃 桃仁 生用全細

辛 厚朴 炙 桔梗 人參 赤芍藥 茯苓 桂

心 甘草 炙 牛膝 橘皮 各二兩 附子 六錢 蟲 去翅

熱 水蛭 各十枚

炙

右咬咀以清酒五升水五升合煮取三分四服日

三夜一每服相去三時更服如常覆被取少汗不出

冬日著火籠之必下積血及冷赤膿如赤小豆汁蓋

為婦人子宮內有此惡物使然或天陰臍下痛或月

水不調為有冷血不受胎若斟酌不盡氣力弱大因

不堪更服亦可二三服即止如大悶不堪可食酢飯

冷漿一口即止然恐去惡物不盡不大得藥力若能

忍服盡大好一日後仍著坐蓮藥一方不用桔梗甘

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

五

草一方無水蛭

白薇丸 出千金方 治月水不利閉塞絕產十八年服此藥

二十八日有子金城太守方

白薇 細辛 各三錢 人參 杜蘅 牡蒙 厚朴

半夏 白殭蠶 當歸 紫朮 各十錢 牛膝 沙參

乾薑 秦朮 各半兩 蜀椒 附子 防風 各一兩

右為末蜜和為丸如梧桐子大先食服三九不知稍

增至四五九此藥不可常服覺有娠即止用之大驗

一方有桔梗丹參十八錄

助陽丹 治婦人無子月經不調蓋因腹脇疼痛血塊
血癖所以不能成胎先服當歸六合散空心煎十餘
服先去敗露腹肚不疼可服助陽丹十五服必然成
胎有一婦人三十七歲無子服此藥半月有子

細辛 防風 茱萸 川椒 白芷 白欬 乾

薑 茯苓 各一兩 牛膝 秦艽 附子 陳皮 石

菖蒲 厚朴 沙參 人參 桂心 各七錢五分

欽定四庫全書

香濟方
卷三百三十六

六

右為細末煉蜜和丸如紅豆大每服十九溫酒下日

進三服尅日見效男子服能補益婦人服之有子覺

有孕不可服婦人無夫者不可服用子平日修合忌

鷄犬孝服每月經後三五日淨一舉便成亦可延年

益壽

凡人家園圃內有凌霄花婦人聞其氣不孕宜服七子

丸出便產須知

五味子 一兩 兔絲子 一兩 先去灰却用酒浸韭子

炒 覆盆子 一兩 去蛇床子 一兩 黑附子 一兩 鹿茸 一兩

茯苓 半兩 原蠶 一兩 肉蓯蓉 一兩 乾泡 一兩 鹿茸 一兩

酒炙去 益志子 一兩 黃芪 半兩 遠志 半兩 陽起

石 一兩 酒煎 熟地黃 一兩 湯洗 酒拌熱蒸

右為細末酒煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七十

九空心鹽酒或鹽湯下弱甚者加天雄半兩泡去皮

脚腰痠痛者加杜仲一兩去皮薑汁炒去絲石斛一

兩去根

欽定四庫全書

香濟方
卷三百三十六

十七

治婦人久無子息大有神效

茯苓 桂心 川芎 人參 當歸 各二兩 細辛 二兩

沉香 五味子 各一兩 牛膝 沙參 白薇

琥珀 各半兩 川烏 一兩 蜜 一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十九溫酒

下醋湯亦得日進二服

杜蘅丸 治婦人腹臍久積風冷血氣凝滯不能宣通

故令無子

杜蘅 附子 泡梨去皮 細辛 各一 防風 去蘆 白茯苓 各一

兩 白薇 牛膝 去苗半夏 湯洗七通 沙參 去蘆 秦艽

去桂心 川椒 去目及開口 薑汁 藁本 蛇床

子 各半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心

及晚食前溫酒下有子即住服

杜蘅丸 治婦人無子斷緒

杜蘅 洗曝乾 三月三日 半夏 湯洗二十通 白薇 桔梗

欽定四庫全書

普濟方

卷三百三十六

附子 泡梨去皮 牛膝 切酒浸 細辛 去苗 蜀椒 合

口并目 厚朴 去蘆皮 薑汁 炙 沙參 去蘆 防風 乾薑 炮 桂

去蘆皮 各半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服溫酒下三十九

漸加五十九早晨日午各一服

吉祥丸 出金方 治婦人積年不孕

天麻 柳絮 丹皮 茯苓 乾地黄 桂心 各一

兩 五味子 桃花 白朮 芎藭 各二 覆盆子 一斗

桃仁 一百枚 兔絲子 楮實子 各一

右為末煉蜜和丸如菉豆大每服空心以苦酒下五

九日中一服晚一服

秦桂丸 一名金斯丸 出大 全良方 治婦人無子服有效危氏方

秦艽 去蘆 桂心 不見 杜仲 去皮 薑 防風 厚朴 各三

附子 生去皮 薑 白茯苓 各一 白薇 乾薑 炮 沙參

牛膝 酒浸 半夏 各半 人參 各一 細辛 二分

右為末煉蜜為丸如赤豆大每服三十九空心食前

欽定四庫全書

普濟方

卷三百三十六

醋湯米飲任下未效加丸數已覺有孕便不可服用

溫酒下亦得昔金城太守范羅進此方云甚驗若服

藥四十日無子請戮臣一家以為天下醫人戒其方

因張伯高學士傳云此藥諸士夫服後俱有應驗就

藥緘上書刊二句云修合者用意以誠服餌者存心

以仁不患無子也 服此如覺無益稍加丸數為度

如服七日後陰陽覺有娠此藥與前大子中含字文

妻李氏年四十歲無子服此藥十三日有娠此藥

斯九屢用屢驗此方不可不廣傳與人夫不在不可服

扶血九 治婦人無子

紫石英

桑螵蛸

李熱艾

醋炙

卷柏

覆盆子

阿膠

炒包金土

各一

栢子仁

二錢

陽起石

熟地

黃一兩

牡蠣

二兩

磁石

二兩

右為末以糯米粥九如梧桐子大每服三四十九酒

吞下

欽定四庫全書

卷三百三十六

禹餘糧湯 治婦人胞胎寒冷絕產無子

禹餘糧

七兩

白蠟

去黑

烏賊骨

去甲皮

龍骨

桂

去麋

竈下黃土

無灰

石韋

乾薑

滑石

赤芍藥

半斤

藥水浸一宿

生薑汁

代赭

研

右搗篩

每服三錢

匕水一盞

生薑三片

煎至六分

去

淳食前溫酒服

陽起石九

出危

治丈夫真精氣不濃不能施化是以

無子

陽起石

火煨

鹿茸

去毛

兔絲子

水淘淨酒浸

天雄

地

韭子

炒肉蓯蓉

酒浸

覆盆子

根桑寄生

沉香

別

原蠶蛾

酒

五味子

右為細末酒煮糯米糊為丸如梧桐子大每服七十

丸空心鹽湯或溫酒下

紫石英九

出大全

紫石英

阿膠

當歸

川芎

赤芍藥

川續

欽定四庫全書

卷三百三十六

斷

各一

鹿茸

白朮

桂心

栢子仁

黃三

右為末煉蜜為丸如梧桐子大空心溫酒下二十九

兼治虛中有熱頭眩暈足如履空嘔吐不食月水不

調或多或少皆虛症也久服能生髮令有子更治虛

悸常若憂思皆心血不足空虛所致也

調經散

出便產

療月候不調或在月前或在月後或

多或少或逾月不至或一月兩來以此不孕

吳茱萸

一兩去閉目者
湯洗過三次

半夏

一兩湯洗七次

當歸

一兩酒洗去蘆

人參

麥門冬一兩
半

白芍藥

者南

川芎

色如丹皮
服者

去厚朴
見火

阿膠

如神粉炒
甘草一兩

右咬咀每服三錢水一盞半生薑五片煎至八分去

滓食前稍熱服月候調月月如期而來按時而止則

當有孕欲娠月候調均顏色肌膚如常但若沉重

煩悶不欲飲食又知患之所在脉又平和是欲娠也

如此兩月後經或不通則結子矣既娠之後多病

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

惡阻婦人怯弱有風氣痰飲則病其狀沉重昏眩惡

聞食氣喜啖鹹酸甚則寒熱心煩嘔痰恍惚不能支

持輕者不服藥亦不妨重者須服藥

洗說九 治婦人街任虛寒胎孕不成或多損墮

澤蘭葉

白朮各一兩
肉桂各一兩

乾薑

地黃

熟地黃

煑當歸

洗焙各二兩

石斛

酒浸

川芎

白芍藥

牡丹

皮

去心延胡索各一兩

右為細末醋麴糊為丸如梧桐子大每服五十九溫

酒空心下一方無乾薑肉桂白朮有白薇人參

坐導藥方 夫求子服藥者須有次第不得不知其次

第謂男服七子散女服盪胞湯及坐導再服紫石門

冬丸則無不效矣

皂莢

一兩去皮子

大黃

戎鹽

礬石

燒

當歸

各二兩

味子

乾薑各三兩

細辛

三兩

蜀椒

炒出汗

葶藶子

苦瓠

各三分一方
作山茱萸

右為末搗篩內輕絹袋子如中指大長三寸盛之令

欽定四庫全書

普濟方
卷三百三十六

滿肉子門中坐任意勿行走欲小便時即出之便後

仍納一日當有青黃冷汁汁盡即止可交合自有子

若未見病出亦可至十日安其本為子宮有冷惡物

故令無子值天陰冷即發疼痛須候病出盡方已不

可中輟每日早晚用苦菜葉煎湯薰洗一方無葶藶

一方有砒霜三分著藥後一日乃服紫石門冬丸

鍾乳丸 治婦人斷緒無子

鍾乳

研

白礬

各一兩

阿膠

炙令

紫石英

研細

去日及開口 生地黃 蛤 五味子 炒 蛇床子 炒 原蠶

者炒去汗 石亭脂 研細 各半兩

右除石藥別研外餘藥為末和勻煉蜜和搗丸如梧

桐子大每服空心暖酒下二十九漸加至三十九

慶雲散 治丈夫陽氣不足不能施化

覆盆子 五味子 各一 兔絲子 二 天雄 一 石斛

白朮 各三 桑寄生 四 天門冬 九 紫石英 二

右為末篩酒服方寸匕先食服日三素不耐冷者去

欽定四庫全書

卷三百三十六

寄生加細辛四兩陽氣不足而無子者去石斛加楨

柳十五枚

治婦人久無子息

吳茱萸 湯浸二 白芷 去 白欬 去 白茯苓 各三 細辛

去葉 牛膝 去 附子 去 皮 人參 一 桂心 一

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服十九用溫酒送

下食前服

治婦人子臟風冷致令無子

皂莢 去黑皮塗酥 川大黃 剉碎 戎礬 白礬 炮當

歸 剉碎 煨炒 五味子 川椒 去目及開口 乾薑 炮

剉細辛 各三

右為末用綿裹藥末如棗大內產門中有惡物下即

止未效再用

熟乾地黃散 療久無子斷緒小腹疼痛冷氣不調

熟乾地黃 川牛膝 當歸 各八 卷柏 川芎

防風 各六 牽牛子 末 桂心 各三

欽定四庫全書

卷三百三十六

右咬咀以水六升煮取三升三合去滓分三服服別

和一分牽牛子末如人行四五里更進一服以快利

止忌生菜葱熱麵麥蒜醋猪肉炙煔菜蕪荑松

菜海藻粘食臭物等

八真丹 治婦人無子

川當歸 芍藥 地黃 川芎 皂莢 鹿茸

阿膠 炒作珠用 續斷

右八味等分細末醋打麵糊為丸如梧桐子大每服