

文
肆

瘡

痢

嘔

吐

瘧

夫瘧之為疾名狀不一有所謂痺瘧寒瘧濕瘧食瘧
牝瘧牡瘧各雖不同皆由外感風寒暑濕之氣與衛
氣相搏而後成之雖經云夏傷於暑秋必痎瘧然四
時有感鬱積七情飢飽失時致令脾胃不和痰留中
脘皆成瘧疾其初發也欠伸畏寒戰慄頭痛或先寒
後熱或先熱後寒或單寒單熱或寒多熱少或熱多
寒少一日一發者易治二日三日一發者難愈瘧脉
自弦弦數多多熱弦遲者多寒弦而小緊者宜下弦
遲者宜溫浮大者宜吐治療之法當先發散寒邪不
可驟用截補之藥若截早則補住邪氣其証變異不

能即愈致成癆瘵者有之發散之藥熱多宜小柴胡湯參蘇飲清脾湯之類寒多者宜養胃湯四獸飲發散不退然後以常山飲勝金丸截之截而不愈又則脾氣虛敗唯宜多進養脾驅痰之藥脾氣一盛自然平復此證既愈尤當節飲食謹勞傷防其再作如烟瘴之地居人常患瘧疾又當隨其方土所宜藥性施以治法客旅往來瘴地常服平胃散草菓飲先以防之

五苓散

和劑方 方見暑門

治寒熱未分頭疼發熱煩渴

引飲小便赤澀

人參養胃湯

和劑方 方見傷寒門

治瘧疾寒多熱少者

必須先用此藥發散然後用四獸飲之類截之因

食倍加草菓

四獸飲

簡易方治五臟氣虛喜怒不節致陰陽相勝

結聚涎飲與衛氣相搏發為瘧疾

人參去芦

白朮

茯苓去皮

橘紅

草菓仁

半夏湯洗

棗子

生姜

烏梅去核各等分

甘草炙減半

右咬咀以鹽少許淹食頃用厚皮紙裹了以水濕之慢火炮令香熟焙乾每服半兩水二盞煎六分未發前併進數服

柴胡桂姜湯

治瘧疾寒多微熱或但寒不熱并

治勞瘧

柴胡

四兩

桂枝

去皮一兩半

黃芩

一兩半

瓜蒌根

二兩

牡蠣

煨碎炒

甘草

炙

乾姜

炮各一兩

右咬咀每服五錢水一盞半煎八分溫服

定齋藥飲子

簡易方

快脾治瘧

草菓仁

蒼朮

泔浸

厚朴

姜製

陳皮

半夏曲

甘草

炙

烏梅

去核各等分

右咬咀每服半兩水盞半姜五片棗二箇同煎七分不拘時寒多者加干姜附子熱甚者止加柴胡

瘧瘧加檳榔

七棗湯

濟生方

治五臟氣虛陰陽相勝作為瘧瘧發

作無時或寒多熱少或單寒者

附子一枚炮裂以鹽水浸再炮如此七次不浸去皮臍

一方又用川烏代附子以水調陳壁土為糊炮浸七次

右咬咀分作二服水一椀姜七片棗七箇煎七分
當發日凌晨空心溫服未久再進一服

棗附湯

濟生方治氣虛瘧疾寒多熱少或單寒者

草棗仁

附子炮去皮臍各等分

右咬咀每服半兩水一盞姜七片棗一箇煎服不

拘時

小柴胡湯

和劑方

方見傷寒門

治瘧疾熱多寒少或

單熱頭痛胃滿咽乾

柴胡加桂湯

活人方

治瘧疾先寒後熱兼治支結

柴胡

八兩去前

人參

去芦

甘草

炙

半夏

炮七次

黃芩

肉桂

去皮各二兩

右咬咀每服五錢水盞半姜七片棗二箇煎服若

渴者去半夏加人參瓜蒌根同煎服之

白虎加桂湯

活人方

治瘧疾但熱不寒者

知母

六兩

甘草

炙三兩

肉桂

去皮三兩

粳米

三撮

石膏

一斤

右咬咀每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

清脾湯

洛生方

治癰瘰疔來弦數但熱不寒或熱多

寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮

去白

厚朴

姜製

白朮

半夏

湯泡七次

黃芩

草薢仁

柴胡

去芦

茯苓

去皮

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水盞半姜五片煎七分去滓溫服不拘時候

清脾湯

三因方

治因食傷脾停滯痰飲發為寒熱

厚朴

四兩姜製

烏梅

去核

半夏

湯去滑

青皮

良姜

各二兩

草薢

去皮一兩

甘草

炙半兩

右吹咀每服四錢水一盞姜三片棗一枚煎七分

未發前併三服忌生冷油膩之物

和劑方

方見傷寒門

治發瘧熱多寒少兼咳嗽者

和劑方

方見暑門

治伏暑發瘧煩渴者

濟生方

專治食瘧

青皮 炒三兩

阿魏

醋化錢半

蓬朮

京三稜

醋炙各二兩

胡椒

一兩

右為末別用陳倉米同阿魏醋炙糊為丸如梧桐子每服五十丸至百丸淡姜湯下或因食生菓成

瘧用麝香湯吞下

濟生方

治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結

塊名曰瘰母

草菓仁

鼈甲 醋炙

黃耆 去芦

白朮

白芍藥

厚朴 姜製炒

檳榔

橘紅

川芎

甘草 炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞姜七片棗一枚烏梅少

許煎七分溫服不拘時

瘰癧飲

三四方治久瘰結成癥瘕癖在胃脅諸藥不

愈者

蒼朮 洗浸

草菓 去少

桔梗

青皮

陳皮

良姜 各半兩

白芷

茯苓

半夏湯去滑

枳殼麩炒

甘草炙

桂心

乾姜炮各三錢

紫蘇葉

川芎各二錢

右咬咀每服四錢水一盞鹽少許煎七分空心服

脈經

和劑方治一切寒熱瘧疾胃膈停痰發散不

愈者

檳榔四兩

常山酒浸蒸焙一介

右為末麪糊為丸如梧桐子大每服三十丸於發前一日臨卧用冷酒吞下便睡至四更再用冷酒吞下十五丸至午方可食溫粥忌食熱物并一切生冷一方用雞子清為丸

常山飲

和劑方 治瘧疾發散不愈漸成癆瘵

知母

川常山

草藥各二斤

良姜 二十兩

甘草 炙一斤

烏梅 去仁一斤

右咬咀每服五錢水一大盞姜五片棗一枚煎七分溫服

將軍飲

澹寮方 治寒熱痞疾作而仆厥手足俱冷

昏不知人此雖一時急救之方用之有驗

附子 一个炮去皮

訶子 四个去核

陳皮 四个全者淨洗

甘草 四寸炙

右咬咀為四服每服水一盞半姜七片棗七枚煎取一半令熱灌病者立可甦省

露姜飲

澹寮方用生姜四兩和皮搗汁一碗夜露至

曉空心冷服大治脾胃聚痰發為寒熱

分利順元散

澹寮方治體虛之人患瘧寒多不可用

截藥者

川烏

附子各二兩

南星二兩

木香

五錢別剉臨時入

右除木香不見火外三味各將一半去皮生用一

半炮熟合和咬咀每服四錢棗七枚生姜十片水

一盞煎七分當發前一日乃當發日早晨連進二

三服半生半熟能分解陰陽也

七寶飲

簡易方治一切瘧疾無問寒熱多少及山嵐

瘴氣寒熱如瘧等証

厚朴 姜製

陳皮

甘草 炙

草薢仁

常山 雞骨煮

檳榔

青皮 各等分

右咬咀每服五錢水一盞半酒半盞煎取一盞露一宿空心向東溫服睡少頃時須忌熱物寒多加酒熱多加水

治瘧疾良方

百一選方今人治瘧疾多用常山砒霜之

類發吐取涎縱使得安脾胃不能不損不若此藥最為穩當也

辰砂 光明者

阿魏 真者各一兩

右研勻和稀糊為丸如皂角子大每服一九空心
人參湯化下

生熟附子湯

治療方分利陰陽止寒熱治瘡疾欲作

胃痞痰嘔頭眩戰掉

附子二隻二生去皮用一盞湯浸去皮炮用

右各取二錢沉香木香水各一盞姜七片棗七枚
煎一盞當發日空心服亦宜以此下黑錫丹可以
回元氣墜痰

治瘡方

醫方大成

右用狗蠅一隻去翅足以蠟丸之作一九當發日
冷酒吞下

灸法

濟生方 治瘡疾久不愈不問男女於大椎中第

一骨節盡處先針後灸三七壯立効或灸第三骨

節亦可

碧石

百一選方 治久瘡不愈者

東方甲乙木巴豆 取肉去油別研細

南方丙丁火官桂 去皮

中央戊己土硫黃 去砂石研細

西方庚辛金白礬 別研細

北方壬癸水青黛 別研細各等分

右於五月一日修治了用紙各裹以盤盛依前方
位排定勿令猫犬及婦人見之安頓神佛前至端

午日午時用五家粽尖和煎藥令勻丸如梧桐子
大令患者以綿裹一丸塞於鼻竅中男左女右於
未發前一日安之約度尋常發過少許方除一方
塞耳內

草菓攸

和劑方治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

紫蘇

草菓仁

良姜

炒

川芎

青皮

去白炒

梓草

炒

白芷

各等分

右咬咀每服四錢水一盞煎七分熱服

對金飲子

和劑方

治寒熱瘧疾愈後調理脾胃

厚朴

去皮姜汁炙

蒼朮

淋浸去皮

甘草

炙各二兩