

本草易讀卷五目錄

甘遂 一百三十二

常山 一百三十五

附子 一百三十七

白附子 一百三十九

半夏 一百四十二

鳳仙子花
指甲桃花 一百四十五

草薺 一百四十八

山豆根 一百五十一

木通 通草 一百五十四

兔絲子 一百五十七

使君子 一百六十

續隨子 千金子 一百三十三

蜀漆 又

烏頭 又

南星 一百四十

射干 烏扇 一百四十三

芫花 一百四十六

土茯苓 一百四十九

威靈仙 一百五十二

鉤藤 一百五十五

五味子 一百五十八

木鱉子 一百六十一

蓖麻子 一百六十四

藜蘆 山慈 一百六十五

草烏頭 一百六十六

黃精 一百六十七

玉簪 一百六十八

茵陳 一百六十九

白薇 一百七十

防己 一百七十一

金銀花 葉名毛花淨花
忍冬一百五十六

覆盆子 一百七十二

馬錢子 番木
別 一百七十三

北京中醫藥大學圖書館藏

馬兜鈴 一百六十三

牽牛子 黑丑 白丑 一百六十四

凌霄花 一百六十五

薔薇根 一百六十六

月季花 一百六十七

桔槔子 一百六十八

天花粉 栝蒌根 一百六十九

土瓜根 一百七十

葛根 一百七十一

天冬 一百七十二

百部 一百七十三

何首烏 一百七十四

澤瀉 一百七十五

菖蒲 一百七十六

蒲黃 一百七十七

浮萍 一百七十八

海藻 一百七十九

昆布 一百八十

石斛 一百八十一

骨碎補 毛薑 一百八十二

石葦 一百八十三

野苧萸 鵝不食草 一百八十四

卷柏 一百八十五

瓦松 一百八十六

馬勃 灰色 一百八十七

薺花 一百八十八

仙茅 一百八十九

水仙 一百九十

菟荅子 一百九十一

茜草 一百九十二

白藥子 一百九十三

黃藥子 一百九十四

胡麻 一百九十五

香油 一百九十五

大麻仁 一百九十六

小麥 一百九十七

浮麥	一百九十七	麥麩	一百九十七	陳小粉	一百九十七
麥麵	一百九十七	大麥	一百九十八	大麥麵	一百九十八
大麥芽	又	蕎麥	一百九十九	粳米	一百
浙二泔	又	糯米	二百零一	黍米	二百零二
稷米	二百零二	丹黍米	二百零二	蜀秫	二百零三
玉蜀秫	又	粟米	二百零四	粟米泔	又
谷芽	又	杆頭糠	又	薏苡仁	二百零五
粟壳	二百零六	鴉片	二百零六	黑豆	二百零七
豆黃卷	又	黃豆	二百零八	赤小豆	二百零九



本草易讀卷五

汪認庵先生秘本
清御醫吳謙審定

甘遂二百三十二

舊麴色煨用瓜蒂為使惡遠志反甘草

苦寒有毒。入足太陽經。除大腹之腫滿。消晝目之浮腫。解陰囊之腫墜。傳脚氣之腫核。留飲宿食之滯。癥瘕積裂之堅。痰迷癲癇之疾。隔噎痞塞之疴。虛人忌之。

生中山。二八月采根。今陝西江東亦有之。苗似澤漆。莖短小而葉有汁。

根皮肉赤。自作連珠。亦有色白者。

水腫腹滿

同黑丑為末。水煎時呷。

○身晝洪腫

為末入猪腎內煨食。日三。

○四肢腫痛腿膝攣急

上方加木香。

水腫喘急

二便秘同大戟元花為末。棗肉丸服。

○二便不通

為末麴合傳臍及丹田。再艾灸三壯。內服甘草湯。以通為度。

○偏墜

同茴香末酒下。

麻木疼痛

甘遂二兩。比麻子四兩。樟腦一兩。拌帖之內服甘草水。

○耳卒聾

甘遂半兩。綿已納耳內。口嚼甘草。

甘遂半夏湯

甘遂半夏白芍甘草蜜水煎。治心下堅滿有水。脉伏沉自

利反快者。

遂心丹

甘遂末二錢。以猪心血和之。入猪心內煨熟。取



本草易言
末入長砂一錢。分作四丸。每一丸猪心湯下。大便惡物為效。不下再用。

續隨子百三十三

紙色去油取霜用千金子。

辛溫有毒。行水氣而破血結。消癥結而除腫滿。化痰飲而祛冷氣。利三便。而下惡物滯。瘡癰疥瘤之疾。蠱虫鬼疰之病。

生蜀郡。今南中多有。苗大如戟。初生一莖。莖端生葉。葉中復出葉。花亦類大戟。自葉中抽幹而生。實青有壳。人家園田中多種植。莖中亦有白汁。可結水銀。

蓖麻子百三十四

外壳無刺。內實紅色者良。

辛甘有毒。通諸關。開諸竅。帖偏風。喝斜。療水氣浮腫。擣爛塞鼻室耳聾。燒煙薰喉痹舌脹。下胞衣而收子腸。傳療瘰而平惡瘡。拔針刺之入肉。下骨木之哽咽。追膿拔毒最靈。翹喘咳嗽悉效。

在處有之。其莖有亦有白。中空。葉如瓠葉。每葉凡五尖。夏秋極間出花。

穗纍纍黃紫。每枝結實數十。壳如巴豆壳。內有子大如豆。有斑點。狀如

牛蟬。其外壳有刺者。內實不紅。外壳無刺者。內實發紅。

手^{驗方第一}臂一塊腫痛^{擣付之一}。○偏頭氣痛^{同乳香食鹽擣付太陽穴}。

手足^{第四}偏枯^{取油同羊脂射香山甲煎膏。日摩數次。月餘瘥。內服搜風化痰養血劑。}。○口目斜^{擣付太陽穴}。

香杆餅付^{太陽穴}。○鼻室不聞香臭^{三百粒大棗一個。擣膏塞之日。易一月愈。}。○舌上血出^{取油燃紙燒烟薰鼻。}。

滿口^{同上}。○喉痹口噤^{同上}。○小便不通^{取油燃紙插入莖中即愈。}。

即速^{第十}。○子宮脫出^{擣付頭頂。}。○下生胎^{酒吞下。}。

卒聾^{百粒大棗十五。乳汁丸綿色塞之。日易耳熱為度。二十日瘥。}。○面上雀斑^{同陀僧硫黃為末。羊髓合勻。每夜付之。}。

淨仁香油煎焦去^{第十九}。○湯火傷^{同給粉杆膏。湯傷油調火傷水調付之。}。

風鼻塌^{手指學曲節間痛甚。淨仁一兩。黃連一兩。以小瓶入水。同浸三日。後取淨仁一粒。劈開面東。以浸藥水吞之。漸加至四五粒。凝利不妨。瓶中水盡更添之。兩月後。喫大蒜猪肉。如不發是效也。}。

若再發。再服之。○鼻血^{以香油塗飽麻葉。炙熱。熨額上。}。

易。○鼻血^{以香油塗飽麻葉。炙熱。熨額上。}。○鐵針入肉^{蓖麻肉石灰紅。搗谷米飯擣膏貼之。即出。}。

子腸不收^{擣付丹日。}。

風氣頭痛^{擣付中。}。

舌^{第七}。

催生下胞^{付足心下。}。

一切腫毒疫甚^{擣付。}。

髮黃頭黑^{第十八}。

針刺入肉^{淨仁一粒。杆膏。以帛襯傷處付之。}。

癰^{第十九}。

腳氣風腫木痹^{蓖麻葉蒸。}。

項側結核如卵^{第二十}。



同山藥
膏敷之

常山百三十五

酒浸蒸熟
用忌蔥菜

辛苦微寒有毒。專截諸瘧。最吐老痰。

生益州川谷及澤中。二八月採根。今汴西湖南淮浙亦有之。而海州出者。葉似楸葉。八月有花紅白色。又莖圓有節。高者三四尺。葉似茗而較長。兩兩相當。二月生白花青萼。五月結實青圓。

蜀漆

常山苗也。八九月採之。

辛苦微溫有毒。治與常山略同。生用大劑則吐。熟用小劑則否。得甘草則吐。得大黃則瀉。

溫瘧熱多

常山小麥竹葉
水煎五更服

○牝瘧寒多

蜀漆雲目龍骨為末。發日平旦一服。發前一服。

○腎瘧四肢冷

腰脊痛。大便難。漉漉而寒。常山香
敗竹葉烏梅蔥白水煎。發前分服。

○肺瘧胸多痰

心寒寒甚乃熟。熱間時驚。常山三錢。甘
草五分。秫米三十五粒。水煎。發前分服。

○肝

瘧少腹滿

喘息如死。或小便如膿。寒多熱少。常山一兩。
醋浸一宿。凡器焙乾。每二錢水煎五更服。

○妊娠瘧疾

常山石炭烏梅甘草。
酒浸一宿。平旦溫分。



積年久瘧

常山黃連每一兩酒漬一宿發日早服發前再服熱當吐冷當利

○截諸瘧湯

常山三兩水漬一宿發前服輒吐

○截諸瘧

酒

常山一兩酒漬三日平旦二服發時一服

○間日瘧

常山大黃炙草水煎五更服發時又服

○久瘧不止

常山黃連一兩酒漬一宿發前服輒吐

服之

○胸中痰飲

常山甘草每一兩蜜水煎輒吐不吐再服

截瘧常山丸

常山二兩雞子白合丸豆大煮熟日乾收之每一丸

葉湯下五更一服天明一服發時一服或吐或否○截瘧黃丹丸

山二兩黃丹半兩烏梅一兩糯米湯丸豆大每三十丸涼酒下隔夜一

服平旦一服午後方食○不二飲

常山錢二擯榔要一雄一雌大者

貝母錢二知母

錢二酒一盞十分酒煎至賺八分不可過熬過則不效露一宿○臨發日

五更溫服勿令婦人煎藥治一切新久瘧疾一劑截住神效

藜蘆百三十六

去頭糯米泔煮之日乾即山慈也

辛苦微寒有毒吐風癰痰涎療疥癬惡瘡

生泰山之谷二八月採今所在山谷皆有苗葉似車前莖似蔥白有黑

皮裏莖似蔥皮。有花肉紅色。此有二種。一種水藜蘆。莖葉大同。只是生

在近水。根須百餘莖。不中藥用。今用者名蔥白藜蘆。根須甚少。

中風不省。牙急每末服五分。以吐痰為度。不吐再。

○諸風有痰。同上○久瘧瘦多。同上○頭上生風。

○反花惡瘡。為末。猪脂合敷。○誤吞水蛭。為末。水下取吐。

附子百三十七。生用。去皮臍入藥。熟用水泡。全折去皮臍。乘熱切片炒之。○地膽為使。惡蜈蚣。畏防風。黑甘草。人參。黃芪。萊菔。○生用。發散。熟用。峻補。○切片。色光黑而潤。乾金時。

辛甘大溫無毒。入足太陰脾。少陰腎。通行十二經。煖腎燥脾。除濕逐冷。退

手足之厥逆。舒蹠膝之拘攣。回將絕之元陽。降逆上之濁陰。破癥瘕積聚。

兼治寒疝。療癰癩麻痺。並息慢驚。嘔噦膈噎之疾。沉寒痼冷之疴。瀉痢清

谷之厄。霍亂轉筋之症。通筋脉而墜胎子。斂瘡口而塞耳聾。

烏頭。製同附子。○初種為烏頭。象烏之頭也。附烏頭而生者為附子。知子附母也。烏頭如芋魁。附子如芋子。蓋一物也。別有草烏白附。故以黑附川烏別之。

辛甘大溫有毒。除諸風風痺風邪。半身不遂之風。祛諸寒寒濕寒冷。堅痞



老積之寒。功同附子。助陽之力稍緩。祛風之力則盛。烏附尖吐風痰。治癰瘤。取其鋒銳。無他意也。

生健為山谷。及廣漢。冬采為附子。春采為烏頭。今綿州乃廣漢故地。綿州所屬彰明所產尤多。蓋十一月播種。春月生苗。莖類野艾。而澤葉類地麻而厚。其花紫。瓣黃。莖長苞而圓。其初種之小者為烏頭。附烏頭旁生者為附子。又左右附而倚生者為烏喙。附而長生者為天雄。附而上出者為劍子。春末生子。故曰春采為烏頭。冬月生子已成。故冬采為附子。蓋附子乃烏頭所生之子也。

腰脚冷痺痛

生川烏為末。醋合敷之。

脚氣腫痛

久者生附子為末。薑汁合塗。

年久頭痛

川烏南星末。蔥汁合。

數太

○頭風斧劈

川烏末。燒煙薰。碗中茶泡服之。

耳鳴不已

生烏頭燒末。薑下蒿分。綿色塞之。日易之。

耳卒聾

第六醋。

附子削尖。插入耳中。

○手足凍裂

附子為末。合麝敷之。

附子湯

附子茯苓白朮人參白芍。治身體骨節俱疼。手足寒脉沉微。

請方第一。

桂枝加附子湯 桂枝白芍炙草薑棗附子。治因發汗成漏。小便難。四肢急。屈伸不便。惡風。○附子瀉心湯 附子大黃黃連黃芩附子煎。三

黃用水漬之。治心下痞。惡寒汗出者。○桂枝附子湯 桂枝附子甘草

生薑大棗。治骨節痛。小水不利。不渴者。○仙桃丸 生烏頭五靈脂威

靈仙酒丸。豆大。每水下七丸。忌茶。治手足麻痺疼痛。或癱瘓疼痛。或腰

膝痹痛。○薑附湯 附子乾薑。治中寒困昏。臍腹冷痛。霍亂轉筋。○烏

頭煎 烏頭煎去渣。納蜜再煎。治遠臍寒疝疼。手足冷。自汗脉緊。○再

造散 烏頭當歸白參桂枝川斷烏蛇甘草茅朮川芎羌活松節牛夕

防風治癱瘓。○小活絡丹 舒筋最宜。天麻白附子牛夕木別子羌活

各五錢。烏頭一錢。地龍一錢。焙。乳香沒藥各一錢。硃砂一錢。南星五錢。酒丸豆大。治兩脚

無力。小兒不能行。成痿症者。

草烏頭百三十八

黑豆同煮。用莽草連志為使。反半夏瓜翼貝母白薇白芨惡藜蘆畏鉛糖冷水黑豆

辛苦大熱大毒。搜諸風。除諸濕。開頑痰。療頑瘡。墜胎孕。○以汁熬膏。名射岡。傳箭射物。見血立死。

出江左山南等處。今處處有之。其根苗花實。並與川烏相似。但此係野生。又無釀造之法。其根外黑內白。皺而枯燥為異爾。所附生亦有天雄烏喙。

遍身生瘡

陰囊兩脚尤甚。○草烏一兩。鹽水浸一宿。炒末猪腰子一具。煨熟。竹刀切。搗醋合丸。兼豆大。每三十九。末。以袋盛豆腐半袋。入烏末在內。再將豆腐填滿壓乾。入釜中煮一宿。其藥即堅。取出日乾為末。每五分薑蔥湯下。

白附子百三十九

炮用

○積年麻痺

或歷節走風。以草烏半斤為

辛甘大溫有小毒。陽明經藥也。除頭面遊風。斑痕肝黯悉療。解陰下濕痒。疥癬風瘡亦醫。止心痛而散血痺。療足弱而補肝虛。中風失音之疾。風痰眩運之疴。

生蜀郡。三月采。又曰。此物久絕。後無具者。時珍曰。根如草烏之小者。乾

者皺文有節。又曰。其根苗悉與附子同。按今所用白附。類川烏而內
色白。未知此何物也。而除風亦有效驗。

中風口斜

同姜蠶全
出酒下末

○偏墜疝氣

為末津合傳臍
艾灸三五壯

○慢驚風

同南星
為末姜下

玉真散

白附子十兩

羌活防風南星白芷各一兩

細末收貯

治打跌損

傷已破或傷口潰爛。進風口目斜歪。內服外敷。

南星百四十

去皮臍湯泡用。或濕紙色煨火煨用。
蜀漆為使。惡莽草。畏附子。乾薑生薑。

辛苦大溫有毒。入肝脾腎三經。治中風麻痺。除風癰痰。消癰腫而散血。

攻堅積而墜胎。療金瘡折傷之瘰。除口噤目斜之疾。得防風不麻。得牛

膽不燥。得火炮不毒。○牛膽合勻入膽中。懸風處乾之。為膽星。

生澤中及冤句。二八月采根。今河北州郡亦有之。初生根如豆大。漸長

似半夏而扁。年久者根圓及寸。寸大者如雞卵。周匝生圓牙。四月生苗。

高尺餘。獨莖。上有葉如瓜。一窠生七八莖。時出一莖作穗。



一切金瘡折傷同防風為散外傳內服

破傷中風同上

諸風口

噤同生薑蘇葉八膽少許煎服

口

噤不開一枚煨之用紙斜色剪小孔透氣入口闊自開也

小兒驚風佐長砂末荆芥下

風癇痰迷薑汁為丸參湯下

口

小兒癇後不言為末猪膽合服

口目斜為末薑汁合貼之左貼右右左

婦人風氣攻目作痛醋末

中風中

酒下風痰頭痛同荆芥葉薑汁丸服

頭運目眩吐逆同半夏天麻倍白麴水丸豆大每三十九將丸煮熟用

氣痰咳嗽同半夏陳皮薑水丸之脉寸盛者宜之

中風中

氣初起少佐木香薑水煎服

右臂疼痛痰濕同生薑蒼朮丸服

氣痰咳嗽同半夏陳皮薑水丸之脉寸盛者宜之

中風中

解頤脫口為末薑汁合傳兩頰一夜而上

小兒解頤為末淡醋傳帛上貼頤門尖手熨之立效

小兒口瘡白屑

如鵝口為末醋合傳足心男左女右

走馬疳蝕透骨穿腮生南星碗中孔入雄黃一塊麴色燒之候雄黃作汁以蓋子合定出火毒為末入麝香少許掃瘡數日愈

小兒口瘡白屑

黃精百四十一

蒸過日乾用

甘平無毒補中氣而安五臟益脾胃而潤心肺填精髓而助筋骨除風濕而下三虫

南北皆有以茅山嵩山者良苗高二三尺葉如竹而短兩兩相對莖梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開青白花狀如小豆花結子白如黍粒

亦有無子者。根如嫩生薑而黃。二八月米根亦可劈根稀種之。一年後極稠。子亦可種。以所來多偽。近世稀用矣。

半夏百四十二

湯泡數日。薑汁製用。射干為使。惡臭角。畏雄黃生薑。乾薑秦皮龜甲反。烏頭忌。羊血海藻飴糖。陳久者良。

辛溫有毒。人足陽明胃。手陽明太陰少陰諸經。降胃止嘔。驅痰除濕。解陽寒之寒熱。消心胸之結滿。欬逆頭眩之疾。癰腫咽痛之疴。○胎前勿用。在處有之。以齊州者為良。二月生苗一莖。莖端三葉。淺綠色。頗似竹葉。

生江南者似芍藥。葉根下相重。上天下小。皮黃肉白。八月采根。

驗方第一 小兒吐瀉 同生薑陳粟米煎服

○小兒腹脹 酒丸藥大。每十九。薑水。下。或薑汁合末傳臍上。

○霍亂腹脹 同肉桂末服

第四 白濁夢遺 與猪苓同炒。去猪苓。入蠟粉丸服。

○八般頭風 為末。入百草霜少許。作紙燃燒煙就鼻內噓之。口中含水。有涎吐去再含。

○喉痹 第

六 腫塞 生末。噓鼻。涎出效。

○木舌脹大 醋煎合嗽

○面上黑氣 焙末。米醋合傳。忌片連傳。三日。皂角湯洗面如玉也。

○子腸 第

九 不收 生末。吹鼻。

○小兒驚風不省 同上

○卒死不寤 同上

○五絕急死 同上

○癰疽 第

十三 發背 雞子清合末傳之。

○吹奶腫疼 煨末。薑酒下立。瘡又取末入鼻。

○打扑癰痕 為末。水調敷。一宿即沒。

○遠行 第



走趺^{十六}同

○飛虫入耳^{第十七}

生末香油合
傅耳門外

○蝎蟻螫人^{第十八}

水合
末傅

○骨哽咽中^{第十九}

同白
飯末
服取
嘔

○心痛止在心下按之益痛^{第二十}

半夏一匊黃連乾薑白芍甘草偏左右
者加柴戶無火者去黃連中脈弱加參

○眉棱骨痛^{第二十一}

半

羌活酒
芩白芷

○子懸逆上捧心^{第二十二}

半夏枳壳枯蘖香附揀砂白芍蘇梗
陳皮生薑去半夏加丹參青皮尤良

半夏瀉心湯

半夏人參甘草乾薑黃芩黃連大棗治心下痞滿不痛^{第二十三}

又治嘔而腸鳴心下痞^{第二十四}

○大半夏湯 半夏人參蜜取流水揚之二百

四十遍治反胃^{第二十五}

○薑半湯 半夏生薑末服治乾嘔吐涎^{第二十六}

半夏生薑治嘔而不渴^{第二十七}

○越婢加半夏湯 麻黃石羔甘草生薑大

棗半夏治肺脹喘咳上氣目頭脫脈浮大^{第二十八}

○半夏湯散 半夏甘草桂

枝湯散俱可治少陰咽痛^{第二十九}

○半夏麻黃丸 半夏麻黃蜜治心下悸者^{第三十}

射干^{第三十一}

米泔浸
烏龍

味苦微寒有小毒治欬逆上氣療咽喉痹痛祛瘀血而通經破癥結而消痰塗癰腫而解瘡母降實火而利大腸



在處有之。人家種之。今人所種。多是紫花者。呼為紫蝴蝶。葉如烏翬。又名烏扇羽。葉中抽莖。莖上分枝開花。秋月結實。作房。中子黑色。三月

采根。

^{驗方第一}咽腫痛。同豆根末吹之如神。

○^{第二}咽閉塞腫痛。同猪脂油合煎。令焦去渣。每服少許。

○^{第三}咽閉不通。含之嚥汁。

○^{第四}二便。

不通。諸藥不效者水煎服。

○水腫腹大。動搖有水聲。擣汁服。

射干麻黃湯

射干紫苑冬花五味細辛半夏薑棗。治欬而上氣。喉中水

雞聲。

玉簪百四十四

甘寒有小毒。

處處有之。人家栽為花草。二月生苗成叢。柔莖如白松。葉大如掌。圓而有尖。葉上紋如車前葉。六七月抽莖。莖上有細葉。中有花朵。白色。下小末大。中吐黃蕊。頗香結子。

