

神州醫學社新編

女科醫案

葉天士女科醫案

上海廣文書局出版



南京中医药大学图书馆版权所有

世界書局出版書目

最近醫書

醫學南針

一厚冊

七角

編新 葉天士醫案

二厚冊

九角

編新 葉天士女科醫案

一冊

四角

編新 葉天士幼科醫案

一冊

四角

編新 薛生白醫案

一冊

四角

葉天士手集秘方

一厚冊

五角

增註 徐靈胎古方新解

二厚冊

八角

增補 單方大全

一厚冊

六角

續刊醫書預告

評加 溫病條辨

四冊

六角

批增 溫熱經緯

四冊

六角

編新 吳鞠通醫案

二冊

五角

編新 王潛齋分類醫案二冊

六角

醫學南針續編

一厚冊

八角

柯韻伯傷寒三書

一冊

五角

廣註 素靈類纂

三冊

一元

中華民國十年二月出版

葉天士女科醫案（全二冊）

價洋四角

編輯者


陸士

印刷所

上海世界書局

發行所

上海廣文書局



總發行所

上海四馬路

世界書局



南京中醫藥大學圖書館版權所有

尺牘類

對^言照初等新尺牘

廣註學生尺牘大全

廣註秋水軒尺牘

廣註小倉山房尺牘

廣註雪鴻軒尺牘合璧

合中下訂

大字本

大字本

合訂

二冊

一冊

二冊

四冊

一冊

白話文類

初等白話尺牘

初等白話文範

初等白話文法

做白話文秘訣

選歷代白話文範

國語指南

新式水滸演義

(洋裝)

(洋裝)

(洋裝)

二冊

三冊

一冊

一冊

四冊

一冊

四冊

作文類

對^言照初等作文新範

對^言照高等作文新範

對^言照女子作文新範

自修類

新學生國音字典

廣註論說文自修讀本

廣註紀事文自修讀本

廣註駢體文自修讀本

廣註尺牘自修讀本

廣註古今詩自修讀本

廣註古文觀止讀本

各體習字自修範本

新文精華

四冊

三冊

三冊

一冊

二冊

二冊

二冊

二冊

二冊

二冊

二冊

十冊

十冊

四冊



所有版權歸中醫藥大學圖書館

序

徐洄溪性好評摘。其譏葉香巖高談奇經。稀用血藥。謂女科非葉所長。不知葉之妙處。正在此稀用血藥。觀葉之審症處方。於營衛氣血。界畫分明。絕無絲毫錯亂。豈死執四物一方。自命為女科專家者所能比擬。徐固聰明才辨。然其學識與葉相較。則終係有若之似孔子。奈何生既同時。兩賢竟不相濟而相厄。然鵝湖鹿洞。不過仁智偶歧。各有所見。各成其是。吾儕讀其書者。正不妨兩存之也。校訂既竣。因識數言以弁其首。

民國九年十月

後學珠街閣陸士諤謹序於松江醫寓

葉天士女科醫案目錄

(一) 調經門

愆期

痛經

倒經

經閉

(二) 胎產門

胎前

產後

小產

(三) 帶崩門

帶淋

六至十

五至六

四至五

一至四

十至百

百至完

完至生

生至盡



南京中医药大学图书馆版权所有

崩漏

癥瘕

(四) 血室門

熱入血室

乾血癆

雜病

附論脉二則

婦人脉

辨胎脉秘訣



寧夏

寧夏

寧夏

寧夏

寧夏

兗

平

葉天士女科醫案

一 調經門

愆期

情志鬱勃。氣逆多升。絡血上冒。連次小產。衝任已怯。心嘈震悸。目珠痛頭脹。肝膽厥陽動極。必須懷抱寬舒。可望病痊。否則延成痼疾矣。用復脈湯。去薑桂參。加淮小麥。天冬石決明。經來後期兩旬。牙宣吐血。防其倒經。議養肝陰。兼通衝脈。

生地

天冬

枸杞子

牛膝

茯苓

白芍

阿膠

桂元肉

丹參

茯神

烏骨雞煮爛為丸。

姚二久嗽背寒。晨汗。右卧咳甚。經事日遲。脈如數而虛。穀減不欲食。此情志鬱傷。延成損怯。非清寒肺藥所宜。

黃芪

桂枝

白芍

炙草

南棗

飴糖

肺為氣出入之道。內有所傷。五臟之邪。上逆於肺。則咳嗽。此則久嗽背寒晨汗。全是肺氣受傷。而經事日遲。不但氣血不流行。血枯肝閉。可想而知。脈數虛大也。虛則不可以清寒。况穀減不欲食。中氣之餒已甚。可復以苦寒損胃乎。與黃芪建中。損其肺者益其氣。而桂枝白芍。非斂陰和血之妙品乎。

秦一氣衝心痛嘔涎。氣墜少腹為瀉。經來後期。其色或淡或紫。病在衝脈。從厥陰陽明兩治。

川連 小茴 川棟子 歸尾 炒半夏 茯苓 桂枝 橘紅

華三鬱傷肝脾。是因懷抱不暢。致氣血不和。逍遙散減白朮。加山查香附。不欲其中。務在宣通氣血耳。今經來日遲。鬱痺宜通。而氣弱不主統血。況春深泄氣之候。必佐益氣之屬。方為合法。歸脾湯

又 向有鬱傷肝脾。用逍遙散歸脾湯甚合。今因動怒。少腹氣衝。過胃上膈。咽喉腫痺。四肢逆冷。遂令昏迷。此皆肝木拂逆。甚則為厥。夫肝臟相火內寄。病來迅速。皆動極之徵。為肝用太過。宜制其用。前此芪朮守補。不可用矣。

安胃理中丸去黃柏細辛

錢 脈濇。腕悶減食。經水來遲。腹痛墜。

柴胡 灼白芍 黃芩 鬱金 香附 茯苓 蘇梗 神麴

又 諸恙未減。腹但痛不墜。

逍遙散去白朮甘草。加鬱金香附神麴。

經來漸遲。色淡而少。當期必暮夜腹痛。脹腰痺痠楚。經絡牽掣少舒。脈數。右小左大。此乃奇經衝任二脈。為他經之氣所束。以致氣機日鈍。血少貯蓄。若加暴怒。須防



中医药大学图书馆

經漏涕溢。用藥須擇入奇經者為宜。血海固陽明隸屬。奇經肝腎為多。議兩和氣血。宣通奇脈方。

錢。當歸 芩蔚子 生香附 小茴香 焦麥芽 大黑豆皮 調入西琥珀末

某 經遲腹痛。風疹。絡血不寧。久鬱成熟。法當通利。

涼膈去芒硝。加丹皮。赤芍。

孫九奇脈下損。經遲腹痛。先用當歸建中湯。續商八脈治法。歸建中湯

又 久嗽。過勞。寒熱。歸建中去薑

謝三能食不運。痼泄。經事愆期。少腹中乾涸而痛。下焦麻痺。衝心嘔逆。腹鳴心辣。八脉奇經交病。

人參 茯苓 艾葉 製香附 淡萆薢 淡骨脂 肉桂 當歸 鹿角霜

小茴香 紫石英 益母膏丸

王三脈右緩左濇。經水色淡後期。嘔吐痰水食物。畢姻三載餘不孕。此久鬱凝痰滯氣。務宜宣通。從陽明厥陰立方。

半夏 廣皮 茯苓 厚朴 茅朮 淡吳萸 小香附 山查肉 薑汁法丸

又 三月中用辛溫宣鬱方。痰瘀自下。胸次寬。嘔逆緩。今喜暖食惡寒。經遲至五十



餘日。來必色淡且少。議用溫養衝任。栽培生氣方法。

八珍去朮草。外加小茴肉桂。蘄艾香附。紫石英。河車膠丸。

程七。三十年不孕育。其中幻病非一。病人述經期遲至。來期預先三日。周身筋骨脹絡。牽掣痠楚。不得舒展。凡女人月水諸絡之血。必彙集血海而下。血海者。即衝脈也。男子藏精。女子繫胞。不孕經不調。衝脈病也。腹為陰。陰虛生熱。肢背為陽。陽虛生寒。究竟全是產後不復之虛損。惑見病治病之悞。有終身不孕淹淹之累。肝血陰虛。木火內寄。古人溫養下焦。必左涼肝堅陰。勿執經後期為氣滯。亂投破氣藥。劫陰。

河車膠 生地 枸杞 沙苑 生杜仲 白薇 山查 黃柏 白花益母草

古方附錄

逍遙散 見經閉門

歸脾湯

人參 白朮 茯神 棗仁 龍眼肉 黃芪 當歸 遠志 木香 炙甘草

生薑 大棗

安胃理中湯未詳

安胃丸

烏梅 川椒 附子 桂枝 乾薑各一兩 廣皮 青皮各二兩 黃柏二兩 黃連五錢
川棘子肉二兩 白芍三兩 人參量加如有邪者可勿用 再用川椒烏梅湯法丸 一方無

歸芪建中湯

桂枝 白芍 炙甘草 生姜 大棗 飴糖 當歸 黃芪

太倉八卷十 每交夏五六月。喉間宿病俄發。既愈後。仍然鼻塞火升。上熱下冷。經水或前或後。形瘦脉小數。是陰弱不旺。肝陽左升太速。右降不及。夏令陰伏於裏。陽泄上浮。乃發病根由。

阿膠 石決明 生地 天冬肉 丹皮 黑豆皮 銀花 白芍藥 丹參

紹興十一卷三 少腹痛堅。攻及當臍。每午後必氣脹滯痛。貫串腰尻環跳肉腠之間。肌膚亦漸浮腫。再問經事愆期。僅得些微黃水。是陰寒已入血絡。病蓋起於產蓐。累及奇經八脈。身軀不直。俯不能仰。此肝腎入奇經之見症。炒枯腎氣湯。
十四歲室女。無溫熱藥之例。視色奪脈弱。下焦未寒。先冷。經事淋漓。是衝任虛冷。二炁不交。冬宜藏陽。用溫攝升陽。

麋茸 人參 沙蒺藜 鹿角霜 歸身 杞子 紫石英 小茴香 蛇床子
問生產頻多。經水失期。此衝脈厥氣直攻心下。引脇環及少腹。嘔吐黑水。黑為胃底



之水。便出稀黑。乃腸中之水。經年累月。病傷胃。何暇見病治病。務在安眠進食。為議仿仲景胃虛上逆例。

人參 炒半夏 代赭石 茯苓塊 降香 蘇木

朱_二經水一月兩至。或幾月不來。五年來並不孕育。下焦肢體常冷。是衝任脈損。無有貯蓄。煖益腎肝主之。

人參 河車膠 熟地 砂仁 梨 歸身 白芍 川芎 香附 茯神 肉桂

艾炭 小茴 紫石英 益母膏丸

朱 經云。陽為病苦寒熱。緣上年冰雪甚少。冬失其藏。春半潮溼。地氣升泄。以肝腎血液久虧之質。春生力淺。八脉隸乎肝腎。一身網維。八脉乏束固之司。陰弱內熱。陽微外寒矣。脅脊常痛。經事愆期。血海漸涸。久延虛怯。情景已露。局方逍遙散。固女科聖藥。大意重在肝脾二經。因鬱致損。木土交傷。氣血痺阻。和氣血之中。佐柴胡微升。以引少陽生氣。上中二焦之鬱勃。可使條暢。今則入暮病劇。天曉安然。顯是肝腎至陰損傷。八脉不為約束。故熱無汗。至陰深遠。古人云。陰病不得有汗也。當宗仲景甘藥之例。勿取氣辛助陽可矣。

炙甘草 阿膠 細生地 生白芍 麥冬 牡蠣

某 陰虧內熱。經事愆期。



雄烏骨雞 小生地 阿膠 白芍 枸杞 天冬 茯苓 芫蔚子 女貞子

桂圓

右十味用青蒿汁童便醱酒熬膏加蜜丸

朱脈數右肩痛痿經不調經來氣攻觸皆性燥氣分有熱

細子芩 白芍 黑山梔 鈎藤 茯苓 當歸鬚 香附 芫蔚子 桑枝

張九經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從來不生育由情懷少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而脈絡間亦致間斷蒙痺例以通劑

川芎 當歸 肉桂 生艾 小茴 茯苓 生香附 南山楂 益母膏丸

古方附錄

炒枯腎氣湯未詳

腎氣丸

乾地黄八兩九蒸為度搗膏 乾山藥 山萸肉各四兩 丹皮 白茯苓 澤瀉各三兩 桂

枝附子各一兩 為末蜜丸如桐子大

名醫論治

唐容川曰男子主氣故血從水化而為精女子主血故血從水化而為經血是男

子之精水中有血女子之經血中有水故行經前後俱有水漿可驗夫此水乃腎中



冲陽之氣所生。氣亢則水竭。而血不濡。熱證於是乎生矣。氣寒則水冷。而血不運。寒證於是乎生矣。故凡調血先須調水。調水即是調氣。氣生於腎而主於肺。血生於胃而藏於肝。以血海為肝之部分。肺金司氣之制節。又為水之上源。調血調水。人當知所從事矣。

痛經

滯痰阻經脈之氣。瘀濁阻絡脈之血。病甚難治。每每經水將至之候。必腹痛。堅脹。上年用烏骨雞丸。堅脹勢緩。痛減。不時舉發。今議治法。經水來時。用回生丹三四日。經過。用後方。但主宣通絡血中氣。可免脹滿之累。

鹿角霜 敗龜板 生香附 熟地炭 南查肉 小茴香 茅朮炭 茯苓塊

用鮑魚汁為丸。回生丹。見經閉門。

向來經水不調。衝任脈病。醫未明奇經脈絡。久治無功。後患陰瘡。延虛經來色淡淋瀝。少腹攻觸。疔痛。晨必痼泄。當通陽攝陰。非破洩真氣偏寒偏熱之治。

鹿角霜 補骨脂 炒當歸 小茴香 白茯苓 炒川椒 紫石英 淡肉

茯苓

張三四寒熱間日。經來腹痛。

小生地 丹皮 知母 花粉 生薑甲 澤蘭

某^二先腹痛而後經至。氣滯為多。晨泄腹鳴。亦脾胃之病。與下焦痼泄則異。

川芎 當歸 香附 煨廣木香 查肉 茯苓

某^二寒熱無汗。經先腹痛。喉中燥癢咳逆。食物不思。此鬱傷氣血。八脈主病。始先與澤蘭湯。

歸身 澤蘭 丹參 白芍 柏子仁 茯神

周^二室女經水不調。先後非一。來期必先腹痛。較之平日為重。飲食大減。始於初夏。入秋下焦常冷。腹鳴忽瀉。忽結。究脈察色。是居室易於鬱怒。肝氣偏橫。胃先受戕。而奇經衝任。躋維脉皆肝胃屬。隸脈不循序流行。氣血日加阻痺。失治必結痼聚痞痞之累。

南山查 生香附 延胡 當歸 青皮 三稜 蓬朮 牛膝 川棟子 澤

蘭 肉桂 炒小茴 葱白汁丸

顧 經來筋掣腹痛。常有心痛乾嘔。此肝氣厥逆。衝任皆病。務在宣通氣血以調經。溫燥忌用。自可得效。

川棟 錢一 丹皮 錢三 炒查 錢二 胡連 分八 延胡 錢一 澤蘭 錢二 歸鬚 錢二 生白芍

半錢

又 柏子仁丸

吳 鬱傷絡脈痛經。

川芎 當歸 香附 小茴 烏藥 茯苓 紅棗

費 經水紫黑。來時嘈雜。脈絡收引而痛。經過帶下不斷。形瘦日減。脈來右大左弱。上部火升。下焦冷徹。骨中陰陽乖違。焉得孕育。閱醫都以補血濇劑。宜乎鮮效。議通陽攝陰法。

鮑魚 生地 淡從蓉 天冬 當歸 柏子仁 炒山查 牛膝 茯苓 紅

棗斬艾湯法丸。

倒經

朱 女冲年天癸未至。春陽升動。寒熱衄血。平昔溺後腰痛。耳目甚聰明。先天質薄。陰本難充易虧。最多倒經之慮。

雄烏骨雞 生地 生白芍 茯神 天冬 知母 牛膝 羌蔚子 女貞子

阿膠

諸藥除阿膠用水煎汁二次。其烏雞去毛及翅足。另以童便一碗。青蒿汁四碗。醇酒二碗。米醋一碗同煎。再加入前藥汁收膏。入阿膠收。燉服五錢。

張 十七歲天癸不至。咳嗽失血。乃倒經重症。先以順氣導血。降香末 鬱金 鈎藤 丹皮 蘇子 炒山查 黑山梔



南京中医药大学图书馆版权所有