

兒科全生集卷三



痘後表裏俱虛調護悉宜加謹一有疎漏以實投虛
病卽終身不拔非細故也最要節飲食飲食不節脾
氣受傷脾係一身根本之地精神生發之源有因過
飽終身不能多食者有爲一物所傷終身不能一見
者有因偶爾失調致脾氣不實遂成痼疾者皆能致
肌肉不長面不華色然此尙屬日後久遠之慮曾有
一兒痘已收功喜食圓眼因過愛而不之禁縱及飭
許遂致腹脹如毬喊不絕口一懷抱而更加喘悶以
廣皮萊菔子半生炒前胡腹皮水洗麥芽炒人參各一錢

山查二兩煎服及逾時大解極多所食未化者幾半
逐後調理而愈

範簧

六十一

範簧者聽其聲也如笙之簧痘至六七日喉門緊閉
嗚嗚如小鵝聲者是毒攻肺金急補元氣理肺金喉
門燥渴倏時音啞毒熾腎枯不可投香燥之藥亦不
可用峻補之劑止宜清金潤肺如忽然晝夜睡臥不
寧啼哭至喉門如雄鴨聲者是囊漿不足元氣虛散
再當觀其兩眼封蛤肚腹不脹急服保元湯六十一之

劑救之

蛔虫狐惑潰爛六十二

吐蛔痘色灰白吐瀉交作吐蛔者難治此虛寒之極也安蛔湯百零主之痘後吐痢蛔出者此虫爲熱所蒸而出也熱在胃則吐蛔黃芩半夏湯八十加烏梅川椒熟在腸則下痢蛔黃芩湯八十加桃仁吐痢蛔看出肉色若鮮紅尙有生意若虫嘴已白或死則胃氣絕矣不治痘後吐痢虺曰痘裏屎虫胃氣離人參白朮與陳反茯苓甘草當歸併煎來連服白虫除一

方蓮子去心半筋猪肉去皮水煮熟下砂仁伏醬燐
之胃氣接養虫自安換擲中君切勿投而手足厥冷
者爲虵厥若不出而內食臟腑爲狐惑之症其人好
睡默默不欲食如上唇有瘡虫食其臟下唇有瘡虫
食其肛其聲啞啞不定故名狐惑也此候最惡化蠱
丸入主之如大便結者以挑仁承氣湯入十加槐子
利之

潰爛之痘內有生虫者痒不可當有夏月係蠅所生
蛆者有腐爛自生者將銀簪挑去虫或雞子菸香帖

之虫卽出或柳葉舖之將兒卧于其上則虫自出矣

或用香油取之敷以桃花散

四十

或用艾熏之花椒

湯洗之其虫自去可無患若臭而黑爛成窩元氣虧損是死症犯此用芫荽艾葉燒烟熏之以辟其穢氣隨用紫蘇湯揩之以抑其臭潔淨其衣服床被以雞骨炭棕衣灰銀硃冰片赤石脂研末搽之若頂脇胸頸氣窩處臭爛黑見骨者死暑天痘爛難着席夾褥盛麝甚涼軟或以芭蕉葉藉之或用黃豆燒灰油調搽之亦愈

年長男女出痘論

六十三

年長男女有婚配多年者亦有生子及孫者未免真元虧損更加時令不正之氣傳染而值出痘稠密毒火內盛元氣虛血氣弱津液乾枯不能制火以致虛火上炎或煩渴唇焦口苦咽痛鼻衄難任溫補痘必不能成漿結痂最爲難治宜服天元接髓丹三大忌用清涼苦寒之劑肆角地黃湯不知原因氣血不能勝毒氣而致有此症若純用寒涼則血氣愈虧損而毒氣愈肆行豈復有可生之理急宜參麥清補湯十

十首尾皆可深得中和之理必須服多方奏效若膿
漿不行用參歸鹿茸湯六十托之多加生黃耆得有
四五分膿尚可望生若漿不行難愈

室女孕婦出痘論六十四

童女出痘與男子相同無容議也但十四歲後天癸
已通發熱之初正遇經水如期而來此熱隨血解瘡
自發出不必施治若過四五日而不止者則熱入血
室血必妄行爲內動中虧之症矣宜涼血地黃湯百
力加入參倘或腹痛加酒炒香附一錢以和其氣若

非經行之期于發熱時而經忽至者此毒火內熾逼

血妄行之故瘡必多毒必盛急用涼血解毒湯

白一十四

倍加連翹牛蒡使熱清毒解痘出經止方無變患遲

則內虛瘡必陷矣倘不止用老杉樹皮舊棕灰髮灰

調酒服其經立止當起發灌漿之時適遇經行過三

日不止痘不能起發灌漿頂平形塌灰白黑陷此經

血去多陰血虧耗爲陷伏壞症矣急宜四物湯

十三去

地黃加人參黃耆木香熟附以調元氣若寒戰咬牙

喘急腫滿手足厥冷者爲內脫不治或經水去多少

陰之脉不能上榮于舌也宜當歸養心湯七十九主之

待其能言後以十全大補湯八十五治之或經水不斷

身發壯熱神思昏沉言語狂亂者肝移熱于心也宜

瀉肝散五十五加柴胡生地丹皮向來經水不通血海

乾涸適逢出痘其熱必甚以歸脾湯七十六或逍遙散

五十四治之

有孕之婦遇出痘之時或隣家以及同居俱在出痘

急宜到親戚家迴避幾日若不知迴避以致出痘此

時先以托痘爲標次以保胎爲本妊婦最忌出痘蓋

熱能動胎胎落則血氣衰敗痘必不能起發灌漿而

命危矣初起用升麻葛根湯一加酒炒黃芩六分土

炒白朮五分前哲有云白朮健脾能培萬物之母黃芩

蒸不用黃芩以清內熱胎必不能保矣若無孕黃芩不可早用恐寒涼伏其毒痘苗不能及時而發出

也至於長漿之際痘暈之老紅以及紅紫用清毒活

血湯三加土炒白朮六分若痘暈淡白必用千金內

托散五去肉桂加參耆土炒白朮主之若腰疼宜當

歸一錢川芎茯苓川斷杜仲炒各八分玉竹七分黃

芩酒炒白朮土炒各五分甘草三分若血動者四物湯三

加酒炒芩連胎動不安者安胎散

五十

加砂仁過分

婉之期熱氣內蒸而墮胎者扶其上牀不要睡倒必

須強扶少坐一二刻用老酒一鐘入童便半盞和服

行其瘀血痘易出而易起此氣血俱虛宜十全大補

湯

五十

加熟附子主之痘後小腹急痛者此惡露未

盡也黑神散

五十

主之生產之後或半月十日之間

適逢出痘宜入物湯

二十

去芍藥痘多加連翹力子

只照常用藥或十全大補湯

五十

治之切不可妄用

寒涼之劑致傷生發之機也發熱初出之時胎落者

猶或可救但隨胎血不止者凶胎不墮大熱不退者
亦凶身熱足冷腹脹者八物湯二百十加木香脾氣虛
不進飲食毒發不出者四君子湯二十加砂仁木香
起脹灌膿而胎墮者多致不救宜十全大補湯五十
救之蓋氣血衰敗不能逐毒出外而然惟收靨之時
胎落者多無事矣

芽兒 六于五

一二月小兒名紙棚小鼓肌肉柔由脆翠切防心經
梟毒厚培元本亦可無憂又小兒未周歲出一身密

痘爲樹小花多雖頂圓色潤似爲美症至于灌膿將
半多不成漿而死此乃氣血不勝其毒故也須大補
氣血爲主

被凍

六十六

起發行漿時爲寒所觸則形色如葡萄或如痣點乃
以應用藥加肉桂木香一服立轉紅活而愈

避忌

六十七

一戒好潔房中幃帳衽席自是宜潔至痘見之體自
頭面及身任其穢則穢任其臭則臭究其日久而穢

臭猶存者以收斂之局未盡也收斂未盡精神猶在
于肌表而未還元欲滌其穢而反以滌其神如之何
其可也有一兒痘將一月其母愛潔竟濯之以湯而
且暢其浴次日徧體浮腫喘急投以五皮湯十四胃苓
湯五十數服乃愈

腋下狐臭氣房中淫液氣行遠勞汗氣溝糞濁惡氣
婦人經候氣諸瘡腥臭氣砒硫蚊烟氣誤燒頭髮氣
吹滅燈燭氣柴烟魚骨氣葱蒜韭氣煎炒油烟氣
醋酒葷腥氣麝香燥穢氣生人往來罵罵呼怒勿對

飲食勿對梳頭勿對謊言勿對搔痒勿對掃地勿使
僧道師巫入房醫人不可咳嗽多言慎之如被房事
經水生產之穢所觸者俱大棗燒烟解之若被酒厭
者則葛根茵陳青蒿燒烟解之被五辛厭者以生姜
燒烟解之被死屍之氣及癘氣所犯者則以大黃蒼
朮燒烟解之爲臭犬羊厭則燒楓毬解之遇風雨濕
氣者則燒蒼木楓毬解之若血少漿難之痘則忌燒
蒼朮蓋恐愈燥而漿愈難耳若遇諸惡氣則以乳香
燒烟熏之遇經水厭者以月月紅花葉枝煎湯服之

月內小兒產後瘀血而厭穢者乎曰氣血原屬一本
非外人可比正所謂母不厭子也

以上諸避忌謹之則重可變輕不謹則輕變重矣
蓋痘疹謂痘方愈而疹隨發因痘後餘毒未盡更兼
恣意飲食外感風寒以致徧身出疹色赤作痒始如
粟米漸成雲片宜加味清毒飲三十疎風清熱疹即
愈矣

美惡諸痘名 六十八

額鼻地閣爲三鎮稀朗高聳爲狀元總之稀疎潤美