

婦人良方

婦人良方卷之九

薛氏醫按

臨川陳自明編

吳郡薛

已註

新

都

閔道致校

求嗣門

疾病既無須知求嗣故以次之

陳無擇求子論第一

有夫婦則有父子婚姻之後必求嗣續故古人謂不
孝有三無後爲大者言嗣續之至重也凡欲求子當
先察夫婦有無勞傷痼疾而依方調治使內外和平
則有子矣

愚按丹溪先生云人之育胎者陽精之施也陰血

能攝之精成其子血成其胞胎孕乃成今婦人無
子者率由血少不足以攝精也血之少也固非一
端然欲得子者必須補其精血使無虧欠乃可以
成胎孕若泛用秦桂丸之劑薰戕臟腑血氣沸騰
禍不旋踵矣竊謂婦人之不孕亦有因六淫七情
之邪有傷衝任或宿疾淹留傳遺臟腑或子宮虛
冷或氣旺血衰或血中伏熱又有脾胃虛損不能
營養衝任審此更當察其男子之形氣虛實何如
有腎虛精弱不能融育成胎者有稟賦元弱氣血
虛損者有嗜欲無度陰精衰憊者各當求其原而

治之至于大要則當審男女之尺脉若左尺微細
或虛大無力者用八味丸左尺洪大按之無力者
用六味丸兩尺俱微細或浮大者用十補丸又巢
氏謂夫妻年命制克墳墓不利者理或有之若誤
用辛熱燥血不惟無益反受其害今以素不生育
病愈後而得子
者附
于左

治驗

餘見醫學綱
目求嗣部

一婦人月經淋瀝愈而生子

見一卷月
水不斷

一人患陽氣虛寒愈而生子

見五卷冷勞
第四症

一婦人患結核愈而生子

見二十四卷結
核類第三症

一婦人稟弱經行腹痛愈而生子見十卷經

一婦人素虛弱患鶴膝風愈而生子見二十四卷膝風

一婦人患瘰癧愈而生子見二十四卷瘰癧第一症

一婦人患蘭唇愈而生子見二十四卷瘰癧第一症

褚尚書求男論第二

建平孝王妃姬皆麗無子擇民家未笄女子入御又

無子問曰求男有道乎澄對曰合男女必當其年男

雖十六而精通必三十而娶女雖十四而天癸至必

二十而嫁皆欲陰陽完實然後交而孕孕而育育而

子堅壯強壽今未笄之女天癸始至已近男色陰氣

早洩未完而傷未實而動是以交而不孕孕而不育
而子脆不壽此王之所以無子也然婦人有所產皆
女者有所產皆男者大王誠能訪求多男婦人至宮
府有男之道也王曰善未再期生六男夫老陽遇少
陰老陰遇少陽亦有子之道也

無子論第三

夫無子者其因有三一墳墓風水不利二夫婦年命
相剋三夫婦疾病墳墓不利年命相剋此非藥力可
致若夫婦疾病必須藥餌然婦人無子或勞傷血氣
或月經閉澁或崩漏帶下右尺浮則爲陽絕或尺微

瀉或少陰脉浮緊或尺寸俱微弱者皆致絕產若調
攝失宜飲食不節乘風襲冷結於子臟亦令無子也
千金翼求子方論第四

論曰婦人之居幽閨類多血氣不調胎妊生產崩傷
之異比之男子十倍難療其或七情失宜或飲食無
度或胎瘡未愈而遽合或登廁屢入陰戶便成痼疾
若欲求子交感之時必天日清明神思清爽氣血諧
和與天德福德相合夫婦本命五行相生并本命帝
旺而生者則壽而賢否則不可得也

交會禁忌第五

凡求子宜吉良日交會當避丙丁及弦望晦朔大風
雨霧寒暑雷電霹靂天地昏冥日月無光虹蜺地動
日月薄蝕及日月火光星辰神廟井竈園厠冢墓屍
柩之傍若交會受胎多損父母生子殘疾夭枉愚頑
不孝若交會如法則生子福德智慧驗如影響可不
慎哉

男子受胎時日法第六

凡男女受胎皆以婦人經絕一日三日五日爲男仍
遇月宿在貴宿日若以經絕後二日四日六日瀉精
者皆女過六日皆不成胎又遇旺相日尤吉夜半入

房生子者賢明貴壽餘時皆圖

推支于旺相日法第七

春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸
寅卯夏巳午秋庚酉冬亥子

推每月宿日第八

正月

初一初六初九初十十一十二十四二十一二十三

四二十九日

二月

初四初七初八初九初十十一十二十四十九二十

二十七 二十八 二十九 三十 三十一 三十二 三十三 三十四 三十五 三十六 三十七 三十八 三十九 四十 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

三月

初一 初二 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十

四月

初一 初二 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十

二十八日 廿九日

五月

初一 初二 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十

五十六 五十七 五十八 五十九 六十 六十一 六十二 六十三 六十四 六十五 六十六 六十七 六十八 六十九 七十 七十一 七十二 七十三 七十四 七十五 七十六 七十七 七十八 七十九 八十 八十一 八十二 八十三 八十四 八十五 八十六 八十七 八十八 八十九 九十 九十一 九十二 九十三 九十四 九十五 九十六 九十七 九十八 九十九 一百

六月

初一 初二 初三 初四 初五 初六 初七 初八 初九 初十 十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九 二十 二十一 二十二 二十三 二十四 二十五 二十六 二十七 二十八 二十九 三十

六初一初三初十十三十八二十三二十六二十七

二十八二十九日三十人三十八三十九

七月一初二初三初四初五初六初七初八

初九初十初十一初十二初十三初十四初十五

初十六初十七初十八初十九

八月一初二初三初四初五初六初七初八

初九初十初十一初十二初十三初十四初十五

初十六初十七初十八初十九初二十初二十一

九月

初三初六初九初十二初十五初十八初二十一

十四日

十月

初一初四初九十四十七十八十九二十二十一

二十九日

十一月

初一初六十一十四十五十六十七十九二十六

二十九日

十二月

初四初九十二十三十四十五十七二十四二十

七日

醫安

婦人良方卷之七

六

春合甲寅乙卯夏合丙午丁巳秋合庚申辛酉冬
壬子癸亥與土件月宿日合者佳

求子服藥須知第九

曰夫人求子服藥須知次第男服七子散女服盪
胞湯紫石英門冬丸及坐導藥則無不效矣

七子散 主丈夫氣虛精氣衰少無子

牡荊子

五味子

兔絲子

車前子

籜蓂子

山藥

石斛

熟地黃

杜仲

鹿茸

遠志

各八分

附子

炮

蛇牀子

川芎

各六分

山茱萸

天雄

各五分

桂心

十分

白茯苓

牛膝

人參

黃芪

各五分

巴戟

十二分

薤蓉

七分

鍾乳粉

八分

右為末每服錢許日二服酒調一方加覆盆子二

錢

慶雲散 主丈夫陽氣不足不能施化

覆盆子

五味子

各二升

兔絲子

一升

白朮

炒

石斛

各三兩

麥門冬

十五兩

天雄

各九兩

紫石英

二兩

桑寄生

四兩

右為末食後酒服錢許日三服或米飲調冷去桑
寄生加細辛四兩陽事少去石斛加檳榔十五箇
盪胞湯治婦人全不產育

朴硝
牡丹皮
當歸

大黃蒸一飯久
桃仁各三兩
細辛

厚朴
苦梗
赤芍藥

人參
茯苓
桂心

甘草
牛膝
陳皮各二兩

附子炮一兩半
蜜蟲炒焦去翅足
水蛭炒各十枚

右每服六錢酒水合盞半煎日三服夜一服少頃

下血膿力弱者用一二服惡物不盡方用坐導藥
坐導藥 治婦人全不產及斷續更服湯鹽脫湯

皂角

去皮
一兩

吳茱萸

當歸

大黃

晉礬

戎塩

川樹

各二
兩

五味子

細辛

乾薑

各三
兩

一方無茱萸有亭
歷苦瓢各三分

細辛

右爲末以絹袋盛如指狀入陰中如欲小便去之

一日仍易之如子宮有冷水天陰則痛須候下盡

而止藥每日早晚用苦菜煎湯薰洗著藥後一日

服紫石英丸

紫石英九

紫石英

天門冬

各三兩

紫葳

牡蒙

各二兩

粉草

一兩半

桂心

川芎

卷柏

烏頭

炮

熟地黃

乾

辛夷仁

禹餘糧

煅

當歸

石斛

各三兩

烏賊骨

牛膝

薯蕷

各六分

桑寄生

人參

牡丹皮

乾薑

厚朴

續斷

食茱萸

細辛

各五分

柏子仁

一兩