

雲岐子保命集論類要

一



靈敏手標各組的練習

一



雲岐子保命集論類要 一

撰人未詳

中華書局

中華書局

雲岐子保命集論類要

二

撰人未詳

叢書集成初編

雲岐子保命集論類要 二冊

中華書局出版發行

(北京王府井大街三十六號)

秦皇島市資料印刷廠印刷

一九八五年北京新一版

開本：七八七乘一〇九二毫米三十二分之一

統一書號：一七〇一八·一五一

雲岐子保命集論類要卷上

辨脉三部九候

凡持脉須明三部九候不知者未足言診脉之道三部者寸爲上部主鬲上至頭之有疾關爲中部主鬲下至臍之有疾尺爲下部主臍下至足之有疾故爲三部也九候者浮診三指之下浮診三候者三而成天中診三候者三而成人沉診三候者三而成地三而三之故爲九候此四十五動平脉法也如三指之下浮診得六數七極者熱實於表當瀉表宜麻湯如浮診得三遲二敗者爲表虛也當補其虛宜桂枝湯如中診得六數七極者是中焦之熱實宜調胃承氣湯瀉之中診得三遲二敗者中焦虛也當補之以建中湯理中湯如沉診得六數七極者下焦熱實以大承氣湯瀉之

沉詠得三遲二敗者下焦之虛也以姜附湯補之

麻黃爲瀉能瀉表之實不能瀉裏之實桂枝湯爲補而能補表之虛不能補裏之虛姜附爲補不能補表之虛而能補裏之虛承氣爲瀉能瀉裏之實不能瀉表之實建中之補能補中焦之虛而不能補上焦下焦之虛調胃爲瀉能瀉中焦之實而不能瀉上焦下焦之實也

辨傷寒溫病

問曰傷寒溫病何以脉辨蒼曰溫病冬傷於寒所得也至是變爲溫病傷寒汗下不愈而過經其證尚在而不除者亦溫病也經曰溫病之脉行在諸經不知何經之動隨其經所在而取之

如太陽證汗下後過經不愈詠得尺寸俱浮者太陽溫病也

如身熱目疼汗下後過經不愈訖得尺寸俱長者陽明溫病也
如脊脇痛汗下後過經不愈訖得尺寸俱弦少陽溫病也
如腹滿脹乾訖得尺寸俱沉細過經不愈太陰溫病也
如口燥舌乾而渴訖得尺寸俱沉過經不愈少陰溫病也
如煩滿囊縮訖得尺寸俱微緩過經不愈厥陰溫病也
是故隨其經而取之隨其證而治之如發癰乃溫毒也

刺傷寒結胃瘧氣

傷寒下後結胃瘧氣皆足三陰之終手足三陰之始胃中結瘧過
在足少陰腎手厥陰包絡刺兩經之井原以瀉胃中之氣心
中結瘧過在足太陰脾手少陰心刺兩經之井原以瀉心中
之氣

胃中結瘧過在足厥陰肝手太陰肺刺兩經之井原以瀉胃

中之氣 或上中下三脫應瘕結而瀉之

刺傷寒三陽頭痛

傷寒三陽頭痛何法刺之荅曰手之三陽足之三陽皆會於頭者謂諸陽之會其受邪伏留而不去故曰三陽頭痛視其色脉知在何經

如脉浮而頭痛過在足太陽刺腕骨京骨

如脉浮而長過在手陽明刺合骨衝陽

如脉浮而弦過在手足少陽刺陽池丘墟風府風池刺頭痛之法也

刺三陰腹痛

傷寒邪在三陰內不得交通故爲腹痛手足之經皆會於腹如脉弦而腹痛過在足厥陰肝手太陰肺刺太衝太淵太陵

如脉沉而腹痛過在足少陰腎手厥陰心包刺太谿太陵
如脉沉細而腹痛過在足太陰脾手少陰心刺太白神門三
陰交刺腹痛之法也

桂枝湯二十八證方一十四道

桂枝湯

桂枝加葛根湯

桂枝加厚朴杏子湯

桂枝加附子湯

桂麻各半湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝二越婢一湯

桂枝甘草湯

桂枝加桂湯

桂枝加人參湯

桂枝去桂加白朮湯

桂枝加大黃湯

桂枝湯論

尺寸俱浮太陽受病當一二日發以其脉上連風府頭項痛腰脊強太陽經始於目內眥從頭下至足終於至陰爲表之表其太陽者標熱本寒爲太陽之表表陽則熱本者膀胱之裏主水故寒脉浮爲在表故太陽經病身熱惡寒頭痛項強腰痛凡治太陽不可利小便不可妄下利小便者熱傳於裏而爲血證下之則變爲結曾此太陽病所禁也若傳於本者可利小便本爲膀胱有熱小便赤澀何禁也太陽中風風傷衛衛氣虛而脉浮身熱自汗惡風宜桂枝湯補之表虛故也桂枝辛熱生姜辛溫甘草甘平大棗甘溫芍藥酸苦微寒而收實其衛氣而止汗辛甘發散風邪爲陽矣



桂枝

芍藥

生姜

各參兩

甘草

貳兩

大棗

拾貳枚擘

如劉如麻豆大每服五錢水二盞煎至八分去滓溫服

太陽中風陽浮者寸浮也陰弱者尺弱也表虛自汗鼻鳴者肺通於鼻鼻和則聞香臭矣肺氣受邪而不通肺主衛風傷衛故鼻鳴乾嘔汗出惡寒太陽標病當補其衛汗不得外泄故使榮氣內守宜桂枝湯

太陽脈浮而弱不及平脈頭痛項強發熱汗出惡風者太陽標病故宜桂枝湯

太陽標病脈浮而長項背強者太陽也凡凡發熱不惡寒者陽明標病與太陽相併均宜桂枝加葛根湯

桂枝加葛根湯

桂枝

芍藥

甘草

各四兩
炙

葛根

兩

生薑

兩

大棗

十二枚

右剉如麻豆大每服五錢煎服

太陽標中風身熱頭痛項強惡風反下後脈浮而弱自汗而喘
肺主於氣上逆而喘因下動胃氣加厚朴屬陽明上氣而逆
屬肺加杏仁故宜**桂枝加厚朴杏仁湯**

桂枝

芍藥

生姜

各壹兩

甘草

陸分

大棗肆枚

厚朴

杏仁

各加伍分

右劉如麻豆大每服五錢水二盞煎服

太陽標本病頭痛項強惡風身寒自汗脈浮而微發汗遂漏不
止小便難而清四肢急難以屈伸者太陽標與少陰本相併
故宜**桂枝加附子湯**

桂枝

生姜

各壹兩

大棗

叁枚

芍藥

甘草

各壹兩

附子

半枚

右劉如麻豆大水煎服

太陽標本病頭痛惡寒下之後胃滿脈促太陽標太陰本相併

桂枝加芍藥湯脈微而遲太陽與少陰相併故加附子

桂枝加芍藥湯

桂枝

生薑

各壹兩半

芍藥

參兩半

大棗

陸枚

痛甚者加大黃

大實痛裏傳表

右咬咀每服五錢水煎服

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝

甘草

生薑

各壹兩半

大棗

陸枚

附子

去皮臍米泔浸

右咬咀每服五錢水煎服

太陽標病脈浮而大頭痛項強八九日如瘧狀熱多寒少不嘔

者無少陽清便自調者裏和也寒熱榮衛俱病故宜

桂枝麻黃各半湯

桂枝

捌錢

芍藥

生薑

甘草

各半兩

大棗

貳枚

麻黃

半兩去節

右咬咀每服五錢水煎服

太陽標病頭痛項強身熱惡寒脈浮而洪過於平脈而自汗不止衛氣不與榮氣諧和刺風池風府整太陽之綱却與桂枝汗又不止形似瘡一日再發非桂枝證也脈洪大者故獨桂枝不愈可與桂枝二麻黃一湯和其榮衛

桂枝二麻黃一湯

桂枝剉錢半

芍藥伍分半

麻黃參錢去二

大棗貳枚

生薑伍錢半

杏仁捌枚浸去皮尖

右剉如麻豆大每服五錢水煎服

太陽病頭痛項強執多寒少脈微而弱陰脈也執多寒少有陽

明太陽與陽明標併宜**桂枝湯**

桂枝

芍藥

甘草

麻黃各參錢

生薑伍錢半

石膏半兩

大棗貳枚

右咬咀每服五錢水煎服

桂枝證或下之頭項強痛發熱無汗心下痛疼小便不利熱不

除宜建桂枝湯加茯苓白芍湯

芍藥壹兩半大棗陸枚

甘草

生姜

茯苓

白朮

各壹兩

右咬咀每服伍錢水煎服小便利止後服

太陽標病身熱頭項強寸浮尺弱寸浮汗自出尺弱熱自發
陰虛則發熱陽浮則惡寒翕翕發熱爲肌熱鼻鳴乾嘔者裏
和表有病桂枝湯主之

太陽病如瘧頭痛項強發熱惡寒熱多寒少一日三二度發脈
浮微緩者欲愈也脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可發汗更
下更吐也

如汗下後面反有赤色者未解也不能得小汗出非獨桂枝

證也身痒者榮衛不行可用桂枝麻黃各半湯

太陽經病外證未解脉浮弱者浮者爲陽弱者爲陰法當自汗故宜桂枝湯

太陽病禁下下之後身熱惡風脉浮者表未解脉浮而微者陰也法微喘而爲傷肺下之傷胃故宜桂枝厚朴杏子湯

太陽病身熱惡寒惡風脉浮者表未解下之逆也解表宜桂湯
太陽病身熱惡寒惡風脉浮而弱自汗出而不止榮衛不和也宜桂枝湯

太陽病脉浮而弱身熱小便清知不在裏太陽本不病邪在標宜桂枝湯

太陽病頭痛項強身熱發汗則解半日復煩者脉浮數未解也可更發汗宜桂枝湯