

新編名方類證醫書大全卷之二

龍峯 熊宗立 道軒 編集

寒

寒為天地殺厲之氣故見於冬則為霜為雪草木因之而摧敗
鳥獸各巢穴以自居氣體虛弱之人或調護失宜衛戶道途一
時為寒氣所中則昏不知人口噤失音四肢僵直卒急疼痛或
洒洒惡寒翕發熱面赤若有汗五臟之虛者皆能有所中也
其脉多遲而緊挾風則脉帶浮眩暈不仁兼溫則脉濡而四肢
腫痛治療之法只宜以姜附之藥溫散寒氣切不可妄有吐下
如古卷裏節者難治

中寒

治法

治法虛中寒昏不知人及脘腹冷痛霍亂轉筋

一切虛寒並皆治之

乾姜一兩 附子生去皮臍細切一枚

右咬咀每服三錢水盞半煎七分食前溫服

(二) 治五臟中寒口噤失音四肢強直

人參 乾姜 甘草 白朮各等分

右咬咀每服四錢水盞前服三因方加附子名附子理中湯

(三) 治中寒氣虛陽脫氣息欲絕不省人事及傷寒

陰厥百治不効

葱一握以索繩纏如餅餠大去根葉惟存白長二寸許先以

火燒一面令通熱勿令灼人乃以熱處着病人臍下上以熨

斗盛火熨之令葱餅熱氣透入腹內更作三四餅過一餅壞

不可熨即易一餅候病人醒手足溫有汗乃着更服姜湯一

瓊良或四逆湯之類若熨而手足不溫者不可治

(四) 中寒熨法

宜以吳茱萸二升酒裏煮濕以絹袋盛熨心腹及脚手心候氣通暢勻暖即停止累用有效

(五) 治傷寒陰證憎寒慄風正氣逐冷

半夏

厚朴各三兩為末生薑四兩

藿香葉

陳皮各乙兩甘草七兩炒

右為細末每服二錢生薑三片棗一枚水一錢煎七分食前稍熱服常服順氣寬中辟除瘟疫

(六) 治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔

吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風无問内傷生冷外感風寒及寒濕客于經絡腰脚酸疼及婦人經血不調或難產並治之

白芷

陳皮法白

厚朴法製四兩桔梗去芦十二又

枳殼法製六兩川芎

甘草

茯苓各三兩



蒼朮

二兩 湯洗去皮

當歸

三兩

麻黃

去節六兩

肉桂

去皮

芍藥

各三兩

乾姜

四兩

半夏

湯洗三兩

石

呖咀

每服四錢水一盞

姜三片

葱白三個

煎七分

熱服

胃

寒用

煨姜

挾氣則加茱萸

婦人調經

催產則入艾醋

治

沉寒痼冷

臟府虛憊

心腹

疝痛脇肋脹滿

通治

治

沉寒痼冷

臟府虛憊

心腹

疝痛脇肋脹滿

治

沉寒痼冷

臟府虛憊

心腹

疝痛脇肋脹滿

泄瀉腸鳴自汗自利

方見四門

七

暑

暑之為氣在天為熱在地為火在人為心是以暑之中人先

着於心凡中之者身熱頭痛煩渴口燥甚則昏不知人手足微

冷或吐或瀉或喘或滿入肝則眩暈頭痺入脾則昏睡不寤入

肺則喘滿痿痺入腎則消渴其脈多沉伏一時昏中者切不可

便與冷水并卧濕地古法當以熱湯先灌及用布衣醮熱湯

敷

南京中醫藥大學圖書館

1661

南京中醫藥大學圖書館

1661

南京中醫藥大學圖書館

臍下及氣海續二以湯淋布上令煖氣透徹臍腹俟其甦省進以黃連香薷散五苓散若體虛者冷香飲子霍亂吐瀉來復用二氣丹夾食則用胃苓湯若挾風則其脉沉而浮證有搐搦當於黃連香薷散內加羌活煎服却不可作驚癇治之多致不救此方乃嚴氏累用之而有驗者若旅途中卒然暈倒急扶在陰涼處掬道上熱土於臍上撥開作竅令人尿於其中以待求熱湯并生姜或大蒜各一塊嚼爛以湯送下立醒

冒熱

八

治伏暑嘔吐

石膏四兩

知母一兩

甘草一分

粳米一合

右為剉散每服水煎熱服如伏暑作寒熱未解宜和五苓散同煎服伏熱後或冷水沐浴或喫冷物清氣在脾不克解令日作寒慘壯熱渾身洒淅宜加桂煎服出汗便解

九

治太陽中暈脉弦細孔遲小便已洒然

治太陽中暈脉弦細孔遲小便已洒然

治太陽中暈脉弦細孔遲小便已洒然

治太陽中暈脉弦細孔遲小便已洒然

治太陽中暈脉弦細孔遲小便已洒然

治太陽中暈脉弦細孔遲小便已洒然

治太陽中暈脉弦細孔遲小便已洒然

毛茸口開板齒者緣腹理司開闔寒則皮膚急腹理閉熱則皮膚緩腹理開則洒然寒閉則熱而悶即白虎湯內加入參

十一 治伏暑發熱嘔吐惡心

黃連 去須三好酒五升

右黃連以酒煮乾研為細末麩糊為圓如梧桐子每服三十圓熱水吞下

十一 治中暑身熱小便不利此寒性涼除胃脘積熱

滑石 研粉 甘草 微炒一兩

右為末每服三錢加蜜少許熱湯冷水任下如欲發汗以葱白豆豉湯調下

傷冷 治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或泄或嘔

硝石 硫黃 各等分

右為末於銀石器內火炒令黃色二冊研用糯米糊為圓梧桐

子大每服四十圓新井水下不拘時

(十二)

(十三)

治虛中伏暑煩燥引飲服涼藥不得者

草薹仁

三兩

附子

炮去皮

橘紅

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服一兩水二椀薑干片煎一半沉冷不拘時

(十四)

治夏秋傷暑引飲過食生冷無度脾胃不和或

成霍亂之證

良薑

二兩

檀香

二兩

附子

炮去皮

丁香

二兩

川薑

炮三分

甘草

炒

草豆蔻

五个

去殼

右為末每服五錢以水二升煎十數沸貯瓶內沉井底代熟

水服大能消暑止渴

發熱不調

治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍

亂嘔吐臟腑不調

(十五)

甘草

三十斤

乾姜

四斤

杏仁

法

煨

肉桂

去

粗皮



右先將并草用白砂炒及八分黃熟次入乾姜同炒却入杏仁候杏仁不作聲為度用篩二淨後入肉桂一處搗羅為末每服三匙水一中盞煎七分溫服如煩燥并花水調下不計時候以沸湯點服亦可

十六

治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水

硝石

二兩同硝黃為末入標內以微火炒用枳殼搗

大陰玄精石

研飛一兩

五靈脂

水浸過砂石

舶上硫黃

透明者一兩

青皮

去白二兩

陳皮

去白二兩

右用五靈脂二橘皮為末次入玄精石末及前一氣末拌勻

好醋打糊為圓或豆大每服三十圓空心米飲下

霍亂

治冒暑伏熱霍亂嘔吐小便不利頭目昏眩

澤瀉

白朮

白茯苓

各等分

十七

右咬咀每服四匙水一盞薑五片燈心十莖煎八分不拘時



十八

治伏暑引飲過度腹肚膨脹霍亂瀉利並

皆治之

白茯苓去皮 白朮

猪苓去皮 滑石研 各二兩

寒水石研 甘草炙

澤瀉各一兩 肉桂去皮半兩

右為末拌勻每服三錢熱湯冷水任下入蜜少許亦好

十九

治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉並皆治之一

方又加黃連四兩用姜汁同炒令黃色名黃連香薷散如有瘡

搗加羌活煎服

白扁豆半微炒 厚朴去皮姜汁

香薷去土一升

右以咀每服三升水一盞入酒少許煎七分沉冷不拘時

煩渴

治暑煩渴飲水過多心腹脹滿小便赤少

肉桂去皮 赤茯苓去皮各五兩

二十

右為末蜜同每兩作十圓每服一圓細嚼白湯冷水任下

〔二十一〕 消暑氣除煩渴

縮砂仁

乾葛

烏梅肉

白扁豆 各二兩

草菓

煨去殼

甘草 各四兩

右咬咀每服四錢水一大碗煎八分以水沉冷服

〔二十二〕

治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉

去毛炙

香薷 三分

白茅根

麥門冬

去心

丁香

甘草炙

乾木瓜

各一兩

陳皮

半兩

厚朴

去皮

薑汁

右為末每服二盃水一盞姜二片煎煩燥冷水調下

〔二十三〕

治傷寒中暑大汗後胃中乾煩躁不得眠

猪苓

去皮

茯苓

去皮

白朮

各半兩

桂

去皮

澤瀉

一兩

右為末每服二錢熱湯調下愈妙加滑石二兩甚佳喘咳煩

心不得眠者加阿膠

半兩

夏月大暑新水調服立愈

〔二十四〕

治中暑不惡寒煩渴不已方見傷寒門

三十五

小水胡湯治中暑煩渴口乾極用冷服方見傷寒門

通治

消暑圓

治伏暑引飲脾胃不利

三十六

半夏

霜炙

甘草生用

茯苓

去皮各半斤

右為末姜汁煮糊為圓如梧桐子每服五十圓熱湯下

三十七

消暑龍圓

治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩渴嘔吐昏

悶不食

舶上硫黃

硝石各一兩

白礬

滑石

各半兩

白麩四兩

雄黃

半兩

右五味研末入麩和勻滴水圓如梧桐子每服三十圓新水下

二十八

消暑氣和脾胃

香薷一兩

人參

去芦

陳皮

湯泡

白朮

黃耆

白扁豆

炒去

甘草

炙略

厚朴

姜汁製

乾木瓜

白茯苓

右為末每服二錢熱湯冷水調下

三十九 治中暑煩渴身熱頭痛霍亂吐瀉小便赤少如

心神恍惚加辰砂又名辰砂五苓散

澤瀉二兩肉桂去粗皮赤茯苓去皮十五兩

白朮去五兩猪苓去五兩

右為細末每服二升熱湯調下不拘時

三十

官桂半兩人參藿香各半兩茯苓

白朮甘草葛根澤瀉

寒水石兩滑石二兩木香一分

右為細末每服二錢白湯下新水生姜湯亦可

救急 三十一 治中暑不省人事

猪牙皂莢燒灰甘草炒

等分為末每服二錢溫熱水調下



三十一 治夏月途中卒然中暑悶絕

今患者仰卧以道中熱土鋪放腹上及心頭立甦如無熱土
今患者仰卧以熱尿盪臍腹中間亦良

又方 治中暑迷悶

取蒜研熱湯灌之立愈或用連皮生薑一大塊研爛熱湯灌
下亦甦卒急不得熱湯以冷水研亦可

又方 用道上熱土同大蒜研爛以冷水和去滓飲之即差

濕

濕之爲氣冲溢天地之間流注四時之內射虛之人或爲風雨
所襲或卧卑濕之地或行涉水或感山澤蒸氣或汗出不裏冷
則浸漬脾腎皆能有所中傷者腎者腰痛身重如坐水中小便
不利者脾則四肢浮腫不得伸屈若挾風則眩暈嘔噦心悶煩

熱美寒則拳攣掣痛無汗惡寒常暑則煩渴引飲心腹疼痛面
垢惡寒凡感濕之證其脉多沉緩而微其證多四肢倦怠不舉
法當疎利小便為先決不可輕易汗下并用火攻若有泄瀉等
證又當於各類求之

風濕

治風濕相搏手足攣痛不可屈伸或身微浮腫

羌活 去芦

附子 炮炙

白朮

甘草 各等分

三十三

右以咀每服四錢水一盞半姜五片煎七分溫服不拘時

三十四

治濕氣傷腎肝氣不調自然生風遂成風濕

流注四肢肌肉疼痛

薏苡仁 一兩 當歸

小川芎

乾薑

茵芋

甘草

官桂

川烏

防風

麻黃

人參

羌活

白朮

獨活 各半兩

右為細末每服三錢空心臨卧酒調下日三服

三十三 白朮散 治感風濕身體煩疼無汗惡寒發熱者

麻黃去節 杏仁十六个 甘草二兩 白朮四兩 桂心一兩

右以咀每服四錢水盞半煎七分食前服

三十六 白朮散 治感風濕挾暑煩渴引飲惡風微汗

白朮 茯苓 乾薑 細辛 烏梅

桂心 乾葛 甘草 陳皮 豆豉各等分

右為末每服二錢白湯調下

三十七 白朮散 治風濕相搏骨節煩疼四肢拘急不得

屈伸

附子炮 芍藥 白朮 甘草

右以咀每服半兩水一盞薑五片煎八分溫服

三十八 白朮散 治風濕相搏腰膝疼痛四肢重著不嘔不得大

便堅硬小便自利



甘草炙二兩

白朮四兩

附子

炮去皮片一兩

右咬咀每服三錢水

蓋薑五片棗一枚煎七分空心溫服

三十九

治風濕相搏

客在皮膚四肢少力關節煩疼

防己四兩

黃耆五兩

甘草炙二兩

白朮三兩

右咬咀每服三錢水一盞薑棗同煎七分熱服不拘時

四十

治風濕客搏手足膝腰不能舉動

以木瓜一枚去穰皮開竅填吳茱萸一兩線繫定蒸熟研爛

入塩半兩研勻糊丸梧子大每服四十九茶酒吞下

四十

治風濕相搏身軀煩疼

方見傷寒門

寒濕

治寒濕所傷身軀重着如坐水中小便赤澀大

便澹泄

便澹泄

四十一

蒼朮

白朮

甘草炙

茯苓去皮

乾薑炙

橘紅

丁香

各一分

右吹咀每服四錢水一盞棗一枚薑三片煎七分食前溫服

四十二 治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不得小便自利

乾薑 炮 茯苓 各四兩 甘草 炙 白朮 各二兩

右吹咀每服四錢水一盞煎七分空心溫服

四十三 治坐卧濕地或為雨露所襲身重脚弱關節疼

痛發熱惡寒或多汗惡風或小便不利大腑澀澀

白朮 二兩 人參 半兩 乾薑 炮 白芍藥

附子 炮 白茯苓 去皮 桂枝 不見火 甘草 炙 各半兩

右吹咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎八分不拘時

四十四 治受濕腰痛

附子 生 蒼朮 炒 杜仲 剉 各 牛膝 酒浸 炮 厚朴 剉

乾薑 生 白朮 茯苓 甘草 炙 各 二

右吹咀每服三錢薑三片棗一枚食前煎服

