

外科經驗方

癰疽驗方

外科經驗方

神祕驗方

薛氏醫按

餘杭陶華編
吳郡薛氏校

新黃
英玄有閱

癰疽十段關

癰疽遍身拘急疼痛寒熱宜宣通經絡宜用人參敗

毒散

人參敗毒散

人參

獨活

柴胡

桔梗炒

羌活

枳殼炒

茯苓

川芎

前胡

甘草 各一錢

作一劑水一鍾薑三片煎一鍾服後服內托復散

散入卷

內托復煎散

地骨皮

防已 酒洗

官桂

白芍藥 炒

甘草 炙

當歸 酒拌

茯苓 十兩

白朮 炒

人參

黃芩 炒

黃芪 鹽水拌炒 各一錢

防風 二錢

咬咀先以蒼朮一斤水五升煎去朮入藥再煎至

二升終日飲之粗再煎服

愚按機要云治瘡之法當分三因用前二劑者蓋
爲外因之治也邪在表者用人參敗毒散散之後
服內托復煎散托之使邪不得內侵固爲善也亦
有內因邪在臟致大便不通宜用內疎黃連湯又
有不內外因者便利調勻飲食如故邪在經絡宜
用托裏榮衛湯不可一槩用前二藥也

內疎黃連湯

黃連炒

芍藥炒

當歸酒拌

檳榔

木香

黃芩炒

山梔炒

薄荷

桔梗炒

甘草各十分

連翹錢半

大黃錢二

作一劑水二鍾煎八分食前服

托裏榮衛湯

黃芪炒

紅花

桂枝

蒼朮米泔浸炒

柴胡

連翹各一錢

羌活

防風

當歸身酒拌

甘草炙

黃芩各十分

人參五錢

作一劑水二鍾煎八分食遠服

癰疽大渴發熱或瀉或小便如淋宜用竹葉黃芪湯

竹葉黃芪湯

生地黃

黃芪

各二錢

當歸

酒拌

淡竹葉

川芎

甘草

炙

黃芩

炒

白芍藥

炒

人參

半夏

石膏

煨各一錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食遠服

愚按前證七惡中之一惡也此方治之其功甚捷亦有左手脉浮大而熱或渴者宜發散表邪右手脉沉實而熱或渴者宜疎去內邪若潰後作渴或小便如淋或脉大而無力者屬氣血虛也宜大補氣血亦有潰後熱不止或作渴遂以爲敗證不治

若素有胃火或胃經熱毒未盡胃脉尚數者仍宜服煎湯服而脉反大熱愈甚渴愈作斯爲敗證蓋因真氣虛而邪氣實也今之潰瘍畏石膏黃芩二藥性冷多不肯服若胃脉未靜非此藥莫能治也若因循日久煎熬氣血膿血愈多氣血愈虛反成敗證矣治者當舍證從脉可也大抵瘡瘍之證七惡內見一二惡甚可畏虛中見惡證者不治實證無惡候者自愈

天方托裏黃芪湯

黃芪

錢炒六

甘草

炙

瓜蒌根

錢各

作一劑水二鍾煎八分頻服之加人參一錢亦可
愚用此方治氣虛作渴甚效若氣血俱虛或膿血
大泄作渴或兼發熱者宜用托裏養榮湯

人參

黃芪

當歸

酒拌

芍藥

川芎

白朮

各一錢

五味子

麥門冬

甘草

各五分

熟地黃

用生者酒拌銅鍋內蒸半日

作一劑用水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

癰疽膿血大泄敗臭痛甚宜用黃耆人參湯

黃耆人參湯

人參

蒼朮

米泔浸炒

白朮

炒

陳皮

麥門冬

去心

當歸

酒洗

神麴

炒

甘草

炙

五味子

杵炒各一錢

黃耆

炙二錢

黃柏

炒

升麻

各四分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食遠服

愚按前證七惡中之二惡也宜此方治之亦有後

後虛而發熱或作痛少寐尤效若痛少止大便不

實黃柏麥門冬可不用蓋恐寒中也凡瘡膿潰之

後若脉洪大則難治自利者不治

難痘喘急恍惚嗜卧此心火刑肺金宜用人參平肺散

人參平肺散

桑白皮炒

知母七分炒

杏仁去皮炒

地骨皮

紫蘇

橘紅

半夏薑製

茯苓

青皮

人參各一錢

五味子廿粒炒

甘草炙五分

作一劑水二鍾薑三片煎八分食遠服

愚按此方理氣清肺化痰之劑若肺脉洪數無力者宜用若兼發熱作渴脉洪數有力者宜用如金

解毒散此證火尅金爲惡候面赤者亦不治

如金解毒散

方見後

癰疽目斜視上黑睛緊小白睛青赤肝挾火邪宜用

瀉青丸

瀉青丸

當歸

酒拌

川芎

山梔仁

炒

羌活

草龍膽

酒拌炒

防風

大黃

酒拌炒各等分

爲細末煉蜜丸雞頭實大每服一九煎淡竹葉湯化下日進二三服如瀉去大黃加荊芥或用黃連

瀉心湯一二劑亦可。以高熱而脈下
惡按前證七惡中之三惡也。若肝脈弦緊洪數者
最當亦有目視不正睛不瞭脈微或浮者乃真
氣虛也宜用大補之劑夫瀉青者瀉肝經之火邪
也肝屬木其色青故耳

癰疽四肢沉重宜用胃苓湯

胃苓湯

蒼朮

二錢米泔浸炒

厚朴

薑製

陳皮

原製

甘草

炙

白朮

炒各一錢

茯苓

一錢七分

澤瀉

木香

白芍藥

炒各一錢

官桂 五分

淡竹葉 二十片

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

愚按前證七惡中之五惡也服而若脾氣醒濕氣除宜用參苓白朮散之類多服恐導損津液

參苓白朮散

人參 木其色青 茯苓

白朮 炒

蓮肉 去心

砂仁 炒

薏苡仁 炒

山藥 各二兩

桔梗 炒

甘草 炙

白扁豆 薑汁浸炒去皮

為細末每服二錢用石菖蒲煎湯調下

癰疽嘔吐不下食不知味宜用橘半胃苓湯

橘半胃苓湯

橘紅

半夏

薑製各一錢

蒼朮

米泔浸炒

白朮

炒

厚朴

薑製

甘草

炙

茯苓

人參

澤瀉

茅根

各二錢

薑汁

數匙

作一劑水二鍾煎一鍾入薑汁煎一二沸作十餘

次飲之

愚按前證七惡中之六惡也用此方後胃氣將醒

宜用六君子湯兼服之亦有煩躁飲冷不食驟沉

實而嘔者恐不可用此宜用內疎黃連湯

內疎黃連湯

方見前

癰疽聲嘶色敗唇鼻青赤面目浮腫宜用調胃白朮散

調胃白朮散

白朮

炒

茯苓

各二錢

陳皮

白芍藥

炒

檳榔

澤瀉

各二錢

木香

五分

作一劑水二鍾薑三片煎八分食後服如腫不退

白朮炒

枳實炒各一錢

愚按前證乃七惡也用此方若濕除氣少退用六君子湯參苓白朮散之類大便不實尤效再用檀榔木香恐傷真氣也亦有真氣虛而致前證者尤不宜用二藥

六君子湯

人參

白朮炒

茯苓

半夏薑製

陳皮各一錢

甘草炙五分

作一劑水二鍾薑三片棗二枚煎六分食遠服

參苓白朮散方見前

癰疽胸滿腹痛泄瀉咳逆昏憤宜用托裏溫中湯

托裏溫中湯

羌活

乾薑

炮各錢

附子

炮馬錢

益智仁

搗碎

丁香

沉香

木香

茴香

各一錢

甘草

炙二錢

陳皮

一錢

作一劑水二鍾薑三片煎八分食前服

愚按此寒氣內陷之方也羅謙甫捨時從證曰內

經云寒淫於內治以辛熱佐以苦溫故以乾薑附

子大辛熱溫中外發陽氣自裏之表故爲君羌活