

外科正宗
卷九



楊梅
結毒

骨疽

陰
倉
順

傷寒發頤

痼疾

癰疽

小腹癰

外 龍泉石 口疳 正氣 心

石留疽

穿踝疽

大麻風

翻花瘡

腋
癰

脇
癰
二

鼻痔

骨槽風

天
地
一
氣
一
風

齒病

月
漏

破
鵬
風

跌撲

金
瘡

杖
瘡

溪漫
火燒

甲痘

蘭盾

瘡 癰 瘰 癧

蛇毒

頭痛



清华大学图书馆藏

血箭癰

驚風

腎囊風

齊瘡

血風痛

頤
齋
北

膿
巢
北



外科正宗卷之九

楊梅瘡論第三十六

夫楊梅瘡者以其形似楊梅又名時瘡因時氣乖變邪氣奏變其名
綿花瘡自期綿綿難絕有此三者之稱總由淫熱邪火之化但氣
化傳染者輕精化慾染者重故氣化乃脾肺受毒其患先從上部
見之皮膚作癢筋骨不疼其形小而且乾精化乃肝腎受毒其患
先從下部見之筋骨多疼小水澀淋其形大而且硬如氣化者毒
在皮膚未經入裏宜服萬靈丹洗浴發汗解散皮膚之毒精化者
毒在骨髓未透肌膚宜服九龍丹通利大小二便以消骨中之毒
甚者二服皆可行散之後體實者升麻解毒湯體弱者歸靈內托
散服至筋骨不疼瘡根淡白內毒已解方用點藥輕者半年重則
一載始方得愈如患者不遵此法欲其速愈妄用薰條擦藥哈吸



等法往往致成後患者多矣患者熟思之

楊梅瘡看法

初起無頭疼筋骨不作痛小水無澁淋瘡乾細者輕已生頭面口角無瘡項下胸背雖多穀道無可初生瘡發下疳次生魚口瘡筋骨疼痛瘡發非祥瘡生紅紫堅硬手足多生形如湯潑泡生害非輕淺

楊梅瘡治法

初起先從澁淋次傳筋骨作疼後發其瘡亦宜攻利生後外無疳瘡內無筋骨作痛時氣所感者微散之瘡從交媾不潔乃生下疳小水澁滯不通當行導利上部作瘡瘡多消風清熱下部作瘡瘡甚瀉淫爲先紅紫毒盛瘡高涼血解毒淡白毒輕瘡薄攻補兼行手足皮膚枯槁鵝掌風生栢葉二礬煎湯薰洗卽好頭髮眉毛脫油風何須說



神應養真丹早服稀疎脫點點楊花瓣片片癩風瘡宜服換肌丸効應如同掃

楊梅瘡治驗

一男子患此兩月餘自服敗毒涼劑不應筋骨疼痛尚在此表裏寒涼毒沉難出必以辛熱發之用萬靈丹葱酒煎服洗浴蓋之先出冷汗如雨次出熱汗疼痛減其大半以歸靈湯服至月餘瘡勢始定又以萬靈湯兼補中益氣湯又兩月餘而始痊愈

一男子小便白濁作痛次出疳瘡發腫作爛筋骨微痛予曰欲發時瘡彼不爲信請他醫以薰藥照之雖然疳瘡稍愈而筋骨更疼頭脹欲破又復請治其時紅點滿面此火氣鬱遏難出先用黃連解毒湯二服瀉其火毒次以蟾酥丸發汗使毒透出肌表已後紅點漸漸爲瘡筋骨頭疼從此漸減以加味遺糧湯服至兩月瘡始出



盡骨疼方止又以解毒天漿散相兼服至百日其瘡始退又百而平

一女人大夫生瘡所襲筋骨至疼遇晚寒甚以人參敗毒散四劑其寒乃退疼尚不止又以萬靈丹發汗二次方出點如豆大頭面及背肉無餘隙此毒之盛也以防風通聖散二劑通利大小二便去硝黃加皂角針金銀花又十餘劑其瘡漸大小者如錢大者若杯氣穢作爛起坐不堪外以石珍散摻爛上結疤又爛又摻內服加味遺糧湯兩月餘瘡始漸乾輕者收斂而脫重者又半年方得痊愈矣

一庠生患此月餘乃求速愈予曰此患非他恙所比若速愈必遺毒於後日辭不敢治更醫對曰半月全愈後亦無患因喜不勝用水銀膽礬等藥擦擦手足二心半月內其瘡果愈隨後骨疼諸藥不



應半年後內毒方出作爛疹不堪言遍腿相串並無一空又二年
腿脚曲而不直後成痠疾終身又兼耳聾全不相聽又一人嫖妓
生瘡筋骨疼痛予曰升發方可彼欲內消請他醫以丸藥七圓每
用一圓置炭上燃著以口吸烟至三圓鼻流鮮血至夜而死又一
妓者患此欲其速愈以照藥薰之三日後吐鮮血數盆亦死此
速愈自取危亡者無怨

楊梅瘡主治方

加味遺糧湯加味遺糧湯木瓜
蘇皮皂子靈仙等

芎歸防艾木銀花
木通甘草共參誇

治楊梅瘡初起筋骨疼痛及已成數月延綿不已并楊梅風毒誤
服輕粉癰瘰瘻骨疼不能動履

川芎

當歸

防風

薏苡仁

木瓜

金銀花

木通

白蘚皮

蒼朮

威靈仙

各一錢

甘草

五分



皂莢子

五個切片微炒

仙遺糧

二人參 磨久氣虛者加

水二碗煎八分量病上下食前後服腿腳之下加牛膝一錢病後

者一月可退病深者百日可痊忌牛肉燒酒海腥煎炒此瘡發時

多先起於下疳若以此方預服之可以止其不發梅瘡也

解毒天漿散

解毒天漿散角針 芎歸翹粉銀花草

防風防已 木瓜 蠲脫 薏苡仁

治楊梅瘡不問新久遍身潰爛及筋骨作疼者

天花粉

錢二 防風

防已

皂角針

白蘚皮

連翹

川芎

當歸

海風藤

木瓜

金銀花

蠟脫

米仁

各一錢五分

土茯苓

二兩 藤下部

水二鍾煎八分臨服入酒一杯量病上下服之

升麻解毒湯

升麻解毒湯傳易 同煎皂刺加油服

去病應知卻不難 服過多年結毒頑

治楊梅瘡筋骨疼痛久而不愈及治遠年近日流注結毒皮肉破



爛咽喉損破者並宜服之用升麻新鮮皂角針各四錢上白土茯苓一筋項之以上加白芷咽內加桔梗胸腹加白芍肩背加羌活下部加牛膝各一錢用水八碗煎至四碗作四次一日服盡每次頓熱加麻油三茶匙和勻量病上下食前後服之瘡甚者不過十服

歸靈湯

歸靈湯中四物宜米仁參朮銀花粉

木瓜防已白蘚皮甘草白芷牛膝隨

治楊梅瘡不問新久但元氣虛弱者宜服此藥

川芎 當歸 白芍 熟地 米仁 木瓜

防已 天花粉 金銀花 白蘚皮 人參 白朮

甘草五 威靈仙六 牛膝下部加五分 土茯苓二兩

水三鍾煎二鍾二次量病上下食前後服之渣再煎八分服

防風必効散防風必効散荆防角針木通番白草

槐蒼超藤蘚芷當銀花花粉木瓜商



治楊梅瘡溼熱太盛瘡高稠密元氣素實者服

防風

防已

荊芥

白蘚皮

連翹

槐花

蒼朮

皂角針

海風藤

木通

白芷

花粉

木瓜

金銀花

蕃白草

錢各一

甘草

五

土茯苓

兩

大黃

初起加

三錢

水三碗煎二碗二次服渣再煎一碗服後飲酒一大杯即靜睡一

時許更妙

金蟾脫甲酒

治楊梅瘡不拘新久輕重皆効好酒五斤用大蝦蟆一個浸酒封瓶口煮香二枝取起待次日隨量之大小以醉為度冬夏蓋暖出汗為効存酒次日只服量之半酒盡瘡愈又治楊梅結毒筋骨疼痛諸藥不効者更妙服酒七日後不可見風為要忌口及房事



百日絕根矣

翠雲散

翠雲散中用銅綠
乾用胆調濕末

膽礬輕粉石膏
梅瘡一點便生疤

治楊梅瘡已服內藥根腳不紅瘡勢已退者用

銅綠

膽礬

錢各五

輕粉

石膏

版各一兩

共研極細磁確收貯淫毒乾摻乾瘡公猪膽汁調點三日點其瘡自乾而愈

又點藥方

點藥方中用杏仁
猪胆汁調瘡上點

雄黃輕粉共相研
散發三日自承平

杏仁

四十九粒
去皮尖

雄黃

錢一

輕粉

錢三

先將杏仁搗細加雄黃輕粉細末再研勻猪膽調點

鵝黃散

鵝黃散用重輕一粉
等分爲末摻爛瘡

石膏黃柏要極准
楊梅腐痛最安穩

治楊梅瘡潰爛成片膿穢多而疼甚者宜用之

一石膏

煨

輕粉

黃柏

炒



以上各等分為極細末乾摻爛上即可生疤再爛再摻毒盡乃愈此解毒止痛收乾之効藥也

應用方

萬靈丹

黃連解毒湯見腫瘍門

人參敗毒散

防風通聖散見時毒門

蟾酥丸見疥瘡門

補中益氣湯見潰瘍門

九龍丹見魚口門

神應養直丹見鶴膝風門
祛風換肌散見風癰門

栢葉二礬湯見鴨掌風門

結毒論第三十七

結毒者薰火收過瘡毒而沉於骨髓毒又有未經薰擦見苗未久服藥不多內毒未盡便用點藥收斂鬱遏毒氣者亦能致之發則先從筋骨疼痛日後漸漸腫起發無定處墮便可生發在關節中則損筋傷骨縱愈曲直不伸發於口鼻則崩梁缺唇雖瘡破形更相



發於咽喉者更變聲音般在手足者妨於行走原來苦楚一生毒
遺數代情關一錯禍起一端口初起筋骨冷痛金蟾脫甲酒發汗
愈虛弱者芎歸二朮湯以疼欲破者天麻餅子併吹鼻碧雲散年
餘流串筋骨不愈者五寶散虛弱潰爛疼痛不斂者十全大補湯
同土茯苓煎服初起筋骨痛甚者雷火針法已潰腐爛者解毒
金膏依法施治年遠毒成者玄武丹兼外搽靈藥年近毒淺者只
在百日自然可愈毋得再藥為禍傷人耳
已下看法治法俱照本論醫治自有條款不必重錄

結毒治驗

一男子薰藥之過六年後兩腿骨痛半年始腫以雷火針腫小者一
處腫大者三處針之七日後作膿腐潰內服仙遺糧湯兩月餘其
疼漸止腫亦漸消又兩月方得腐盡肌生更十全大補湯三月而

斂

一男子玉莖患此半年陽物已損七八遇一方士以薰藥照之患流血不止人似鬼形予曰毒發已傷元氣再加薰火一遍血得熱而妄行故去益許此有損之物也恐其難保先以四物湯兼黃連解毒湯合而服之二劑其血乃止更入珍湯加麥冬五味子黃柏知母十餘服元氣乃定外以甘草湯浴洗患上以銀粉散搽之如此月餘氣血漸醒紅肉漸生陽物復長大半仍用前湯加土茯苓二兩煎服此不捨其根本其約有四月之餘其疾乃愈

一男子患此頭疼欲破至夜尤甚苦楚不睡自以解毒藥治之俱不相應診之寸關脉細數而無力此虛陽之火上攻以補中益氣湯加土茯苓一兩服至三劑其疼漸止又十餘劑其疾全安而不再發

一男子患此自膝以下腐爛無空伏枕半年內以芎歸二朮湯外以甘草白芷歸尾葱白煎洗三日一度以解毒紫金膏擦之如此三月餘漸漸而安惟足不能步履以史國公酒藥加土茯苓二斤浸煮又服半年其足方能步履又一料行步亦然如舊

一婦人患此頭疼手腕俱痛診之脉滑而弦此痰毒相兼之病也以天麻餅子服之半月頭痛遂安又以二陳兼四物加紅花升麻黃芩服至月餘而愈

一男子頭額腐爛外搽解毒紫金膏內以薤薤湯兩月餘而斂又一人小腿患之年餘仍以前藥而愈

一婦人咽間損壞半年湯藥難下幾死服結毒紫金丹外吹結毒靈藥一月內其疾遂安又一女人手膊頭背腫痛六七年不潰諸藥不應仍服前藥而安

一男子咽喉腐爛予以遺糧湯內服外用解毒生肌藥治之彼以為緩仍用薰藥照之口爛幾死大便純去墨血吸遍身浮腫飲食不進肌破三月而死

結毒主治方

仙遺糧湯

仙遺糧湯剋芷防
疾意靈仙梳膝草

銀花花粉葛芩當
苓連翹共水煎嘗

治楊梅結毒初起筋骨疼痛已破肌肉潰爛者

仙遺糧

即俗稱土
茯苓是也

防風

荊芥

川芎

當歸

天花粉

金銀花

白芷

薏苡仁

威靈仙

各一錢

山梔

黃連

連翹

乾葛

白芷

甘草

黃芩

各六分

牛膝

下部

水三碗煎二碗量病上下食前後服渣再煎一碗服後飲酒一杯

忌牛肉火酒房事等件更妙



芎歸二朮湯芎歸二朮湯防勝

獨活參苓薏苡仁
草甲銀通土茯苓

治楊梅結毒已成未成筋骨疼痛步履艱辛及潰後腐肉臭敗不能生肌收斂者宜服之並効

白朮

蒼朮

川芎

當歸

人參

茯苓

薏苡仁

皂角針

厚朴

防風

木瓜

木通

穿山甲

炒活各二錢

金銀花二錢甘草

精猪肉二兩土茯苓

水三碗煎一半量病上下服之渣再煎服

消風脫甲散

消風脫甲散紅花
槐子薄藤銀皂刺

番白靈仙槐脫瓜
通蒼蒼木草齊印

治楊梅結毒筋骨疼痛腐爛作臭氣血壯實者

歌

十年十五年五
二十年來三十補

曰

縱然臭爛不堪聞

管教逢人再不吐

番白草

紅花

甘草

威靈仙

山梔

蟬脫



南京中醫藥大學圖書館藏