

奇效良方

此書按症下藥用者咸獲奇効
勸人翻印流傳陰功浩大無量



集選奇效簡便良方卷三

會稽丁堯臣又香彙輯

△婦女

經水不通

石榴根一把要向東者炙乾水二碗濃煎一碗

心熱服二次○或薏苡根兩煎服○或白芥子

末錢二黃酒冲食前熱服數次○又鼠糞燒灰黃

酒下一錢○又方多服飴糖並可治乾血癆○或蕎麥

大胭脂汁為丸每服錢三或韭菜汁入童便炖服

不宜多服

經閉驗胎有無法

川芎一二錢陳艾三四分空心



奇效良方
卷三
婦女
一
宏大書局石印

煎服一匙

有胎則腹內微動無胎則不動

乾血氣痛

絲瓜一根燒存性末空心溫酒調服

經從口鼻逆行

韭菜汁

一盞

入童便

半盞

燙熱服或好

墨磨濃汁一盞飲

經行不止

紅鷄冠花曬乾末水煎酒引每服二錢

忌葷腥三日

○或陳蓮蓬壳燒存性末開水每

調服

二錢

婦人血暈

沒藥末

一錢

黃酒溫服

婦人血黃

黃茄子竹刀切片陰乾為末每二錢黃

酒溫服



北京中醫藥大學圖書館藏

婦人血崩

葶薺

一個

燒存性研末酒調服

○或老

母猪尿晒乾酒服三錢

○或舊蒲席燒灰酒服

三錢○或棉花子

炒一兩

柏葉

三錢

共末每服三錢

○又諸藥不效者

杏仁黃皮

燒存性研末

每三錢

空心酒燉服

○或扁豆花焙乾末每空心服二

錢炒米煮湯入鹽少許調下○或破羅底一個

燒灰

一順手桿末

不可來回

開黃酒冲服○或陳棕燒

存性為末空心淡酒冲服三錢○或鍋底煤三

錢錢熱酒冲服

○或陳蓮蓬

比仙人尹蓮頭方也

壳燒灰存性研末

五錢棉花子燒存性末

三錢

米酒冲服○又蓋牆頭

之舊缸片搥碎如豆大砂鍋內炒熟加醋入滓飲之

經血俱崩 黑驢屎燒存性末麩丸桐子大每日空
心四十丸黃酒下

崩中腹痛 毛蟹壳燒存性末每日米湯下一錢

崩中漏下 青黃赤白者俱難生育 好墨一錢水服日二次

白淫 糯米半升 花柳一兩 共末醋糊丸桐子大每四

十丸食前醋湯調服

白帶 千年石灰五錢 白茯苓一兩 共末麩糊丸桐子大

每服一錢米湯或開水下



又方 孕婦亦可用

馬齒莧汁三鍾雞子清二個調溫

酒服

赤白帶下

舊毡燒灰

白帶用白色赤帶用赤色

日二錢

黃酒溫

服○或扁豆為末米飲下

交媾非時血出不止

青白布同髮煨灰用棉花拌

灰塞入陰戶俟止去之

陰吹

陰中出氣有聲

猪油

四兩亂髮

一升麻

五分柴胡

半錢煎服

陰毛蟲痒

白果打碎搽之

陰中生虱

檳榔嚼汁搽並以少許煎水洗

陰中蟲痒

桃葉搗爛棉裹納入陰中日換三四次



四次蟲盡痒止

陰腫 菊花苗搗煎水薰洗

陰腫生瘡 枸杞根煎水多洗

陰挺 陰中突出一物如蛇形或如菌或如雞冠狀

猪油調藜蘆末敷或

白果嚼敷○或芝蔴嚼敷

陰茄

陰中生物如茄亦名陰挺

茄樹根燒灰為末香油搽○或

烏頭

燒枯研末

醋煎薰洗○

或水仙花兜加紅糖搗

極爛敷

治陰挺尤效如神

或大蒜煎水多洗○或槐白

皮煎洗

內外吹乳

舊葵扇

俗呼芭蕉扇

去筋燒灰

扇風爐多熟年者尤妙



南京中醫藥大學圖書館藏

黃酒冲服

年久無子 二月丁亥日取杏花桃花多須陰乾為末

另擇戊子日和井水煎服一茶匙日三服三月

後必孕

種子良方

專治婦人久虛羸瘦痰血成塊經水不調等症

全當歸

一斤用

長約紅棗二斤準後去核用好燒酒數斤拌過

放砂鍋內隔水燉半日俟水涼後再以好燒酒

二十斤泡二十日取出隨量飲其病若失而孕

臟燥

凡婦人平時悲傷好哭自己不知其故顛狂罵人如有鬼神附之者是

生甘草

三小麥升一紅棗個水六大碗煮三碗分三次服

孕婦無故
心虛驚恐
悲泣並治



乳吹

時時吹氣有聲

硃筆寫子丑寅卯辰巳午未申酉戌

亥等字於本婦所戴簪上

本命所屬之字不寫

戴之即愈

於初起時用之最妙

年久赤白帶下

貫衆

一個去皮毛

好陳醋泡透慢火燒

熟為末空心米湯下每二錢

五色帶下

年久古磚一塊燒極紅以油煎麪餅七

個放磚上再用黃瓜根研末鋪上加布兩層令

人坐上使藥氣薰入腹中當有蟲出治三五次

愈

治陰吹奇效方

猪板油

八兩亂頭髮

如雞蛋大三團肥皂水洗淨

並治男子
女癆黃疸



同熬至髮化分兩次服即愈

婦女陰戶疼痛

此受寒也

葱頭加乳香搗敷

或鹽炒

熱青布包熨之

陰戶生瘡生蟲身發寒熱狀似傷寒又似癰病

蘇嚼爛敷

○或大蒜煎湯頻洗○或硫黃末香

油調搽

赤白帶下

雞冠花為末每錢酒下

白者用白赤者用赤○或

墨魚骨為末服

△胎產

胎前心痛

鹽一撮燒紅酒服



南京中医药大学图书馆藏

胎前腹痛

大紅棗

十四個

燒焦末童便化服

胎前腰痛

大黑豆

一碗

酒三碗同煎每早空心隨

量飲

傷胎結血心腹痛

每日服童便二三杯

胎前咳嗽

川貝

去心麩炒黃研末

砂糖為丸如芡實大口

中含化一丸

胎前瘧疾

夜明砂三錢空心茶和服或研末空心

黃酒燉溫調服亦可

胎前疾痢

荷葉蒂

七個

燒存性為末黃酒沖服

胎前產後下痢

敗龜板

米醋炙末

開水下數服



並治生
困悶及
生口噤
倒產

並治胎動

胎上冲心 蘿蔔煎湯飲 或弓弦繫腰上

茵 兩煎湯服

孕婦患淋

冬葵子一升水三斗煮至二升

分數次

服

胎漏

受胎後漏下黃汁或如豆汁

黃芪

兩糯米合煎水服

或

可用十四個
葱白煮濃汁飲

生胎即安
死胎即下

孕中有癰

薏苡仁煮汁緩緩飲之

胎壓尿閉

令孕婦睡下將退吊起即通

妊娠傷寒

艾葉如雞子大團一酒三升煮一升炖服

取汗



並治產後
腸痒

胎墜

未足月胎墜其狀似欲小產或見紅

帶壳雞蛋

三個如無鴨蛋亦可

野榮

蔘根四兩同煮熟食蛋

孕婦腹痒

鉄箭頭

舊用針線袋亦可

安卧席下勿令婦知

及他人知

孕婦遍身騷痒

樟腦調酒擦

免鳴腹中

黃連甘草

各一錢

水煎服

○或多年空屋

下鼠穴中土一塊口含之○或令孕婦作男子

拜狀○或以豆撒地令孕婦檢之即止

孕婦風寒不省人事

狀似中風

熟艾

三兩

醋炒極熟以

絹包熨臍下良久即甦



南京中醫藥大學圖書館藏

萬不可服
服則胎墮

胎動不安

絲瓜二根煎水服

如無用
藤亦可

或用

下

數足心法亦妙惟胎
安即洗去為要

孕婦目鼻咽喉唇口諸病

吳茱萸

五錢

研末好溫醋

調敷兩足心用布包好過一日夜足心覺熱即

愈如未愈連換數次必痊

胎動下血不安

白蠟

一團如雞子大

煎三五滾對好酒服

立愈

十日內忌食雞

○或五梧子末酒調服二錢○或

蔥白煎濃汁飲

未死即安已死即出

不效加川芎粳米煮

粥食

候服藥胎欲墮

白扁豆

去皮

濃煎汁飲或研末米湯



醫藥類聚

調服亦可

孕婦乳腫作痛名內皂角一條燒枯存性酒下

胎漏 魚膠炒黑為末酒調服蓮蓬亦可

治小產 絲綿一兩入瓦罐內封口煨灰存性熱酒冲

空心服須於小產月內服之

保小產秘方 頭二蚕繭黃名絆瓦煨灰存性末每

三錢桂元二十個煎湯調服

孕婦慣墮胎平時無小產之患者蓮肉去心家

用青苧麻先淨膠白糯米三錢水煎去麻每早連

湯服一次單飲湯亦可



孕婦傷寒護胎

灶心土青黛等分末水調塗臍下

乾再換

跌撲動胎腹痛下血

砂仁不拘放熨斗內漫火炒

熱透去筋膜

為末每錢熱酒下

孕婦小便多而動紅勢欲小產

蔥頭一大把約長二三寸煎

水服

月數未足胎死產危

大黑豆三升以醋煮濃汁溫

服立生

胞衣先破不產

魚膠

二兩煨存性

搗碎沖好黃酒服○

或鬼白

即南星之小者用黃為細末不用篩播色者不拘多少去毛只搥之如



並治產門
不開兼下
死胎

粉為度 無灰酒一杯同煎服每服一錢立生

效 交骨不開

自死龜板

炙酥一錢

婦人頭髮

燒存一錢

當歸

二錢半

川芎

一錢水煎服

胞乾難產

黃蜀葵花

炒每三錢

開水調服

無花用葵子四十九

末粒為

黃酒調服

○如因跌撲打傷胎死腹中者

加紅花

錢二三

胎死腹中

灶心土末

錢三

水調服

○或黃牛糞敷臍

上即出

糞用醋炒亦妙

並治胞衣不下

難產

木匠所用鑿柄木燒為末酒服

或蓮花一

