

瘍科集案類編卷下

張浩良



瘍科集案類編卷下

腰膝二陰

腰痛牽掣環跳

桂枝

沙苑子

茯苓

桑寄生

炒杞子

勞倦挾濕腰痛

桂枝

木防己

苡米

萆薢

蒼朮

晚蚕沙

腰膝二陰



三陰虧損絡道空虚腰發虛瘦潰久不斂背脊高突
奇經受病骨蒸形瘦勞瘵根萌

丸地

白朮

茯苓

杜仲

鹿角霜

萸肉

歸身

川斷

炙州

脉細腰髀環跳悉痛煩勞即發下焦空虚脉絡不宣
所致所謂絡虛則痛也

歸身

沙苑子

於朮

木防已

杜仲

牛膝

萸藓

小茴香



腰為腎俞腎俞發痠由腎之虛腎為肝母腎氣既虛
肝亦為病病則侮其所勝而脾胃受戕故有舌海口
膩胸痺噦惡等症見也擬以苦辛甘相須立法扶土
之弱泄水之強從金匱肝病寔脾之意所謂苦以泄
之辛以散之甘以緩之是也

川連

半夏

茯苓

橘紅

人參

乾姜

炙州

竹茹

又
先哲謂肝病宜踈腑病以通為補昨遵是議用

苦辛甘藥泄肝和胃已得小效當仍宗前法漸次調
理俟中原平復然後下趨坎臟壯水之主水足則木
自平矣

以前方加益智仁

先天稟質不足後天生氣不榮腰發虛瘦色白腫蔓
食少便溏四肢疥癩胃府無洒陳之職脾失運化之
權童勞之漸也擬先調養中氣

於朮

茯苓

扁豆

廣皮

苧朮



木瓜

白芍

建蓮

肝腎虛絡脉空隙風冷乘之腰中痛引背脇宜
絡以祛風

補通

生地

黑豆

獨活

山藥

杜仲

灸州

刺蒺

桑寄生

產後血枯肝亢骨蒸潮熱欬逆腹痛腿膝牽掣擬和
營分之絡

用旋覆槿絳合逍遙散



脉空虚色白不泽膝凹胸脇之間素有癭癧如貫珠
遺精已經數載今腹脹如鼓上氣喘逆兀坐不卧此
水泛潰土以凌金上虛下實之候也然水愈深而火
愈衰欲利其水先溫其火欲歸其氣必捫其陰吸受
之地完固狂爛陷天斯止矣所慮者病深氣竭恐宗
難奏功為棘手耳

熟地

茯苓

杞子以鹽水

牛膝

沉香

萸肉

紫核桃

用腎氣丸示鹽水湯送下十日再診

滑泄頻、腎虛可知虛瘦不斂津精重奪氣升致逆

肺亦傷矣

用金六君煎

脉沉弦舌边灰白腰膝氣痛陰囊腫大比濕熱為病
治當分泄

草薢

黃柏

黑山梔

赤苓

丹皮

防己

猪苓

澤瀉



心火下趨于腎莖腫溺赤溺後淋瀝管痛

用龍胆瀉肝湯 去柴胡 加川連

濕熱下注濁淫莖痛宜先清利

用八正散 去大黃

據述頻年以來溺管有形窒塞痒極難堪及至溺血
乃鮮蓋此血非膀胱而下因其痒而捺之乃痛以勝
其痒也夫陰莖屬腎而肝脉循之腎主閉藏肝司疎
泄淋屬肝胆濁屬心腎是為定論此症雖有瘀凝而



小溲仍利非淋非濁其為敗精阻竅無疑診脉弦大
搏指上溢魚際下垂尺澤知心陽久吸腎陰相火亢
而為患經云亢則害承乃制火極則反兼水化倘久
延潰腐釀成岩症難為力矣考古通瘀泄濁惟虎杖
散最宜然非久進之藥自春及秋屢服分泄之品欲
以利水而適以傷陰愈傷則陽愈亢噉乾少寐所
由來也治宜厚味填陰介類潛陽堅之以苦導之以
鹹俾陽入於陰坎離交濟何不寐噉乾之有哉然草

木功能皆以偏救偏欲圖恒久安和務在息心靜養
所謂靜能勝熱靜則陰充

用大補陰合六味丸

陰精上承者壽陽火下陷者危血淋久而成形窒痛
煩心心火直升老年陰精已憊五液化成敗濁阻竅
不通欲溺必痛得泄則痛即通則不痛謂故知八味
及歸脾逍遙之屬愈治愈劇其守補升補滋滯瀆藥
決不中病用虎珀痛減是通利竅之意然究非常策



不傷陰陽之通潤立方

大生地

芫蔚子

冬青子

魯豆皮

阿膠

血珀

濕火下注舉凡腫焮紅寒熱成膿象也

赤苓

澤瀉

萆薢

苡仁

川棟子

查炭

佛尾

老年久疝因嗔怒而腫大熱痛肝失疎解火府濕熱

蘊結



川連

小茴香

黑山梔

川棟子

檉枝

郁李仁

冬葵子

木香

形體豐肥陽氣發泄水穀氣蒸濕熱肛門為瘍流膿
之後而畢凡偏墜兩腿瘡痍大發皆濕甚熱鬱之徵
宜用宣行氣分健陽運濕之法

白蒺藜

益智仁

杏仁

於朮

茯苓

半夏

廣皮

水泛丸

濕火蘊結肛門癰腫腑氣不通宜從下奪



鮮生地

槐米

丹皮

枳寔

製軍

元明粉

肺與大腸相為表裏失血有年肺陰虧而大腸脂竭

肛門墜脹所自來也每更衣其痛愈甚乃陰虧氣陷

之象而又飲食衰少穿潰後將何氣血生新收口哉理

宜用金水六君煎培土協和肺腎但脉細數而便堅

口渴陳半終為燥品諒難遞進計惟炙甘法潤燄最

為切當雖為因病設方而寔治其本也



用炙甘草湯 去姜桂

脉虛細陰不足也鼠漏未愈熱在大腸咳逆疫血上
傳肺矣

用大補陰丸 合八仙長壽丸

久損胃漏瘍胃減腹痛議用戊己湯意

人參 茯苓 白芍 炙州 兔絲子

因漏瘍久進寒涼遂患腰痛牽引脊膂今晨起周身
不得自如乃經脉絡脉之中氣血流行失暢久病諒



非攻逐議兩和方法

羚羊角

桂枝

當歸

黃芪

刺蒺藜

桑枝

潰瘍不合成漏脂液滲去必腸絡空隙內風暗動攻胃則嘔遂吞酸腹痛泄瀉不食津液不升舌焦黑不渴因內外無病難治

人參

白芍

川椒薑

茯苓

乾姜炮沒

廣皮

烏梅



脉濡弱陰虧濕熱下流肛門為瘍成漏納穀輒脫痺
噦惡治在太陽陽明

半夏 茯苓 廣皮 益智仁

白朮

痔瘡下血濕熱居多今形色衰奪顯是虛寒當補脾
胃痔瘡犹痛腫勢尚存佐以淡滲通腑

生於朮

生兔絲

白蠟

象牙屑

中年已以後瘦人陰虧有熱兼以嗜酒多濕熱下

