

傅青主 卷二



傅青主女科卷下目錄

共三十九條四十一
症四十
方二法

妊娠

惡阻順肝益氣湯

浮腫加減補中益氣湯

小腹疼 安奠二天湯

口乾咽疼 潤燥安胎湯

吐瀉腹疼 援土固胎湯

子懸脇疼 解鬱湯

跌損救損安胎湯

胎漏助氣止喘湯

子鳴扶氣止喘湯



腰腹疼渴汙燥狂卽子狂息焚安胎湯

中惡消惡安胎湯

多怒墮胎利氣洩火湯

小產

行房不慎固氣填精湯

跌閉理氣散瘀湯

大便乾結加減四物湯

畏寒腹疼黃芪補氣湯

大怒引氣歸血湯

難產

血虛送子丹



交骨不開 降子湯

脚手先下 轉天湯

氣逆 舒氣湯

子死產門 救母湯

子死腹中 療兒散

正產

胞衣不下 送胞湯 补中益氣湯

氣虛血量 补氣解量湯

血量不語 刺眉心穴法 獨參湯
當歸補血湯

敗血攻心量 安心湯

腸下補氣升腸湯 草麻仁提法



產後

少腹疼 血瘀散結定瘀湯 血虛腸痙湯

氣喘 救脫活母湯

惡寒身顫 十全大補湯

惡心嘔吐 溫腎止嘔湯

血崩 救敗求生湯

手傷胞胎淋漓不止 完胞湯

四肢浮腫 轉氣湯

肉線出 兩收湯

肝癰 收膜湯

氣血兩虛乳汁不下 通乳丹



結乳汁不通 通肝生乳湯



南京中医药大学图书馆版权所有
南京中医药大学 1951

傅青主女科卷下

陽曲傅 山青主手著

妊娠惡阻 三十九

亦有肝鬱氣
帶胸膈膨悶
見食不惡不能多食雖係

婦人懷娠之後惡心嘔吐思酸解渴見食憎惡困倦欲臥人皆曰妊娠惡阻也誰知肝血太燥乎夫婦人受妊本於腎氣之旺也腎旺是以攝精然腎一受精而成娠則腎水生胎不暇化潤於五臟而肝爲腎之子曰食母氣以舒一日無津液之養則肝氣迫索而腎水不能應則肝益急肝急則火動而逆也肝氣既逆是以嘔吐惡心之症生焉嘔吐縱不至太甚而其傷氣則一也氣既受傷則肝血愈耗世人用四物湯治胎前諸症者正以

妊娠而非惡
附宜分別治
之後另有方

其能生肝之血也然補肝以生血未爲不佳但生血而不知生氣則脾胃衰微不勝頻嘔由恐氣虛則血不易生也故於平肝補血之中加以健脾開胃之品以生陽氣則氣能生血尤益胎氣耳或疑氣逆而用補氣之藥不益助其逆乎不知妊娠惡阻其逆不甚且逆是因虛而逆非因邪而逆也因邪而逆者助其氣則逆增因虛而逆者補其氣則逆轉況補氣於補血之中則陰足以制陽又何慮其增逆乎宜用順肝益氣湯

方機效但蘇子一兩疑是
一錢之誤然
國初上元生人稟賦最壯
或非用一兩
陳皮三分砂仁一粒
炒研
神麵一錢
炒

一兩

當歸一兩

酒洗蘇子

一兩
炒研

白朮三錢

土炒

茯苓二錢

熟地五錢

九蒸白芍三錢
酒炒

麥冬三錢

去心

不欲今當下
元用一錢可
也萬不可甲
一兩疏肝化滯湯
全當歸酒洗
六錢杭芍酒
炒三錢黨參
主虛三錢曰
扁豆去皮四
錢雲苓二錢
錢半條冬炒
焦八分神麵
炒焦錢半兩
皮八分薄荷
六分甘草五
分水煎服

水煎服一劑輕二劑平三劑全愈此方平肝則肝逆除補腎則肝燥息補氣則血易生凡胎病而少帶惡阻者俱以此方投之無不安最有益於胎婦其功更勝於四物焉

妊娠浮腫

四十

妊娠有至五個月肢體倦怠飲食無味先兩足腫漸至遍身頭面俱腫人以爲濕氣使然也誰知是脾肺氣虛乎夫妊娠雖有按月養胎之分其實不可拘於月數總以健脾補肺爲大綱益脾統血肺主氣胎非血不蔭非氣不生脾健則血旺而蔭胎肺清則氣旺而生子苟肺衰則氣餒氣餒則不能運氣於皮膚矣脾虛則血少血少則不能運血於肢體矣氣與血兩虛脾與肺失職所以飲食難消精微不化勢必至氣血下陷不能升舉而濕邪卽乘其所虛之處積而成浮腫症非由脾肺之氣血虛而然耶治法當補其脾之血與肺之氣不必祛濕

而濕自無不去之理方用加減補中益氣湯

人參五錢黃芪三錢生用柴胡一錢甘草一分

當歸三錢酒洗白朮五錢土炒茯苓一兩升麻三分

陳皮三分



京中醫藥大學

1951

北京中医药大学图书馆版权所有

人蔘升柴多陳皮
白朮茯苓甘草齊

白朮一味今
多以蒼朮充
之於白朮傷
者更多自朮打
胎者宜審
若恐其傷以
白朮豆山藥
為之較妥

水煎服四劑卽愈十劑不再犯夫補中益氣湯之立法也原是升提脾肺之氣似乎益氣而不補血然而血非氣不主是補氣卽所以生血觀當歸補血湯用黃芪爲君則較著彰明矣況濕氣乘脾肺之虛而相犯未便大補其血恐陰太盛而招陰也只補氣而助以利濕之品則氣升而水尤易散血亦隨之而生矣然則何以重用茯苓而至一兩不幾以利濕爲君乎

嗟嗟濕症而不以此藥爲君將以何者爲君乎況重用茯苓於補氣之中雖曰滲濕而仍是健脾清肺之意且凡利水之品多是耗氣之藥而茯苓與參芪合實補多於利所以重用之以分濕邪卽以補氣血耳

妊娠少腹疼四十

妊娠小腹作疼胎動不安如有下墮之狀人只知帶脉無力也誰知是脾腎之虧乎夫胞胎雖繫於帶脉而帶脉實關於脾腎脾腎虧損則帶脉無力胞胎卽無以勝任矣況人之脾腎虧損者非飲食之過傷卽色慾之太甚脾腎虧則帶脉急胞胎所以有下墮之狀也然則胞胎之系通於心與腎而不通於脾補腎可也何故補脾

然脾爲後天腎爲先天脾非先天之氣不能化腎非後天之氣不能生補腎而不補脾則腎之精何以遽生也是補後天之脾正所以補先天之腎也補先後二天之脾與腎正所以固胞胎之氣與血脾腎可不均補乎方用安奠二天湯

人參一兩無力者以掌參代之無上掌參者以嫩黃芩代之

人參一兩

去蘆熟地一兩

白朮一兩炒土

山藥五錢

蒸去核五錢

山萸一錢

蒸去核

炙草一錢

杜仲三錢炒黑

枸杞二錢

扁豆五錢炒生皮

水煎服一劑而疼止二劑而胎安矣夫胎動乃脾腎雙虧之症非大用參朮熟地補陰補陽之品斷不能挽回於頃刻世人往往畏用參朮或少用以冀建功

所以寡效此方正妙在多用也

妊娠口乾咽痛

四十二

妊娠至三四個月自覺口乾舌燥咽喉微痛無津以潤以至胎動不安甚則血流如經水人以爲火動之極也誰知是水虧之甚乎夫胎也者本精與血之相續而成逐月養胎古人每分經絡其實均不離腎水之養故腎水足而胎安腎水虧而胎動雖然腎水又何能動胎必腎經之火動而胎始不安耳然而火之有餘仍是水之不足所以火炎而胎必動補水則胎自安亦旣濟之義也惟是腎水不能遽生必須滋補肺金金潤則能生水而水有逢源之氣水既有本則源泉混混矣而火又

何難制乎再少加以清熱之品則胎自無不安矣方用

潤燥安胎湯

熟地

一兩
九蒸

生地

三錢
酒炒

山萸肉

五錢
蒸

麥冬

五錢
去心

五味

二錢
炒

阿膠

二錢
蛤粉炒

黃芩

一錢
酒炒

益母

二錢

水煎服

二劑而燥息

再二劑而胎安

連服十劑而胎

不再動矣

此方專填腎中之精

而兼補肺

然補肺仍

是補腎之意故腎經不乾燥則火不能灼胎焉有不安之理乎

妊娠吐瀉腹疼

四十三

妊娠上吐下瀉胎動欲墮腹疼難忍急不可緩此脾胃虛極而然也夫脾胃之氣虛則胞胎無力必有崩墜之

虞況又上吐下瀉則脾與胃之氣因吐瀉而愈虛欲胞胎之無恙也得乎然胞胎疼痛而究不至下墜者何也全賴腎氣之固也胞胎繫於腎而連於心腎氣固則亥於心其氣通於胞胎此胞胎之所以欲墜而不得也且腎氣能固則陰火必來生脾心氣能通則心火必來援胃墮胃雖虛而未絕則胞胎雖動而不脾可不急救其脾胃乎然脾胃當將絕而未絕之時只救脾胃而難還生更宜補其心腎之火使之生土則兩相接續胎自固而安矣方用援土固胎湯

人參一

兩

白朮二兩

土炒

山藥一兩

炒

肉桂二錢

去粗

桂二錢

去粗

杜仲三錢

炒黑

山萸一兩

蒸去核

白朮多傷肉

桂更無仕者

用者皆有真

製附子

五分

續斷三錢

杜仲三錢

炒黑

山萸一兩

蒸去核

道芍白朮以
白扁互代之
芍桂以被故
紙代之

詢杞三錢
兎絲子三錢
酒炒砂仁三粒
炒研炙草一錢

酒炒

研

炙草

一錢

水煎服一劑而洩止二劑而諸病盡愈矣此方救脾
胃之土十之八救心腎之火十之二也救火輕於救
土者豈以土欲絕而火未甚衰乎非也蓋土崩非重
劑不能援火衰雖小劑而可助熱藥多用必有太燥
之虞不比溫目之品也況胎動係土衰而非火弱何
用太熱妊娠忌桂附是恐傷胎豈可多用小熱之品
詳之以錢大熱之品計之以分者不過用以引火而
非用以壯火也其深思哉

妊娠子懸脇疼四十四

妊娠有懷抱憂鬱以致胎動不安兩脇悶而疼痛如弓