

42

942.

内科理法



內科理法三編卷五

英國 虎伯 譯

哈來 參訂

慈谿 舒高第 口譯
新陽 趙元益 筆述

內腎之病

分類

內腎生炎 內腎別病 砂淋石淋 溺血 溺

含乳或肥油

即溺含 溺阻塞 溺不

多溺味甜 溺過多

多

內腎生炎

分別

一內腎重爛生炎 二內腎脫下微薄皮重生炎

三內腎脫下微薄皮久延生炎

一內腎重爛生炎

證據

一邊腰內深處痛不可觸動大腰覺麻常有嘔性

迴出清水膀胱悉動小便時痛發熱溺內有微細白顆粒

沈下查驗之係膿小腔間有溺管內潰出之質觀前第三十七圖

如膿瘡已成將裂碎至內腎溺管囊或其膿從腰間或腿

腹間而出該處先脹滿不可觸動膿出既多則有虛發熱

如此者病人不能支持

根原 血不清潔外傷溺秘不通內腎石淋

成病之體 內腎腫脹有血積聚膿瘡小如芝麻大如胡桃

桃散布於其面小管內塞滿小腔或膿輪如石淋為病之

根原料其內腎已壞其外邊變為袋形包膿瘡於內尋常

石淋在內腎溺管囊又變為內皮爛生炎之根原至久則

令內腎遇密來即內腎體之小潰爛而內腎盡枯壞

病勢 從內腎而來之膿如從模中潰出溺管囊生炎之

據內腎大痛而激動並放出許多淨膿

治法 初層時腰間用抽氣放血法或蟬吮法熱水浴用

速瀉藥以吧哩略雜散一大服並淡輕醋酸從之末層時

獨用雞哪霜或合於金類酸質用之如其生炎從石淋而

來者則以治石淋之法治之觀石淋一節

二內腎脫下微薄皮重生炎

證據 發冷之後間有微寒亦有腰腿覺痛頭疼嘔吐抽

搐與發熱數日後面有病色而浮腫腳有水脹至久則全

身水腫

初起幾日小便甚少或竟不生有暗紫色或紅色此因血

與蛋白質相和腰間之痛不止如重按之則痛甚有時其

痛甚劇自內腎溺管通入膀胱從此通至外腎及大腿吐

與嘔性與此證據同來在發熱時清汁薄衣甚易生炎有

時猝發癇証與昏暈此係溺不生之證據

如病將全愈小便加多有雲彩形軟物沈下血質不顯七

日之後溺或變清有久不變之淡色其重率減小溺內常

有蛋白質多寡不定病既漸愈蛋白質亦漸無有二十四小時內放溺一百二十兩為最多其水腫漸退如久病者極瘦而軟弱如病將傷命溺漸減少至久則不生更多者病人在末層時從胸膛累及之病而死假如不能呼吸是也

根原 疹子麻子皮膚生炎飲酒過度因遇溼與冷皮膚之津液不能放出

病論 因皮膚上出棄津液之小孔有阻塞內腎當職更覺竭力即成重血積聚令生津液小腔薄衣發出過多其小腔變化至久不能當其職即分出溺內之各質此即留於血內引出病之明顯證據其時內腎之微絲血管或脹足或裂碎血內之質流入內腎微絲管內其血質稀薄蛋白質與紅血輪減少細倫之重率自一〇三〇減至一〇二〇然更有關繫者血內加多由里阿至於身上各處所發之氣亦能聞而知之

小便不生最重之證據即血中有由里阿初起胃將逐出之故有嘔吐然此事尚不足以救之由里阿之毒仍加多其行法由癩証昏暈而顯出此能傷命或以為由里阿無毒小便不生之重證據因由里阿變為淡輕之故

成病之體 死於病之重層內左右腎俱果及脹大而血

積聚有暗紅色並綽故辣得色內腎體質堅或較尋常更堅其外層因有缺血或多血之處故有花斑隨形尖空處有血積聚

詳細考究之微細溺管內滿足薄衣小腔間有充足之血所以其面有花斑間有血稠成塊而無色又有血鋪於麥彼奇處之胞衣微絲血管之衣變厚而不透光溺管囊內腎溺管或膀胱有血積聚身內各處器具具有血積聚並盈出清汁於細倫空處膀胱空如病久延一箇月或更多則內腎變為數層乾枯即在內腎脫下微薄皮久延生炎節表明之

病勢 水腫初起在眼胞皮襯絡內或在陰戶內層皮或在腎囊以後面部浮腫則有全身水腫溺少有暗煙色此種溺其中沈下紅血輪並微細溺管之模塞滿小腔薄衣觀前第三十四圖此為內腎脫下薄衣重生炎並水腫之兆且可與別種內腎病有分別並可與肝病肺病或心病而來之水腫有分別

決病 易愈者小便加多所有血與蛋白質減少不易愈者小便極少並帶血病人呼吸難

治法 一 治其生炎則用抽氣放血法或多用蟬吮法

於腰間以芥末敷法從之

如有重發熱則用打打伊密的照用為發汗藥服數服之
如有痛則將度法散合於打打伊密的同服之

二 挽回皮膚之行法熱水浴最佳者熱汽浴兼服淡輕
醋酸令其多出汗房內之熱度應得法倫海寒暑表七十
度以外

三 放鬆內腎之行法則用辛拏或渣臘伯令其大便易
通食物以小粉類湯為主烘饅頭湯或大麥水隨意飲之
四 如有溺不生之證據可用溺不生之治法治之

三內腎脫下薄皮久延生炎

證據 其發時不顯明即患此已久亦不覺之此病常在
其重層之後大概查其根祇因遇溼或冷又多者因內腎
漸變枯有多人患此因有痛風病性或竟有痛風而為此
病之證據凡人患血虛且眼胞皮與腳踝浮腫則思求醫
調治如查問之則知溺多而頻數且在夜間常因小便起
身數次有痛風病性者其溺內尋常稍有里的酸與蛋白
質若干並微細溺管之模即如內腎脫下薄皮重生炎節
已言之病人照此情形久延至數月或數年然至久則有
水腫小便減少微細溺管之模漬出此表明薄衣小腔變
化且有顆粒之形觀第三十五圖有時竟無小腔其模如
一層薄蠟在病之末層則與細油點相和觀第三十七圖

如水腫猝然加重且有腹胞膜水腫肺胞膜水腫或小便
減少血中加多由里阿病者屢有羊癲瘋癇証至久變暈
睡而死

成病之體 內腎變乾癆枯瘦權之則不過兩半微細
溺管有數處盡無薄衣並乾枯內腎本體縮小麥彼奇處
擠緊有時微細溺管脹大變為袋囊包清蛋白質並稠質
於內微細溺管間之質有筋條之形血管變厚內腎與包
衣膠黏將此衣剝去其下之面有顆粒形此顆粒即微細
迴血管間處之乾癆微細溺管此情形甚似肝之久延生
炎如此病從痛風而來則內腎將變小而枯瘦與此病末
層相同然有特顯之式即在痛風一節表明之
如久延者從重者而來則內腎更有兩種情形即大而白
色之內腎並紅色粗花紋之內腎此可謂在內腎重與久
延病之間紅色粗花斑之內腎因病者飲酒過度其中血
積聚與肥油變枯兩故相併其白點使內腎本體有花斑
並內腎三角形處白紋俱係肥油質

病論 關涉病証並結末情形因內腎生津液小腔已壞
溺內之質即和於血中運行不清潔之血其徵驗如下
一生津液器具與血之相關甚少微絲血管之運行血法
遲而軟弱心欲強勝血之阻礙物則變為心體脹大尚不

能盡其職則全身有水腫 一胃腸並肺之內皮將代內腎之職逐出溺內之質故有嘔吐泄瀉氣管生炎 二不清潔之血令身之各處有緩性生炎隨將有腹胞膜生炎肺胞膜生炎肺本體生炎且皮膚有損傷即有皮膚生炎有時腦髓亦累及且有由里阿流質入腦之小房內至久因溺不生而死

病勢 水腫之病觀水腫一節內腎有病而發水腫與他種水腫之分別一在乎無肺心肝久延之病二在於發出情形即初起在面部特如此者在眼胞皮此在早起時至晚間則腳踝與腎囊有水脹三在其溺之情形從此各種內腎枯壞法可推求之如微細溺管之模有顆粒形之枯壞小腔則知內腎在枯壞第二層之時如其模大而無小腔則知內腎枯壞更在深層如此光滑之模有肥油點者則知內腎在枯瘦之末層觀第三十四至三十九圖

決病 此俱遵顯微鏡內表明之內腎情形辨別微細溺管之模如何形狀久延與重之內腎脫下薄皮生炎在早層時無重累及之病證尙屬有望在末層時難望全愈

根原 向病之根原稟癥病性不論男女老幼醫士白那

德載此病傷命者七十四人其中十九人在三十歲以內其中三十八人在五十八歲以內其中十三人過五十歲

又有四十人過六十歲激發之根原引出此類重病之根原空氣不清又有他種不合於身之事居住大城鎮市之貧賤人飲酒過度外傷冷先有疹子後有水腫風濕痛風治法 放鬆內腎之血積聚並其水脹應用藥與發汗藥不可用利小便藥如無泄瀉每日早晨可用重藥即如渣臘伯維散一大服度法散五釐至十釐令其開鬆皮膚如極乏力則用行氣發汗藥即如淡輕黃醋酸二錢至四錢每日三四次熱水浴或熱汽浴每一二日用一次衣服須加多全身暖和

補養身體則用長肉食食物數種鋼劑最妙者用鐵酒十滴至二十滴爲一服

欲治其累及之病須留意其本病欲治其嘔吐尙合而其泄瀉爲身之自治法不可盡止之如重者略減少之腳腫加劇且其皮膚癩緊可以針刺之或以刀劃碎之令其寬鬆而稍適

預防法 飲食合度空氣清潔天時乾暖運動整齊此一切有內腎生炎者或易有內腎生炎者切宜留意

內腎別病

內腎與他種多血管之器具相同故易有別病有數病祇累及內腎有數病與相近器具同類之病同來有一箇內

腎累及生溺之功用已有阻礙其未病之一箇內腎體變大加倍當職以下爲尋常所遇之病證

一 水疱病證內腎水疱大小不等自芥子至龍眼大在內腎外殼體內常有之久延內腎生炎之乾枯層常有許多小水疱有時脹大變成瓣葉形中有黏膩之流質此水疱之成法想是一定因有若干微細溺管壞而乾癰又有若干微細溺管脹大變爲水疱

其時內腎溺管受阻礙或乾癰初起溺管囊蓄積多溺後祇有清水生津液器具因受壓力而漸變化至久則全器具變爲大水疱如溺從膀胱阻當而不能流出則內腎溺管放大如小腸此種水疱癰謂之海得路尼勿路西司即內腎有水之意

內腎所有之各病即似子宮左右核病引出子宮左右核水腫有一女人患此病察其證據極似子宮左右核病之證據其腹極脹大而平勻用擊法則有水盪聲與呆實聲死後剖驗左右核並生育器具俱無病證與此水疱癰不相膠黏此癰之重四十五磅其包衣甚光滑其溺管與左腎之上邊相接一直與癰之包衣相通該處又分兩箇水疱藏流質九升在一水疱內其流質無色又一水疱內其流質暗紫色此即微細溺管變成之水疱右腎無病惟脹大而變厚此

病人三十四歲死有兩子又有一病人的確有相同之證據與相似之病形亦與左腎相連此在英國司太薄脫醫院內余亦在焉病者係七歲女孩其腹脹似子宮有孕而因病人之年紀即易辨別病原此人子宮未必有瘡子宮左右核病亦難有之然因癰式平勻在一邊益里阿所有水盪聲且無溺內證據故大半醫士料其爲子宮旁核水脹實非爲水疱癰哈來補註

二 內腎肥油變枯成顆粒形脫下薄衣之內腎生炎有向此病之情形內腎大而白色其殼層缺血因有黃白不透光顆粒並有花斑細察其顆粒爲肥油點其彎曲微細溺管有肥油點在其小腔內觀第十二圖

其早層證據與內腎脫薄皮生炎之證據相同以後含蛋白質之淡色溺少而清明間似雲彩爲微細蠟形之模中有微細油點

三 內腎蛋白質枯壞內腎枯壞時有蛋白質蠟豬油小粉之式內腎易有此種病證尋常加大而硬切之甚堅切面光而平勻並有蜜蠟之形其枯壞體質之形狀在肝蛋白質枯壞之一款內已詳論之觀本編第四卷此情形似從白色

而大之內腎而來即從內腎重生炎第二層而來似同於瘰癧病性常與內腎蛋白質同來故可決大而白色之內

腎欲變爲蛋白質內腎用蛋白質名目之故因其生發之病料確有蛋白質之形性豬油與蜜蠟之名目取其形似小粉類之名且極不相合

此病之證據與內腎脫薄皮久延生炎之據同

四 都比迦力與癰疽留料內腎亦有之惟獨有者少必與他臟同有之初起成獨粒小圓塊生密而相併中間軟從溺中放出從此可查察內腎之情形

五 內腎中水泡球瘤不多有之

砂淋石淋

證據 腰間覺呆痛或重痛並覺熱而重小便時則有痛或不適猝然動作則加其痛橫交骨處常有痛膀胱頸覺激動陽莖覺癢或痛間有外腎收緊溺內含血或有血塊其溺熱時已有紅砂有顆粒或小石淋尋常溺少而色深重率大酸臭冷時則濁食物不消胃酸多發氣常噯大便秘結舌有苔皮膚乾不安息發熱

最尋常之砂淋爲淡輕由里酸又名里的克酸或兼有淨由里酸此爲紅砂其次者則盡爲由里酸最次者爲淡輕養鎂養磷養或合於不成顆粒之鈣養磷養此卽白砂更次者爲鈣養草酸此種沈下之物或與各種交互相併亦能有之其時此種沈下物相併而成小石淋其證據更重

欲分清其各類觀前第五百八十八款以下可也

內腎內石淋之證據與石淋最重之證據相同卽腰痛通

至膀下外腎陽莖外腎收緊常欲小便而痛溺中有血唾

吐不安息輕發熱此證據有時猝然停止因一小石淋已

出其時同出多砂如石淋在內腎內卽引出重腹生炎卽

爲溺管囊生炎並其闊涉之病證觀內腎重

內腎溺管內石淋之證據其時溺管內石淋行動其痛甚

甚或在溺管一路並精管處有呆痛逼至陽莖外腎或兩

腿內面在近石淋處之腹上極不可觸動常欲小便而不

能所有之溺必含血有重嘔吐極不適如其石淋已至膀

胱則此證據猝然停止有卽從膀胱溺管而逐至身外者

亦有石淋塞於內腎溺管至於引出內腎病證或多積溺

而使內腎溺管溺管囊內腎皆脹大內腎既脹大至於腹

亦脹大卽內腎有水之病且易與腹胞膜水腫相混

膀胱內石淋之證據卽常欲小便在小便時膀胱溺管口

覺痛似燒小便忽然有阻其時脹滿而極痛仰臥片刻溺

再放出其至末之一兩溺放出時痛極甚此因膀胱收緊

與石淋面相切之故腿內面常能呆木並有重痛出力運

動之後或證據既久延則溺內含膿與血此因膀胱內皮

生炎之故

根原 向病之根原少年時並四十歲以外衣食豐足常坐定風濕痛風病性激發之根原冷腰間受擊打損傷微細小蟲類觀後胃不消化所飲之水內有石灰質鈣養草酸砂淋因多糖類質因多食含草酸之菜蔬並水果內腎或膀胱本體之病

治法 此依砂石淋而分類

由里克里的阿息司食物宜多用菜蔬極重者宜茹素各酒類宜盡戒之用沖淡薄之藥如鉀養二炭養鉀養鹽類每飯前一小時沖於一杯冷水內每日三四服待溺內無酸性為度斐希並喀耳斯巴得之鹼類發泡水亦可用之燐養里的阿息司食物宜豐足酒宜相稱並用金類酸質即淡硝強水或鹽強水或合強水此隔若干時服之如此病情累及性靈或身體鴉片常為合宜之藥

草酸里的阿息司用死物酸質各種食物有草酸者須戒之糖類物須用之相稱如病重者須盡戒之宜用滑水

各種砂淋病須極留意其全身並皮膚胃直腸之功用熱水浴能令皮膚行動故能有益石淋行過時須令其易於行過並治其痛即用鴉片與熱水浴膀胱石淋之治法照其所出之

石淋體質治之

溺血

證據 所出之溺內有血

根原 內腎血積聚或生溺器具任十分內皮血積聚無論為自發或用斑蝥松節油等而引出內腎生炎內腎尿管膀胱或膀胱尿管內有石淋腰間擊傷膀胱帶病膀胱內皮久延生炎或爛膀胱內皮肥拉愛即內皮生瘡或生惡毒植物有時青蓮色皮膚病瘡發熱神昏疹子時溺中亦有血患瘧疾者並別種病證此病之證據依時而作惟司脫耶其羅司極大之一種即長而無節似圓線形一等之蟲不多作為溺中有血之根原在巴西國西印度島埃及毛里西尼島那達勒好望負此一帶內溺中含血為民間常有之病此因生溺器具內有微細蟲故也

病勢 含血之溺有顯紅色或暗紫色如所有之血多則沈下一種暗紫色留料或有清楚之血塊欲知其化學與顯微鏡內之情形觀前第六百二十四款其時溺有酸性且血少者則其溺有煙色

其血之來源可在其同來之證據並詳查溺質而知之如內腎處先有痛其血在溺內平勻且有微細尿管之模則知其血從內腎而來觀第六百四十款如先放出之溺血質缺少或竟無後即有多血則知其血從膀胱而來最多者因膀胱內有石淋之故如祇有血而無溺則從膀胱尿管而來

治法 照血所從來之根原治之如病從損傷而來或因

身之血脈充足則於腰間用抽氣放血法安靜並輕瀉藥

如因石淋激動內腎之故則多飲植物膠之流質即如濃

大麥水阿指西耶膠水扶桑西名阿勒替耶煮水合於蜜糖用鴉

片羊躑躅與滋潤外導法又別種相合之治法須皆用之

其時血在膀胱凝而黏韌則用通溺管引出之

流血太多則以冷水或明礬冷水一兩至三十二兩用外

導法噴入肛門同時服植物收斂藥見方一百五十四鉛與一百五十五

養醋酸合於鴉片為有益之藥如兼血虛則用鐵酒

附溺血時作時止

證據 天氣陰寒風冷小便放出以後變為暗紅色或紅

紫色且有蛋白質之形性皮膚因柔嫩而分外畏冷呆白

色或黃色有時遇冷即變紫色常覺有冷層或確似瘡疾

大概全身不甚累及然而無與會不爽適每日早晨皮膚

覺冷至黃昏則皮膚覺熱直至天明

病論 有因內腎外皮微絲血管暫時收縮而發出有停

歇之血積聚或因身內有草酸病性至於內腎有血積聚

或激動此各病時溺內多有紫色沈下之質即碎壞血輪

有時結成微細溺管之模形或內有鈣養草酸顆粒觀前六百四十八

祇疑內腎之血有色彩故其名不妥因溺內非惟有喜瑪

的尼並有各種物質或竟有全血輪

根原 一大汗之後忽然遇冷令內腎有重血積聚二內

腎內之顆粒物有激動情形

治法 有瘡疾類之病須得乾熱之天時令皮膚暖熱滋

潤可用雞哪霜依瘡疾之服數身內有草酸病性用金類

酸質合於羊躑躅甚合

附 因水土而生溺血証

因有蟲而溺血者有數處之人患此病甚多故特論之西

印度埃及毛里西尼島等處之人此病甚多近時余又言

在那達勒好望角由以屯哈潑並怕脫以里司白脫等處

之人亦有此病哈來補註

埃及國改羅之醫士皮爾哈司云溺血並砂淋埃及人甚

多因有長而無節似圓線形之蟲或名疊司安門喜瑪士

比恩又名加愛奈可福爾司又名喜瑪士比阿恩與辨爾

哈齊亞喜瑪士比亞又有一種白

小蟲長不及半寸如第八十二圖

甲乙丙丁為雌蟲半身藏雄蟲之

腹內如丙戊為蟲卵用顯微鏡放

圖二十八第



血柵管內惟在生溺器具內最多累及膀胱內皮內腎溺管內腎溺管囊之內皮多血積聚因過養而變厚

阿非利加東南界並毛里西尼島之人所有溺血証俱因此等蟲而來

證據 在南阿非利加並毛里舌斯島上人之病其證據如下小便時末一兩之溺有血不常過於一匙之多或有含血之內皮汁或有無色之內皮汁結成迴血管形此有時阻當放溺至令其人用力服緊若其蟲在內腎內則該處隨時覺有振痛溺清而色淡血不和合於其間出力之後血質加多先幾年時他處無痛不覺有不便之處此病男女在十歲左右已有之余有一友在怕脫以里司白脫告余云每三箇學徒內二人有此病此等人衣裳常有血迹宛如婦人之行經

成人並西人在那達勒與好望角者亦能有此蟲

數年之後溺血漸退至發身時則退盡惟其根原尚在從其溺內之蟲卵而知之遲早必引出砂淋之重證據溺內多鹽類質顆粒沈下之物大半為鈣養草酸包圍蟲卵此卵甚多即為石淋之心

病勢 溺內蟲卵之形如第八十三圖之甲乙其長一百

七十分寸之一潤四百分寸之一有尖利之刺與無色或

第三十八圖



含血內皮汁同出甲為屢見之卵丙為有毛圈之胚有時見其從卵而出如丁

根原

蟲初變成時大約從水或水草或生菜帶入腹內

預防法

所用之水須加熱沸之或用砂漏過之汲汲內

不準有此等病人之溺入於其內

治法

一須殺蟲或逐出長成之雌雄蟲二須入逐蟲卵

因蟲卵在身內隨時能變為石淋之心蟲不在面上而在槽內如欲殺之須以能運於血內之一藥毒死之鉀碘為合宜之藥每日可用此藥十釐至二十釐消化於苦白木沖水四兩內噴入膀胱非里西瑪司即陽背陰草膏十釐至十五釐隨時可代鉀碘此令膀胱出力逐出其蟲又阿脫路比尼與羊躑躅內腎必欲逐出故想啤啦咿喇與羊躑躅能阻當蟲之長成或竟能殺之此藥又能安慰其有激動之情形

下節

巴西國西印度東印度人之溺血因又是一種蟲而來觀

溺含開兒或肥油

即溺含精漿

證據 溺質渾濁或乳色有時因含血略有淡紅色或溺

在膀胱內結成黏韌之質至不流通其餘之證據皆輕此病重者乏力身瘦腰中痛此為尋常證據

其溺尋常多有乳形其重率自一〇一〇至一〇二〇有時放出之後結成白色之軟物傾出之後則存容此溺之器之形更多者不結成黏韌之質其溺不多時變為清而略黃之流質其內有白色沈下之質有時此白色沈下之質似雲片形或有一層白色薄衣浮於其面溺之渾濁從微細油膩物而來間有小腔其形如開兒小輪且有時含紅血輪在其間細考究之溺內非惟有尋常所有之物質且有肥油蛋白質

此病在溫帶內少在東西印度島巴西國毛里西尼島布邦島之民常有之

治法 不能除之惟可用加里酸與含鐵收斂藥略治之
病論 醫士楷脫云津液管裂碎時開兒即速流入生溺

圖四十八第



器具內有三箇病人其應棍管內之核因開兒堆積而脹大溺血與溺含開兒之証大有相關有時兩病同發且溺血與溺含開兒民間常有之盛

行於一處有醫士於一千八百六十九年巴希亞新聞紙第一次指明新故出之溺內有活非拉里阿即又一種醫

士克里伏在諸達魯魄島土人之溺內亦查得此蟲後有羅以司在印度國查溺含開兒亦得此小蟲此人查此病於十五人內俱有溺血之據其所謂溺含開兒為偶然帶進之事其實有之病係血內有微細蟲而想津液核內亦有之據云有幾人每日身上挑其肉能得其微細蟲有一次在耳外輪上挑出一點血在其內查得六條微細蟲如第八十四圖為醫士誇里表明微細蟲之形其長之中數為七十五分寸之一濶如紅血輪甲為活蟲乙為死蟲其身上各體不能分辨誇里以為頭上稍小處必有緣故此蟲極活靈

溺阻塞即溺不生

證據 乏力不安息腰間腳踝內覺乏力而重脈數皮熱面色紅頭痛欲嘔或吐約在第三日神倦面部水脹或全身水腫數小時後有痢証有時極重而甚多發三四次之後則昏暈而死病初發時有渾濁之溺少許病已發足則竟無溺

又有腰間無痛亦無發熱祇略欲嘔而神倦第二三日病人昏暈二十四小時至三十三小時即死有因內腎溺管阻塞至於溺質停留而不生如此者病發時極痛後即退病人疲倦昏暈而死

根原 內腎久延之病因寒濕而加重有數種毒藥之行
法如毛地黃鉀汞綠斑蝥等內腎重生炎內腎溺管有阻
礙傳染發熱病

病勢 與溺祕不通之分別可按於空膀胱處或用引溺
管而知之

決病 內腎有久延之病則此証難愈因新發重病而引
出者則易愈

治法 指明 一 用重瀉藥與發汗藥令其由里阿易
有出路衣拉特咄一釐或巴豆油兩滴須速用之後用熱
汽浴內腎功用可用阿脫路比尼九十六分釐之一在皮
膚下而行動之

二 如有內腎重生炎則於臂上取血十兩至二十兩或
於腰間用抽氣放血法或蟬吮法後用行氣之熱水敷法
三 頭中證據須用弔灸法於額骨與枕骨之下如頭熱
則用冰一薄皮袋置於頭頂上

多溺味甜

即肺

證據 初覺此病時知常欲小便其溺過多有淡稻紫色
略有臭如馬料草有一種甜味中含糖質食量不整足極
口渴大便秘結糞乾硬舌上黏膩舌邊紅或潔淨或白而
有紫色之紋牙肉紅不能觸動喉乾口氣有甜臭嗅之似

馬料草皮膚乾糙病者軟弱而瘦性急易激動久延數月
或數年之後證據加重極瘦病人乏力或變癆証而死
有時溺中之糖時有時無老年人溺內常略有糖無妨害
病論 以下數事曾考究而得之 一肝迴血管內之血
常有糖質死後則加多 二有一質名各里各真在肝內
能勉強取之此物用口津或甜肉汁或血或肝等與之相
和能顯葡萄糖之性情 三其時食物內祇為含淡之質
則各里各真又可作之同速而同多而糖類或小粉類物
並非必不可少之食物

由此可知白那德之意身無病時糖在肝內做成從此入
肝之迴血管內又運入於肺在肺受養氣變為炭養氣與
水從呼氣逐出之

依前意而論之肝與肺之職司在乎成糖與減糖又想溺
內含糖之故必因兩臟之職司不合常度即如肝之行法
不合即成糖太多至於肺之運行一次不及盡減之其餘
之糖即進全身運行之血內從此被內腎減去之又其時
肝所分出之糖照尋常之數肺因有病不能盡減其糖則
糖亦有餘亦入全身運行血法內

依此非醫士之說人無病時各里各真在肝內不變為糖
應變為肥油且祇在肝之功用不合時即如在肺消病時

則各里各眞變爲糖想其變質在動物死後而變成以上

之說因心右邊血內少許之糖質同於心左邊少許之糖

質案此即指明心右邊迴血內之糖與心左邊發血

內之糖其多寡相等故知肺內未嘗減去糖質由是

以觀肝內成糖之事必因其功用不合或有病激動心肺

胃第八對腦筋或激動腦髓能成肝當職不合之病即如

白那德醫士云激動心肺胃第八對腦筋即發多溺味甜

之病古勒敦醫士云頭上受擊力即引動肺消病此等病

証之來歷余亦親見之

成病之體 內腎紅色變大間有顆粒變壞之形肺內有

都比迦力留料腦髓有乾癆之形

關涉與接續之病 肺癆病爲其尋常關涉之病內腎成

顆粒變壞腹胞膜生炎全身水腫中風

決病 易愈者病有往來之情形前時患此病不久每日

之溺不多於十二升又不過於一〇三六之重率身不甚

瘦食量不大口渴不甚皮膚軟潤性靈安靜如醫治之溺

與所含定質減少身加重有力活動食量與口渴俱減性

靈清楚而暢快不易愈者病久延身大瘦減力極速肺體

或內腎之病發出猝然大乏力
根原 向病之根原傳代病性激發之根原肺癆病頭受
外傷

病勢 溺過多每二十四小時內能生溺八斗之多尋常

人之溺每二十四小時內兩斗爲最多其重率自一〇〇

〇至一〇七〇有甜味若令其乾則腹下白粉或有黏

之質此皆爲糖每二十四小時內其發出之糖有半磅至

三磅查考溺內之糖並其多寡觀六六十欸以下可也

治法 一 食物大半爲肉類炙煎俱可稍食硬或發酵

極透之饅頭流質類宜適中最好爲牛肉清湯牛乳清

泉水含鈣養鹽類之水哥路登與麩皮饅頭可常食饅

頭雖其肝易以蛋白質類之物變爲糖而食物俱爲含

之質則其所成之糖能減少

二 流質宜用之有節酒類鹽類瀉藥並各藥物或食物

所能利小便者須戒之皮膚之棄津液可用熱水浴或摩

擦或厚衣服助之又可用小服之鴉片假如每日服度

法散三次每次五釐

三 口渴極甚最妙用冰水合於燐養飲之克來勒酒

酒亦爲相宜之飲物

四 須助其身力每日服鐵酒二三次二十滴至四十滴

爲一服每間一日臥時用鴉片一足服大便祕結須以膠

香類瀉藥治之如極乏力則用補藥與行血氣藥
余見一病人數箇月內發出許多含糖之溺身不瘦亦不

累及全身病人不服藥祇服補藥沖水常多食肉由是觀之其發出之糖似不從身體而出如病者身不瘦亦不必用別種治法

補合補註

溺過多

溺之過多因多飲流質之故最易得者為酒類內腎功用激動亦有之假如發妄言笑病之後則有之並在心思煩勞者亦有之

久延多溺尋常謂之多溺味淡然此名不合故醫士空存命名曰久延多溺此係病之證據因與尋常之溺相同惟過多耳其所含之由里阿多寡不定溺內惟多水者醫士韋立司名曰海得羅里阿兼多由里阿者名曰阿查多里阿即多含淡氣質之溺也少兼由里阿者名曰阿那查多里阿若溺內由里阿過多重率加大別種之溺其中由里阿甚少重率減小溺過多尋常與口渴相連食物消化亦有阻滯

其治法令其皮膚與胃之功用準足可也

膀胱之病

分類

膀胱生炎

遺溺又名尿淋

小便難

膀胱激動

膀胱生炎

一膀胱重生炎

證據 發熱膀胱處重痛腫脹痲緊交骨或會陰按之則痛甚常欲小便小便時痛而少弱或覺流出時有阻抽撻與嘔吐

根原

勉強受傷膀胱脹足時跌仆傷腹有界限之石淋惹動流白濁之生炎延及膀胱尿管有痼証或久延變窄各種生炎之尋常根原斑蝥行血氣之藥水從膀胱尿管噴入受冷即膀胱傷風

治法

在會陰用蟬吮法以熱水浴熱水敷法從之鹽類速瀉藥合於足服之鴉片

須詳細查定溺之情形如多酸性則用鹼類藥如多鹼性則用酸類藥合於鴉片

二膀胱久延生炎

證據 溺內所含內皮汁加多略有膀胱生炎證據

根原 膀胱蒂膀胱尿管內腎尿管內腎等病膀胱石淋膀胱內皮有潰爛處背脊髓癱瘓而溺祕不通膀胱放溺時多阻礙

如溺留於膀胱太久則將變化其中之由里阿將變為淡輕養炭養從此有久延生炎溺內含血而甚臭

決病 不易愈者年老並喜飲酒之人特如此者與癱瘓或內腎病同來

或內腎病同來

治法 如無兼病則用烏伐烏爾西布故巴離拉畢澄茄

哥拜把黑胡椒等合於金類酸質膀胱激動可用潤內皮

藥作外導藥即如扶桑西名阿勒替耶煮水與鴉片酒又可用熱

水敷法須令腳暖不受冷濕

如溺有淡輕養含血極臭並有內皮汁則用雙管之引溺

管洗淨膀胱所用之熱水略加鹽強水或硝強水令稍酸

如有癰瘻須用引溺管放其溺每日兩次

遺溺
又名尿床

此病從勉強之根原而來或因膀胱功用不合之故此屬

於內科故必論及之

根原 如無器具之病則遺溺尚有兩種根原一膀胱重

收縮而斂縮膀胱口之內筋仍有其尋常之力二斂縮膀

胱口之內筋失其尋常之力而膀胱未重用其收縮之力

第一故膀胱內必有激動之原溺太酸或由里酸變為針

形顆粒然亦有斂縮內筋無故發癰証如此者甚少第一

故在男子較多第二故在婦女與小兒較多

治法 遺溺從癰証而無砂淋者最合之藥法為安神藥

與平火安心藥或內服或由肛門而進用外塞法或外導

法定質鴉片一釐做成肛門內用之藥條或用鴉片酒半

錢合於小粉水作外導法能治其癰証如因砂石淋為根

原而遺溺者則用治此病之方治之觀砂淋石淋節

如因斂縮膀胱口門之內筋乏力而有遺溺者則服發

酒一滴至二滴合於羊躑躅酒十滴謹慎服之由漸加多

此法不效者甚少余見患此病者數人俱用此法治愈之

有一少年人用斑蝥無效則服鐵酒半錢每日三次後得

全愈之補註

有多人日中留阻其溺夜間則放出如此者亦用土法治

之

小便難

小便難之輕重不等有小便時略有阻當者或有痛或不

痛或其病加重至於其溺盡行留阻大概小便時有脹力

則必有痛在重者其痛必甚

根原 溺留太久或溺太酸膀胱各層激動或生發炎流白

濁膀胱蒂生發炎膀胱內有砂淋石淋膀胱生炎內腎生炎

痔瘡直腸生炎或激動子宮之病懷孕等溺淋即小便難

之重者此因用斑蝥或別種毒物而引出小便難亦為妄

言笑之證據凡男女之腦筋易激動者有此病勉強之根

原膀胱內有石淋膀胱尿管變窄會陰生膿瘡膀胱蒂有

瘤子宮不正

治法 此依其根原如其根原在膀胱之外則大便秘結



爲最多者。用速瀉藥或數日內用輕瀉藥可速治其病。
膀胱肉筋層之癰証則用熱水浴並鴉片外塞藥或鴉片
外導法。如多發癰証則鐵鹽類酒可常用之。

其時溺少而酸則用鹼性之利小便藥並沖淡之藥從溺
留過久而來之小便難最妙用熱水浴治之。

膀胱激動

有人常欲小便猶夫常有泄瀉故在禮拜堂官廳鐵路等
則極不便。朝晨更覺難忍。此等人因不便而強忍則能加
其病。治法須戒盡酒類並一切利小便藥。湯水亦宜少飲。
如能抵當鴉片者則以小服之鴉片照預防法而用之。最
受累於此病者常須帶一不漏水之橡皮袋此可在出售
外科各器鋪內購之。



