

脉經卷第八

朝散大夫守光祿卿直秘閣判登聞鼓院上護軍臣林億等類次

平卒尸厥脉證第一

平痙濕暍脉證第二

平陽毒陰毒百合狐惑脉證第三

平霍亂轉筋脉證第四

平中風歷節脉證第五

平血痺虛勞脉證第六

平消渴小便利淋脉證第七

平水氣黃汗氣分脉證第八

平黃疸寒熱瘧脉證第九

平胃痺心痛短氣賁脉證第十

平腹滿寒疝宿食脉證第十一

平五藏積聚脉證第十二

平驚悸衄吐下血胃滿瘀血脉證第十三

平嘔噦下痢脉證第十四

平肺痿肺癰欬逆上氣喘飲脉證第十五

平癰腫腸癰金瘡侵淫脉證第十六

平卒尸厥脉證第一

寸口沈大而滑沈則爲實滑則爲氣實氣相搏血氣入於藏即死入於腑即愈此爲卒厥不知人唇青身冷爲入藏即死如身溫和汗自出爲入腑而復自愈

平瘧濕暍脉證第二

瘧一作瘧

太陽病發熱無汗而反惡寒者名剛瘧

大陽病發熱汗出而不惡寒者名柔瘧一云惡寒

太陽病發熱其脉沈而細者為瘧

太陽病發其汗因致瘧論云發其汗太多因致瘧

病者身熱足寒頸項強急惡寒時頭熱面赤目脉赤

獨頭動搖者為瘧論云獨頭面搖卒口噤背反張者瘧病也

太陽病無汗而小便反少氣上衝背口噤不得語欲

作剛瘧葛根湯主之

剛瘧為病背滿口噤卧不著席脚攣急其人必齮齒

可與大承氣湯

瘧病發其汗已其脉澹澹如蛇暴腹脹大者為欲解

脉如故反伏弦者必瘧一云瘧脉出欲已

瘧脉來按之築築而弦直上下行

瘥家其脉伏堅直上下

夫風病下之則瘥復發其汗必拘急

太陽病其證備身體強兀兀然脉沈遲此為瘥枯樓

桂枝湯主之

瘥病有灸瘥難療

瘥家雖身疼痛不可發其汗汗出則瘥

太陽病關節疼痛脉沈而緩者為中濕

論云中濕為濕痺之候其

人小便不利大便反快但當利其小便

病者一身盡疼

一云瘥

發熱日晡即劇此為風濕汗出

所致也

論云此病傷於汗出當風或久傷取冷所致

濕家之為病一身盡疼發熱三身色熏黃也

濕家之為病其人但頭汗出而背強欲得被覆向火

若下之早則噦或胃滿小便利不利云舌上如胎此爲

丹田有熱胃上有寒渴欲飲而不能飲則口燥也

濕家下之額上汗出微喘小便利不利云者死若下利

不止者亦死

問曰風濕相搏身體疼痛法當汗出而解值天陰雨

不止師云此可發汗而其病不愈者何也荅曰發其

汗汗大出者但風氣去濕氣續在是故不愈若治風

濕者發其汗微微似欲出汗者則風濕俱去也

濕家身煩疼可與麻黃湯加朮四兩發其汗爲宜慎

不可以火攻之

風濕脉浮身重汗出惡風者防已湯主之

病人喘頭痛鼻塞而煩其脉大自能飲食腹中和無

病病在頭中寒濕故臯塞內藥臯中即愈

論云濕家病身疼痛

發熱面黃而身重頭痛臯塞而無汗

傷寒八九日風濕相搏身體疼痛不能自轉側不嘔不渴脉浮虛而澀者桂枝附子湯主之若其人大便鞭小便自利者朮附子湯主之

風濕相搏骨節疼痛不得屈伸近之則痛劇汗出短氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甘草附子湯主之

太陽中熱暍是也其人汗出惡寒身熱而渴也白虎湯主之

太陽中暍身熱疼重而脉微弱此以夏月傷冷水水行皮膚中所致也瓜蒂湯主之

太陽中喝發熱惡寒身重而疼痛其脉弦細訖遲小便已洒洒然毛聳手足逆冷小有勞身熱口前開板齒燥若發其汗惡寒則甚加溫針則發熱益甚數下之淋復甚

平陽毒陰毒百合狐惑脉證第三

陽毒爲病身重腰背痛煩悶不安狂言或走或見鬼或吐血下痢其脉浮大數面赤斑斑如錦文喉咽痛唾膿血五日可治至七日不可治也有傷寒一二日便成陽毒或服藥吐下後變成陽毒升麻湯主之

陰毒爲病身重背強腹中絞痛咽喉不利毒氣攻心心中堅強短氣不得息嘔逆脣青面黑四肢厥冷其脉沈細緊數身如被打五六日可治至七日不可治

也或傷寒初病一二日便結成陰毒或服藥六七日
以上至十日變成陰毒甘草湯主之

百合之爲病其狀常默默欲卧復不能卧或如強健
人欲得出行而復不能行意欲得食復不能食或有
美時或有不用聞飲食臭時如寒無寒如熱無熱朝
至口苦小便赤黃身形如和其脉微數百脉一宗悉
病者隨證治之百合病見於陰者以陽法救之見於
陽者以陰法救之見陽攻陰復發其汗此爲逆其病
難治見陰攻陽乃復下之此亦爲逆其病難治

千金方云

見在於陰而攻其陽則陰不得解也復發其汗爲逆也
見在於陽而攻其陰則陽不得解也復下之其病不愈

狐惑爲病其氣如楊寒默默欲眠目不得閉卧起不
安蝕於喉爲惑蝕於陰爲狐狐惑之病並不欲飲食

腹食臭其面目乍赤乍白乍黑其毒蝕於上者則聲
喝其毒蝕下部者咽乾蝕於上部瀉心湯主之蝕於
下部苦參湯淹洗之蝕於肛者雄黃熏之喝一
伏夏
其人脉數無熱微煩默默欲卧汗出初得三四日目
赤如鳩眼得之七八日目四眦黃黑若能食者膿已
成也赤小豆當歸散主之
病人或從呼吸上蝕其咽或從下焦蝕其肛陰蝕上
爲感蝕下爲狐狐惑病者猪苓散主之

平霍亂轉筋脉證第四

問曰病有霍亂者何師曰嘔吐而利此爲霍亂

問曰病者發熱頭痛身體疼惡寒而復吐利當屬何
病師曰當爲霍亂霍亂吐利止而復發熱也傷寒其

脉微澀本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必吐利

轉筋爲病其人臂脚直脉上下行微弦轉筋入腹雞屎白散主之

平中風歷節脉證第五

夫風之爲病當半身不遂或但臂不遂者此爲痺脉微而數中風使然

頭痛脉滑者中風風脉虛弱也

寸口脉浮而緊緊則爲寒浮則爲虛虛寒相搏邪在皮膚浮者血虛絡脉空虛賊邪不瀉或左或右邪氣反緩正氣則急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌膚不仁邪在於經則重不勝邪入於腑則不識人邪入

於藏舌即難言口吐於涎

寸口脉遲而緩遲則爲寒緩則爲虛榮緩則爲亡血
衛遲則爲中風邪氣中經則身癢而癰癰心氣不足
邪氣入中則胃滿而短氣

跌陽脉浮而滑滑則穀氣實浮則汗自出

少陰脉浮而弱弱則血不足浮則爲風風血相搏則
疼痛如掣

盛人脉濇小短氣自汗出歷節疼不可屈伸此皆飲
酒汗出當風所致也

寸口脉沈而弱沈則主骨弱則主筋沈則爲腎弱則
爲肝汗出入水中如水傷心歷節黃汗出故曰歷節也
味酸則傷筋筋傷則緩名曰泄鹹則傷骨骨傷則痿

名曰枯枯泄相搏名曰斷泄榮氣不通衛不獨行榮
衛俱微三焦無所御四屬斷絕身體羸瘦獨足腫大
黃汗出脛冷假令發熱便爲歷節也病歷節疼痛不
可屈伸烏頭湯主之

諸肢節疼痛身體尅瘰脚腫如脫頭眩短氣溫溫欲
吐桂枝芍藥知母湯主之

平血痺虛勞脉證第六

問曰血痺從何得之師曰夫尊榮人骨弱肌膚盛重
因疲勞汗出卧不時動搖加被微風遂得之形如風
狀巢原云其狀如
被微風所吹但以脉自微澹在寸口關上小緊
宜針引陽氣令脉和緊去則愈

血痺陰陽俱微寸口關上微尺中小緊外證身體不

仁女風狀黃耆桂五物湯主之

夫欲治病當先知其證何趣乃當攻之耳

男子平人脉大爲勞極虛亦爲勞

男子勞之爲病其脉浮大手足煖春夏劇秋冬差陰寒精自出酸削不能行少陰虛滿

人年五六十其病脉大者痺俠背行苦腸鳴馬刀俠嬰者皆爲勞得之

男子平人脉虛弱細微者喜盜汗出也

男子面色薄者主渴及亡血卒喘悸其脉浮者裏虛也男子脉虛沈弦無寒熱短氣裏急小便不利面色白時時目瞑此人喜衄少腹滿此爲勞使之然男子脉微弱而澀爲無子精氣清冷

夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩痛目眩云髮落脉極虛芤遲爲清穀亡血失精

脉得諸芤動微緊男子失精女子夢交通桂枝加龍骨牡蠣湯主之

脉沈小遲名脫氣其人疾行則喘喝手足逆寒腹滿甚則溇泄食不消化也

脉弦而大弦則爲減大則爲芤減則爲寒芤則爲虛寒虛相搏此名爲革婦人則半產漏下男子則亡血失精

平消渴小便利淋脉證第七

師曰厥陰之爲病消渴氣上衝心中疼熱飢而不欲食食即吐下之不肯止

寸口脉浮而遲浮則爲虛遲則爲勞虛則衛氣不

遲則榮氣竭跌陽脉浮而數浮則爲氣數則消穀而

緊

要略緊作大堅

氣盛則洩數洩數則緊

要略作堅

緊數相搏則

爲消渴

男子消渴小便反多以飲一斗小便斗腎氣圓主之

師曰熱在

一作結

下焦則溺血亦令人淋閉不通淋之

爲病小便如粟狀少腹弦急痛引臍中寸口脉細而

數數則爲熱細則爲寒數爲強吐跌陽脉數胃中有

熱則消穀引食大便必堅小便則數少陰脉數婦人

則陰中生瘡男子則氣淋

淋家不可發汗發汗則必便血

平水氣黃汗氣分脉證第八

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黃汗風水其脉自浮外證骨節疼痛其人惡風皮水其脉亦浮外證胕腫按之沒指不惡風其腹如鼓如鼓一作不滿不渴當發其汗正水其脉沈遲外證自喘石水其脉自沈外證腹滿不喘黃汗其脉沈遲身體發熱背滿四肢頭面腫久不愈必致癰膿

脉浮而洪浮則爲風洪則爲氣風氣相搏風強則爲臃腫身體爲癢癢爲泄風久爲痂癩氣強則爲水難以俛仰風氣相擊身體洪腫汗出乃愈惡風則虛此爲風水不惡風者小便通利上腠有寒其口多涎此爲黃汗

寸口脉沈滑者中有水氣面目腫大有熱名曰風水

視人之目裏上微擁如新卧起狀其頸脉動時時欬
按其手足上陷而不起者風水太陽病脉浮而緊法
當骨節疼痛而反不疼身體反重而酸其人不渴汗
出即愈此爲風水惡寒者此爲極虛發汗得之渴而
不惡寒者此爲皮水身腫而冷狀如周痺胷中窒不
能食反聚痛暮躁不眠此爲黃汗痛在骨節欬而喘
不渴者此爲脾脹其形如腫發汗即愈然諸病此者
渴而下利小便數者皆不可發汗

風水其脉浮浮爲在表其人能食頭痛汗出表無佗
病病者言但下重故從腰以上爲和腰以下當腫及
陰難以屈伸防已黃耆湯主之

一云風水脉浮身重汗出惡風者防已黃耆湯主之

風水惡風一身悉腫脉浮不渴續自汗出而無大熱