

傷寒論類方

吳江徐大椿靈胎編輯

桂枝湯類一

桂枝湯一

桂枝三兩芍藥三兩甘草二兩生薑三兩大枣十二枚

桂枝本不能發汗故須助以熱粥內經云穀入於胃以傳於肺主皮毛汗所從出

右五味以水七升微火煮取三升去滓適寒溫

服一升服已須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力

傳於肺肺主皮毛汗所從出

此可知傷寒溫覆令一時許遍身熱微似有汗者益佳不可令如水流瀉病不必除此解肌之法也若如水瀉則

動榮氣衛邪仍在若一服汗出病瘥停後服不必盡劑若不汗更服依前法又不汗後服小促其間半日許令

三服盡若病重者一日一夜服周時觀之服一劑盡病證猶在者更作服若汗不出乃服至三劑桂

湯全料謂之一劑三分之一謂之一服古一兩今二錢零則一劑之藥除薑棗僅一兩六錢零一服不

過五錢零矣治傷寒大症分兩不過如此一服即汗不再服無汗服至二三劑總以中病為主後世見

服藥得效者反令多服無效者即禁生冷粘滑肉麵五辛酒酪及臭惡等物

太陽中風陽浮而陰弱風在外故陽脈浮衛氣有陽浮者熱自發桂枝之辛以散之陰弱者汗自出之酸

以收之甘草黃芩受寒浙浙惡風惡風未有不惡寒者但惡寒甚翕翕發熱其熱亦不如鼻鳴乾嘔者鼻

似屬陽明乾嘔似屬少陽蓋三桂枝湯主之太陽病頭痛發熱汗出惡風者桂枝湯主之此桂枝太

陽病下之後其氣上衝者可與桂枝湯方用前法治若不上衝者不可與之此誤下之症誤下而仍上衝枝發表若不上衝則其邪已下陷變病不

傷寒論類方 桂枝湯

太陽病初服桂枝湯反煩不解者先刺風池風府却與桂枝

序

王叔和傷寒例云今搜採仲景舊論錄其證候診脈聲色對病真方擬防世急則知傷寒論當時已無成書乃叔和之所搜集者雖分定六經而語無詮次陽經中多陰經治法陰經中多陽經治法參錯不一後人各生議論每成一書必前後更易數條互相爭議各異其說愈更愈亂終無定論不知此書非仲景依經立方之書乃救誤之書也其自序云傷天橫之莫救所以尋求古訓博採眾方蓋因誤治之後變證錯雜必無循經現證之理當時著書亦不過隨證立方本無一定之次序也余始亦疑其有錯亂乃探求三十年而後悟其所以然之故於是不類經而類方蓋方之治病有定而病之變遷無定知其一定之治隨其病之千變萬化而應用不爽此從流溯源之法病無遁形矣至於用藥則各有條理解肌發汗攻邪散痞逐水驅寒溫中除熱皆有主方其加減輕重又各有法度不可分毫假借細分之不外十二類每類先定主方即以同類諸方附焉其方之精思妙用又復一一註明條分而縷悉之隨以論中用此方之證列於方後而更發明其所以然之故使讀者於病情藥性一目了然不論從何經來從何經去而見證施治與仲景之意無不吻合豈非至便之法乎余纂集成帙之後又復鑽窮者七年而五易其稿乃無遺憾前宋朱肱活人書亦曾彙治法於方後但方不分類而又無所發明故閱之終不得其要領此書成後之讀傷寒論者庶可以此為津梁乎

乾隆二十四年歲在屠維單闕陽月上浣涇溪徐大椿序

傷寒論類方目錄

目錄

桂枝湯類一十九

桂枝湯

桂枝加附子湯

桂枝加桂湯

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝加厚朴杏仁湯

小建中湯

桂枝加芍藥湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝二麻黃一湯

桂枝二越婢一湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

桂枝加葛根湯

桂枝加芍藥湯

桂枝加大黃湯

麻黃湯類二十六

麻黃湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

大青龍湯

小青龍湯

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

葛根湯類三十三

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

葛根加半夏湯

柴胡湯類四十六

小柴胡湯

大柴胡湯

柴胡加桂枝湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

柴胡桂枝乾薑湯

柴胡加芒硝湯

梔子湯類五十七



南京中医药大学图书馆藏

梔子豉湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

梔子乾薑湯

梔子厚朴枳實湯

梔子柏皮湯

枳實梔子豉湯

承氣湯類六十一

大承氣湯

小承氣湯

調胃承氣湯

桃仁承氣湯

抵當湯

抵當丸

十棗湯

大陷胸湯

大陷胸丸

小陷胸湯

白散

麻仁丸

瀉心湯類七十二

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

半夏瀉心湯

大黃黃連瀉心湯

附子瀉心湯

黃連湯

黃芩湯

黃芩加半夏生薑湯

乾薑黃連黃芩人參湯

旋復代赭石湯

厚朴生薑甘草半夏人參湯

白虎湯類八十三

白虎湯

白虎加人參湯

竹葉石膏湯

五苓湯類九十四

五苓散

猪苓湯

文蛤散

茯苓甘草湯

四逆湯類十十五

四逆湯

四逆加人參湯

通脈四逆湯

通脈四逆加猪膽汁湯

乾薑附子湯

茯苓四逆湯

白通湯

白通加豬膽汁湯

四逆散

當歸四逆湯

當歸四逆加吳茱萸生薑湯

理中湯類十一方

理中丸

真武湯

附子湯

甘草附子湯

桂枝附子湯

桂枝附子去桂加白朮湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

桂枝人參湯

雜方十二方

赤石脂禹餘糧湯

炙甘草湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

茵陳蒿湯

麻黃連軀赤小豆湯

瓜蒂散

麻黃升麻湯

黃連阿膠湯

吳茱萸湯

半夏散及湯

桃花湯

豬膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒散

烏梅丸

白頭翁湯

牡蠣澤瀉散

蜜煎導方

豬膽汁方

燒視散

以上共一百十三方

湯則愈。此非誤治因風邪凝結於太陽之要路則藥力不能流通故刺以解其結蓋邪風太甚不僅在衛而在經刺之以洩經氣風府一穴在頂上入髮際一寸大筋內宛宛中督脉陽維之會也刺之四

分留三呼風池二穴在顯顙後髮際陷者中足少陽陽維之會針入三分留三呼太陽病外症未解者不可下也。此禁下下之為逆欲解外者宜服言雖有當下之症而外症未除亦不可下仍宜解外

桂枝法。陽病外症未解者不可下也。總訣下下之為逆欲解外者宜服言雖有當下之症而外症未除亦不可下仍宜解外

而後。太陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而反下之故令不愈令脈浮故知在外當須解外則愈宜服

脈浮而下此為誤下下後仍浮則邪不因誤下而陷入仍在太陽不得因已汗下而不復用桂枝也病嘗自汗出者此為榮氣和榮氣

和者外不諧以衛氣不共榮氣和諧故爾。榮氣和者言榮氣不病非以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮

衛和則愈宜桂枝湯。自汗與發汗迥別自汗乃榮衛相離發汗使榮衛相合自汗傷正病入藏無他病

時發熱有汗出而不愈者此衛氣不和也。先其時未熱發汗則愈宜桂枝湯主之無他病太陽諸症不必

用桂枝湯傷寒不大便六七日。宜下頭項痛有熱者未可與承氣湯按未可二字從金匱增入傷寒論失此二

字其小便清者知不在裡仍在表也。裏有熱當須發汗若頭痛者必衄汗出而頭痛未解則宜桂枝湯

傷寒發汗解半日許復煩脈浮數者可更發汗。發汗未透故煩乃宜桂枝湯傷寒醫下之續得下利清

穀不止。裏身疼痛者表急當救裡此誤下之症邪在表而引之入陰故便清穀陽氣下脫可危雖表症未

血後身疼痛清便自調者急當救表則以扶陽為急而表症為緩也表裏分治而序不亂後人欲以一方

治數症必救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯太陽病發熱汗出者此為榮弱衛強故使汗出欲救邪風者

宜桂枝湯。提出邪風二字見陽明病脈遲汗出多微惡寒者表未解也可發汗宜此方陽明本自多汗但不惡寒而惡

熱今多汗而猶惡寒則仍在太陽太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯。太陰本無汗法因其脈獨浮則邪仍

病人煩熱汗出則解。又加瘧狀。有時日晡所發熱者屬陽明也。日晡發熱則為陽明。脈實者宜下之。脈虛

浮者宜發汗。一症而治法迥別。全以脈為下之。與大承氣湯發汗。宜桂枝湯。下痢腹脹滿。裏

表先溫其裡。乃攻其表。溫裡宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。此節屬厥陰症。未必由誤治。吐痢止而身痛者。傷寒大下後復發汗。誤心下

痞。當消息和解其外。宜桂枝湯小和之。裏症除而表症猶在。仍宜用桂枝法。輕其劑而加減之可也。

若寒開降之法詳見後

桂枝加附子湯二

桂枝湯原方加附子一枚。炮去。皮破八片。右六味以水七升。煮取三升。去渣溫服一升。

太陽病發汗遂漏不止。此發汗太過如水流。其人惡風。中風本惡風。汗後當愈。今小便難。少津液。四肢微急。難

難以屈伸。四肢為諸陽之本。急難屈伸乃津脫陽虛之象。但不至亡桂枝加附子湯主之。桂枝同附子服。陽耳若更甚而厥冷惡寒則有陽脫之虞。當用四逆湯矣。

桂枝加桂湯三

桂枝湯原方加桂二兩。即另立湯名。治症迥別。古聖立方之嚴如此。

桂枝湯原方加桂二兩。右五味以水七升。煮取三升。去滓溫服一升。

燒針令其汗。針處被寒。核起而赤者。必發奔豚。氣從小腹上衝心者。灸其核上。各一壯。云云。各一壯。故

與桂枝加桂湯。重加桂枝。不特禦寒且制腎氣。又藥味重。則能達下。凡奔豚症此方可增減用之。

桂枝去芍藥湯四

桂枝湯原方去芍藥。右四味以水七升。煮取三升。溫服一升。

傷寒論類方 桂枝湯

傷寒論類方 桂枝湯

桂枝去芍藥加附子湯五

即前方加附子一枚炮去皮破八片餘依前法

太陽病下之後脉促胸滿者中虛而表邪仍在桂枝去芍藥湯主之太陽之邪未盡故用桂枝若微惡寒者宜

藥方中加附子湯主之微惡寒者則陽亦虛矣故加附子

桂枝加厚朴杏仁湯六

桂枝湯原方加厚朴二兩炙杏仁五十枚右七味以水七升微火煮取三升溫服一升覆取微似汗

喘家作桂枝湯加厚朴杏仁佳別錄厚朴主消痰下氣太陰病下之危喘者表未解故也此湯主之

乃本然之喘此乃誤下之喘因殊而法一

小建中湯七

桂枝湯原方加膠飴二升右六味以水七升煮取三升去滓納飴更上微火消解溫服一升日三服

嘔家不可用建中湯以甜故也

傷寒陽脉濡陰脉弦中宮之陽氣虛則木來乘土故陽濡而陰弦也法當腹中急痛先與小建中湯以助中宮不差者與小柴胡

湯主之治太陰不愈變而治少陽所以疎土中之木也傷寒二三日心中悸而煩者小建中湯主之悸而煩其為虛

中湯以補心脾之氣蓋施于湯治有熱之虛煩此治無熱之虛煩也

桂枝加芍藥生薑人參新加湯八

桂枝湯原方芍藥生薑各增一兩加人參三兩右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升以此



多煎為妙取其味厚入陰也

發汗後身疲痛盡表未脈沈遲已甚此湯主之即未盡宣表而氣虛不能勝散藥故用人參凡素體虛而過汗者方可用

桂枝甘草湯九

桂枝四兩甘草二兩

右二味以水三升煮取一升頓服此以一副為一服者

發汗過多其人叉手自冒心心下悸欲得按者此湯主之發汗不誤誤在過多汗為心之液多則心氣虛二味扶陽補中此乃陽虛之輕者甚而振振欲

擗地則用真武湯矣一症而輕重不同用方迥異其義精矣

茯苓桂枝甘草大棗湯十

茯苓半斤桂枝四兩甘草二兩大棗十二枚

右四味以甘爛水一斗以水二斗揚之萬遍取用按甘爛水大約取其動極思靜之意先

煮茯苓凡方中專重之藥法必先煮減二升納諸藥煮取三升去渣溫服一升日三服

發汗後其人臍下悸者欲作奔豚此湯主之心下悸是擾胸中之陽臍下悸則因發汗太過上焦乾渴腎水上救故重用茯苓以制腎水桂枝以治奔豚

桂枝麻黃各半湯十一

桂枝一兩十六分芍藥一兩十六分生薑一兩甘草一兩麻黃一兩杏仁二十四枚去

右七味以水一斗煮取三升去渣溫服一升日三服

五升先煮麻黃一二沸去沫欲去沫故先煮納諸藥煮取一升八合減去三之一去滓溫服六合一云桂枝湯三

合麻黃湯三合頓服將患如上法

太陽病得之八九日經過如瘧狀發熱惡寒熱多寒少即已清便欲自可無裏一日二三度

發非瘧象脈微緩者不浮不大為欲愈也餘邪欲退之象脈微而惡寒者此陰陽俱虛不可更發汗更下更吐也此三

傷寒論類方

桂枝湯

三



明上文欲愈之故益由病氣雖除而正氣亦衰當靜以養之使胃氣漸充則面色反有熱色者未欲解也
緊衛自和若更用汗吐下之法益虛其氣則病從藥增醫者不審誤人多矣
面有熱色則以其不得小汗出身必痒宜服微邪已在皮膚中欲自出不得故身痒以此湯取其小汗是
餘邪尚鬱
方分兩其輕計共約六兩合今之秤僅一兩三四錢分
三服祇服四錢零乃治邪退後至輕之劑猶勿藥也

桂枝二麻黃一湯十二

桂枝一兩十七銖去皮芍藥一兩六銖杏仁十六枚麻黃十六銖去節甘草二兩生薑一兩六銖大棗五枚右七味以水五升

先煮麻黃二沸去上沫納諸藥煮取二升去滓溫服一升日再服一本云桂枝湯二升麻黃湯一升

合為三升分再服

服桂枝湯大汗出脉洪大者汗雖出而邪未盡與桂枝湯如前法此所謂邪不盡若形如瘧日再發者汗出必解

桂枝二麻黃一湯主之此與桂枝湯麻黃各半湯意略同但此因桂枝湯後故桂枝略重而麻黃略輕

桂枝二越婢一湯十三桂枝湯加麻黃石羔二味

桂枝去皮芍藥甘草麻黃去節各十八銖大棗四枚生薑二兩石羔二十四銖碎綿裹右七味以水五升

煮麻黃二沸去上沫納諸藥煮取二升去渣溫服一升附越婢方麻黃六兩甘草二兩石

羔半兩生薑三兩大棗十五枚

大陽病發熱惡寒熱多寒少脉微弱者此無陽也不可更汗此無陽與亡陽不同并與他處之陽虛亦別蓋其人本非壯盛而邪氣亦輕故身有寒熱

而脉微弱若發其汗必至有义手冒心膈下悸等症故以此湯清疎榮衛令得似汗而解况熱多寒少熱在氣分尤與石羔為宜古聖用藥之審如此按以上三方所謂一二各半之說照方計算並不對準未如何說或云將本方各煎或一分或二分相和服此亦一法但方中又各藥注明分兩則何也存考

桂枝去桂加茯苓白朮湯十四

芍藥三兩甘草二兩生薑

茯苓

白朮各三兩大棗十二枚

右六味以水八升煮取三升去滓溫

服一升。小便利則愈。此方專於利小便也

服桂枝湯。或下之。仍頭項強痛。翕翕發熱無汗。心下滿微痛。小便不利。葦湯主之。頭痛發熱桂枝症仍在也。以其無汗則不

宜更用桂枝。心下滿則用白朮。小便不利則用茯苓。此症乃亡津液而有停飲者也。凡方中有加減法。皆佐使之藥。若去其君藥則另立方名。今去桂枝而仍以桂枝為名。所不可解。殆以此方雖去桂枝而意

仍不離乎桂枝也。

桂枝去芍藥加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯十五

桂枝湯原方。去芍藥。加蜀漆三兩洗去腥。牡蠣五兩龍骨四兩

右七味以水一斗二升先煮蜀漆減二升

納諸藥煮取三升去滓溫服一升。

傷寒脈浮。醫以火迫劫之。亡陽。必驚狂。以火劫其胸中之陽。起臥不安者。此湯主之。此與少陰汗出之亡陽迥別。蓋

用四逆輩固其陽於腎中。今乃以火逼汗亡其陽中之陽。故用安神之品。鎮其陽於心中。各有至理。不可易也。去芍藥。因陽虛不復助陰也。蜀漆去心腹邪積。龍骨牡蠣治驚癇。熱氣。

桂枝甘草龍骨牡蠣湯十六

桂枝去皮甘草二兩牡蠣二兩龍骨二兩

右四味以水五升煮取二升半去滓溫服八合日三服

脈浮宜以汗解。此治脈浮之總訣。用火灸之。誤。治邪無從出。因火而盛。入內。病從腰以下必重而痺。名火逆也。火氣

則陰氣獨治於下。故重而痺。火逆下之。誤。因燒針煩躁者。更誤。治下之虛其陰。燒針又益其陽。則胸中益煩躁不寧矣。桂枝甘草龍骨牡蠣湯

主之。鎮其陰氣散其火邪。上下同治。前方驚狂治重在心。故用蜀漆。此無驚狂象。故蜀漆不用。其症藥大段相同。

傷寒論類方 桂枝湯

桂枝加葛根湯十七

此湯成無已本有麻黃非有麻黃則為葛根湯矣

桂枝湯原方加葛根四兩桂枝芍藥各減一兩餘同右六味以水一斗先煮葛根減二升去沫納

諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥

太陽病項背強八反汗出惡風者八八仲頸之象邪氣漸深故加葛根桂枝加葛根湯主之

桂枝加芍藥湯十八

桂枝湯原方芍藥加一倍右五味以水七升煮取三升溫服一升日三服

桂枝加大黃湯十九

此二方俱治太陰症而法不離乎桂枝

桂枝湯原方加大黃一兩芍藥一倍右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三服

本太陽病醫反下之誤因而腹滿時痛屬太陰也引和入於太陰故桂枝加芍藥湯主之雖見太陰症而太陽之症尚未

罷故仍用桂枝湯只加芍藥一倍以飲太陰之症大實痛者此句承上文腹滿時痛言腹滿時痛不過桂枝加大黃湯主之此因

而不盡然按活人書云桂枝湯自西北人四時行之無不應驗江淮間惟冬及春可行之春末及夏至以前桂枝症可加黃芩一分謂之陽旦湯夏至後不可加知母半

兩石膏一兩或加升麻一分若病人素虛寒者不必加減

麻黃湯類二

麻黃湯一

麻黃三兩桂枝二兩甘草炙杏仁七十個右四味以水九升先煮麻黃減二升此須多煮取其力

止者一去上沫納諸藥煮取二升半去滓溫服八合覆取微似汗不須啜粥以其易發汗也餘如桂枝將息法



活人書云夏至後用麻黃湯量加知母石
羔黃芩蓋麻黃性熱恐有發黃斑出之虞

太陽病頭痛發熱身疼腰痛骨節疼痛此痛處比桂枝症尤多而惡風無汗而喘者此二症乃肺氣不舒

仁治喘桂枝甘草治太陽諸症無一味不緊切所以謂之經方太陽與陽明合病陽明之病象甚多如身熱不惡寒口苦鼻乾之類但

喘而胸滿者不可下上焦病俱在宜麻黃湯主之喘而胸滿此麻黃症太陽病十日以去經脈浮細而

嗜臥者上漸外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯胸滿脇痛病延日久脉但浮者與麻黃湯若果邪在

帶弦今但浮則尚在太陽矣故仍用麻黃湯此亦從脉不從症之法

太陽病脉浮緊無汗發熱身疼腰痛此乃太陽傷寒的症經云諸緊為寒八九日不解表

證仍在表証即上此當發其汗宜麻黃湯服藥已微除其人發煩目瞑陽鬱而不劇者必衄衄乃解此其動血

清道而出與汗從皮毛而洩同故熱邪亦解俗語所云紅汗也經云陽明病口燥但欲漱水不欲嚥者此必衄所以然者陽氣重故也風鬱固為熱寒鬱亦為熱

類麻黃湯主之此非衄後更用麻黃也脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯此脉浮脉浮而數者發

汗宜麻黃湯數為陽傷寒脉浮緊不發汗誤因致衄者麻黃湯主之前段衄後而解則不必復用麻

陽明病肝浮無汗而喘者陽明本脉大自汗今乃脉浮發汗則愈宜麻黃湯黃衄後尚未解則仍用此湯

麻黃杏仁甘草石膏湯二此即越婢湯加杏仁也

麻黃四兩杏仁五十個甘草二兩石羔半兩綿裹

煮取二升去滓溫服一升

發汗後不可更行桂枝湯既汗不可再汗津液不得重傷汗出而喘尚有留邪在肺無大熱者邪也可與此湯汗出故用

傷寒論類方 麻黃湯

湯既下不可復汗。若汗出而喘，無大熱者，可與此湯。

大青龍湯三。此合麻黃桂枝越婢三。方為一方而無芍藥。

麻黃六兩，桂枝二兩，甘草二兩，杏仁四十枚，生薑切三兩，大棗枚十二，石膏碎如雞子大一塊。

右七味以水九升。

先煮麻黃減二升，去上沫，納諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升。取微似汗，汗出多者，溫粉撲之。

溫粉方明理論載白朮、藁本、川芎、白芷各等分，入米粉和勻撲之，無藁本亦得。後人用牡蠣、麻黃根、鉛粉、龍骨亦可。一服汗者，停後服，汗多亡陽，遂虛惡風煩燥。

不得眠也。

太陽中風，脈浮緊，汗出不止，發熱惡寒，身疼痛，不汗出而煩躁者，和深發熱，大青龍湯主之。若脈微弱，汗出惡風者，不可服，服之則厥逆筋惕肉瞤，此為逆也。

惡風乃桂枝症，誤服此則汗不止而有亡陽之象矣。立此方即垂此戒，聖人之意深矣。按此方合麻桂而用石羔，何以發汗如是之烈？蓋麻黃湯麻黃用二兩，而此用六兩，越婢湯石羔用半觔，而此用雞子大一塊，一劑之藥除大棗約共十六兩，以今秤計之，亦重三兩有餘，則發汗之重劑矣。雖少加石羔，終不足以相制也。少陰篇云：脈陰陽俱緊，反汗出者，亡陽也。

傷寒脈浮緩，身不疼但重，乍有輕時，無少陰症者，大青龍湯主之。脈不

身有輕時，為無少陰外症，不厥利吐逆為無少陰裏症。此邪氣俱在外也，故以大青龍發其汗。按此條必有誤，脈浮緩邪輕易散，身不疼外邪已退，乍有輕時，病未入陰，又別無少陰等症，此病之最輕者，何必

投以青龍峻之劑？此必有另有主方而誤以大青龍當之者也。

小青龍湯四。

麻黃去節芍藥細辛乾薑甘草桂枝去皮各五兩子半助半夏湯洗右八味以

水一斗，先煮麻黃減二升，去上沫，納諸藥，煮取三升，去滓，溫服一升。若微利者，去麻黃，加薤花如雞

子大，熬令赤色。利屬下焦，陰分不可更發，其陽萎花明理論作羌花，恐誤本草薤花羌花，若渴者去

葉相近而薤花不常用，當時已不可得，故改用羌花，以其皆有去水之功也。



半夏加括翼根三兩。本草括翼根主消渴若噎者。噎古作餓論云寒氣相搏則為腸鳴醫乃不知而反飲冷水令

呃逆之去麻黃加附子一枚。炮子溫中若小便不利少腹滿去麻黃加茯苓四兩。則水不在上而在下

矣故用若喘者去麻黃加杏仁半升去皮尖。杏仁見前按此方專治水氣蓋汗為水類肺為水源和

此方無微不到真神劑也

傷寒表不解。發汗未透心下有水氣。即未出之汗乾嘔發熱而咳或渴或利或噎或小便不利少腹滿或喘者小青

龍湯主之。以上皆水停心下現症其每症治法皆在加減中傷寒心下有水氣。欬而微喘發熱不渴者喘而不渴服湯已。即小

湯也渴者此寒氣欲解也。欲飲小青龍湯主之。此倒筆法即指服湯已三字非謂欲解之後更服小青龍湯也

麻黃附子細辛湯五

麻黃二兩細辛二兩附子一枚。右三味先煮麻黃減二升去上沫納諸藥煮取三升去滓溫服一升日

少陰病始得之反發熱脉沉者此湯主之。少陰病三字所該者廣必從少陰諸現症細細詳審然後反發

必候其脉象之沈然後蓋知其為少陰無疑也凡審症皆當如此附子細辛為少陰溫經之藥夫人知

之用麻黃者以其發熱則邪猶連太陽未盡入陰猶可引之外達不用桂枝而用麻黃者蓋桂枝表裏通

用亦能溫裏故陰經諸藥皆用之麻黃則專於發表今欲散少

陰始入之邪非麻黃不可況已有附子足以溫少陰之經矣麻黃附子甘草湯六

麻黃二兩甘草二兩附子一枚。右三味以水七升先煮麻黃二兩沸以蠶去上沫納諸藥煮取三升

去渣溫服一升日三服。少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二三日無裏症故微發汗也。三陰經惟少陰與太陽為

傷寒論類方 葛根湯

解之理況二三日而無裏症則其邪未深入此方較麻黃附子細辛少輕以其無裏症也

葛根湯類三

葛根湯一

此即桂枝湯加麻黃三兩葛根四兩

葛根四兩

麻黃三兩去節芍藥二兩

生薑切兩

甘草二兩

桂枝二兩去皮大棗枚十二

右七味以水一斗先煮麻

黃葛根二兩

藥先煮減二升去上沫納諸藥煮取三升去渣溫服一升覆取微似汗不須啜粥也

桂枝法將息及禁忌

大陽病項背強几几無汗惡風葛根湯主之

前桂枝加葛根湯一條其現症亦同但彼云反汗出故無麻黃此云無汗故加麻黃也陽明症汗出而惡熱今無汗而

惡風則未全入陽明故曰太陽病按葛根本草治身大熱大熱乃陽明之症也以太陽將入陽明之經故加此藥

太陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之也

合病全在下利一症上審出蓋風邪入胃則下利矣

葛根黃芩黃連湯二

葛根半兩

甘草二兩

黃芩三兩

黃連三兩

右四味以水八升先煮葛根減二升納諸藥煮取二升去

渣分溫再服

太陽病桂枝症

桂枝症即太陽傷風之正病也醫反下之誤利遂不止邪下陷則脈促者表未解也尚有數意邪猶在外

沈微等象故不用理中等法喘而汗出者此湯主之因表未解故用葛根因喘汗而利故用芩連之

葛根加半夏湯三

葛根湯原方加半夏半斤先煎服法同

大陽與陽明合病不下利

前條因下利而知太陽陽明合病今既不下利則合病何從而但嘔者葛根加