

丹溪心法附餘卷十六

庚集

火鬱門

脇痛七十四

丹溪心法

○脇痛肝火盛 木氣實 有死血 有痰流注 肝急木氣
實用蒼朮川芎青皮當歸之類 痛甚者肝火盛以當歸炮會
九姜汁下是湧火之要藥 死血用桃仁紅花川芎 痰流注
以二陳湯加南星蒼朮川芎 肝苦急上食辛以散之用枳芎
川芎蒼朮血病入血藥中行血 治咳嗽脇痛以二陳湯加南
星香附青皮青黛入姜汁 脇痛有瘀血行氣藥中加桃仁不
去尖并香附之類 有火盛者當伐肝木 左金丸治肝火

有氣鬱而胸脇痛者者其脉沉澁当作鬱治 痛而不得伸舒者蜜丸疒會丸最快 脇下有食積一條扛起用吳茱萸炒黃連 控涎丹一身氣鬱及脇痛痰挾死血加桃仁泥丸服 右脇痛用推氣散出炭氏方 左脇痛用前藥為君加柴胡或小柴胡湯亦可治

八方

小疒會丸

當歸

草疒胆酒洗山梔炒

黃連炒

川芎

各半刀

大黃

煨半刀

芦荟

三糸

木香一糸

一方有黃芩柴胡各半兩無大黃木香

一方有柴胡甘草青皮無當歸梔子

右為末入射香少許粥糊丸如菽豆大每服五十九姜湯下
仍以琥珀膏貼痛處 尤会丸亦治有積因飲食太飽勞力
行房脇痛

當歸尤会丸 治內有濕熱而脇痛先以琥珀膏貼痛處却以
生姜汁吞此丸 痛甚者須炒令熱服

草龍胆 当灶 大校子 黃連

黃芩各一刀 大黃 芦荟半刀 木香

黃栢一刀 射香半刀

右十味為末麪糊丸 一方加柴胡川芎各半兩 又方加

青黛半兩 蜜丸治脇痛 麪丸降肝火

抑青丸 瀉肝火

黃連半斤

右為末蒸餅糊丸服

附諸方

推氣散 治右脇疼痛脹滿不食

只壳

桂心

片子姜黃各半刀 一本作姜蚕

甘草炙一斗半

右為末每服二斗姜棗湯調下酒亦可

枳朮散 治左脇痛刺不可忍者

只炙炒

川芎各半刀粉草 炙一斗半

右為末每服二斗姜棗湯下酒亦可

鹽煎散和劑方治男婦人一切冷氣攻上胸脇刺痛不能已及

脾胃虛冷嘔吐泄膀胱小腸氣婦人血氣

縮砂仁

去殼

甘草炙

茯苓

去皮

草果仁

去皮煨

肉豆蔻

川芎

洗

茴香

炒

萆澄茄

大麥芽

檳榔

良姜

枳殼

蒼朮

陳皮

去白

羌活

厚朴

右咬咀每服三升水一盞入鹽少許煎至七分去渣空心溫服

沉香升氣丸

御藥院方

治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞

沉香

檳榔

各二升半

人參

訶子

煨去核

大腹皮

炒各半兩

白朮

紫蘇葉

香附子

炒

神麴

炒

麥蘖

烏藥

各一兩

陳皮

去白

甘草

炒

姜黃

各四兩

京三稜

煨

蓬莪朮煨

益智炒去殼厚朴去皮姜製各二兩

右咬咀每服三升水一盞煎七分不拘時去渣溫服

分氣紫蘇飲 治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞腹脇疼痛氣

促喘急見喘類

調中順氣丸 援萃方治三焦瘴滯水飲停積腸下虛滿或時刺

痛者

木香

白豆蔻仁

青皮去白

陳皮去白

三稜

炮各一兩

大腹子

半夏湯泡七次各二兩

縮砂仁

檳榔

沉香各半兩

右為末水為糊丸如梧桐子大每服三十丸至五十丸陳皮

湯送下

復元通氣散和劑方治氣不宜通或成瘡癰并閃挫腰胸氣滯

不散

方見腰痛

枳殼煮散

治悲哀傷肝氣痛引兩脇

方見氣滯

一方

治脇下疼痛如神効

小茴香

一兩炒

枳殼

五斤麩炒

右為末每服二錢鹽湯調下

十棗湯

治脇痛甚効病人氣實可用虛人不可用

甘遂

芫花

慢火炒紫色

大戟

各等分

右為末水一大盞束十枚切開煮取汁半盞調五分人實更加一錢量虛實加減

控涎丹

見痛風

二陳湯

見痰類

左金丸

見火類

小柴胡湯

見溫熱

琥珀膏

見積聚

○或謂予曰脇痛之症多是肝火上升不得條達之故而局方鹽煎散沉香升氣散分氣紫蘇飲調中順氣丸俱是辛溫之劑但能行氣開鬱豁痰消積而已其於降火未之有也病源是火而用辛溫之藥治之則是以火濟火而痛愈甚矣予曰不然古人之方必經有驗而筆之於書豈肯妄作而誣後人哉但後人不善於用也丹溪曰脇痛肝火盛木氣實有死血有痰流注予每度之凡左脇痛甚者即是

肝火盛木氣實也宜用龍會丸左金丸辛涼之劑以治之
凡右脇痛微者即是痰流注并食積宜用鹽煎散順氣丸
等藥辛溫之劑以治之是也又嘗論夫左脇痛胃脘痛二
証婦人多有之以其憂思忿怒之氣素蓄于中發則上衝
被濕痰死血阻滯其氣而不得條達故作痛也故治婦人
諸痛諸疾必以行氣開鬱為主而破血散火兼之庶乎得
法矣諺云香附縮砂婦人之至寶山藥菴蓉男子之佳珍
此之謂也

跌撲損傷七十五

庚集

丹溪心法

○跌撲損傷須用蘇木和血黃連降火白朮和中童便煎炒

在下者可先須補接後下瘀血 在上者宜飲韭汁或和粥喫
切不可飲冷水血見寒則凝但一絲血入心即死

入方

治跌撲損傷

跌撲出血者姜汁香油各四兩酒調服之

治顛傷骨折及血出者

用滑石甘草為末人參湯調服次用生姜自然汁一盞米
醋一盞獨核肥皂四個敲破按於姜汁米醋中紗片濾過
去渣入牛皮膠煎成膏藥貼之遍身者皆可

接骨散

沒藥

乳香各五分自然銅一兩煨淬

滑石

一兩

龍骨

三錢

赤石脂

三錢

麝香

一隻另研

右爲末好醋浸沒煮多爲上乾就炒燥爲度臨睡服時入麝香抄以茶匙罨舌上溫酒下分上下食前後服若骨已接尚痛云龍骨赤石脂而服多儘好極効

○世以自然銅爲接骨藥然此等方儘多大抵在補氣補血補土俗工惟在速効以罔利迎合病人之意而銅非煨不可服若新出火者其火毒金毒相扇挾香挾藥毒雖有接傷之功而燥散之禍甚於刀劒戒之

又方

冬瓜皮

阿膠

各等分

炒乾爲末以酒調飲醉爲度

附諸方

加味芎藭湯方三因治打撲傷損敗血流入胃脘嘔黑血如豆汁

當歸

白芍藥

芎藭

荊芥穗

百合

水浸半日等分

右吹咀每服四錢水一盞酒半同煎七分不拘時服

系金散

揚氏家藏

治打撲傷折內損肺肝嘔血不止或有瘀血

停積於內心腹脹悶

紫金藤皮

二兩

降真香

續斷

補骨脂

無名異

煨細酒淬七次

琥珀

別研

蒲黃

牛膝

酒浸

當歸

洗焙

桃仁

去皮尖各一兩

大黃

紙裹煨

朴硝

別研一兩半

右爲末每服二錢濃煎蘇木當歸酒調下并進三服利卽安

復元活血湯方板粹治從高墜下惡血留於脇下交疼痛不可忍

柴胡五錢 花粉 當歸各三錢 紅花 甘草各一錢

大黃酒浸一及 川山甲三錢炮 桃仁五十個酒浸研如泥

右咬咀每服一兩水一盞酒半盞加桃仁泥煎至八分服以

利爲度

當歸導滯散方聖惠治落馬墜車打撲傷瘀血大便不通浮腫痛

昏悶畜血內壅欲死

大黃一兩 當歸二錢半 麝香少許

右爲末每服三錢熱酒下和劑方只大黃當歸二味等分酒

調下或以酒煎服亦可

丹溪心法附錄
鷄鳴散 治從高墜下及木石壓傷瘀血凝積痛不可忍並以

此藥推陳致新

大黃 酒蒸一兩 桃仁 七粒去皮尖 當歸尾 五錢

右為末酒一碗煎去渣五更鷄鳴時服取下惡血即愈 若

氣絕不能言急以熱小便灌之即甦

奪命散 治刀外所傷及從高墜下木石壓損瘀血凝積心

腹疼痛大小便不通

大黃 黑牽牛 各二兩 紅蛭 用石灰慢火炒令乾黃色半兩

右為末每服二錢用煎酒調下約行四五里再熱酒調牽牛

末二錢崔之須下惡血成塊以盡為愈

已上諸方辛涼疎導瘀血之劑

花藥石散

和劑方治

一切金刃所傷打撲傷損身體出血者急

於傷處糝藥其血自化爲黃水如有內損血入臟腑熱煎童子小便入酒少許調一錢服之立効若牛舐腸出不損者急送入用細絲桑白皮尖茸爲線縫合肚皮縫上糝藥血止立活如无桑白皮用生麻縷亦得並不得封裹瘡口恐作膿血如瘡乾以津液潤之然後糝藥婦人產後敗血不盡惡血奔心胎死腹中胎衣不下並用童子小便調下

硫黃土色明淨者同凡搗爲粗末花藥石

一凡搗爲粗末

右二味相拌和勻先用紙筋和鹽泥固濟瓦罐子一個候泥乾入藥於內再用泥封口候乾安在四方磚石上書八卦五行字用炭一秤籠疊周圍自巳午時從下着火令漸火上徹

直至經宿火冷炭消又放經宿罐冷取出細研以細絹羅了
羅極細磁盒內盛依前法服

二藥降聖丹

和劑方治打撲閃肭筋斷骨折牽急疼痛不能屈

伸及榮衛虛弱外受遊風內傷經絡筋骨緩縱皮內刺痛肩
背拘急身軀倦怠四肢少力並皆治之

自然銅

火煨醋淬十二次研為末水飛

川烏頭

生去皮劑

骨碎補

煨去毛

白芍藥

沒藥

別研

乳香

別研

當歸

洗焙一錢

生乾地黄

川芎

各一錢半

右並生用為細末以生姜自然汁與蜜等分煉熟和丸每一
兩作四丸每服一丸槌碎水酒各半盞入蘘木少許同煎至
八分去蘘木熱服空心食前

打撲內損筋骨疼痛 本事方

沒藥

乳香

芍藥

川芎

川椒去目及閉口者

當歸各半兩自然銅三斤半炭火燒

右為末黃蠟二兩溶開入藥末不住手撻勻丸如彈子大每服一丸用好酒煎開乘熱服之隨痛處臥霎時連進有效

乳香定痛散

治打撲傷損落馬墜車一切疼痛

乳香

沒藥

川芎

白芷

芍藥

甘草

牡丹皮

生地黃

右為細末每服二錢溫酒并童子小便調不拘時服

沒藥乳香散御藥院方治打撲損傷痛不可忍著

白朮剉五兩當歸焙

白芷

沒藥別研