

臨證指南醫案卷九

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲全較

姪旦玉堂

調經

愁鬱氣血滯

張九經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從來不

生育由情懷少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而

脈絡間亦致間斷蒙痺例以通劑

此藥有火此味不宜

有音附此不必用

川芎

當歸

肉桂

生艾

小茴



臨證指南醫案目

卷九

調經

淋帶

崩漏

胎前

產後

癥瘕

熱入血室



臨證指南醫案卷九

許關李大瞻翰圃

古吳葉桂天士先生著 錫山華南田岫雲全較

姪旦玉堂

調經

愁鬱氣血滯

張九

經先期色變膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從來不

生育由情懷少歡悅多愁悶鬱則周行之氣血不通而

脈絡間亦致間斷蒙痺例以通劑

此藥有火此味不宜

有音附此不必用

川芎

當歸

肉桂

生艾

小茴



脈數者不宜用
桂枝建中湯為
脈遲而設仲景
有明證

後期
鬱傷久
嗽肺氣
虛

茯苓 生香附 南山楂 益母膏丸

姚二久嗽背寒晨汗右臥咳甚經事日遲脈如數而虛穀

減不欲食此情志鬱傷延成損怯非清寒肺藥所宜

黃芪 桂枝 白芍 炙草

南棗 飴糖

肺為氣出入之道內有所傷五臟之邪上逆於肺則
咳嗽此則久嗽背寒晨汗全是肺氣受傷而經事日
遲不但氣血不流行血枯肝閉可知而知脈數虛火
也虛則不可以清寒況穀減不欲食中氣之餒已甚
可復以苦寒損胃乎與黃芪建中損其肺者益其氣

肝犯胃

脾鬱傷肝

而桂枝白芍。非斂陰和血之妙品乎。

秦一氣衝心痛嘔涎氣墜少腹為瀉。經來後期其色或淡。

或紫。病在衝脈。從厥陰陽明兩治。

川連

小苟

川棟子

歸尾

炒半夏

茯苓

桂枝

橘紅

華二鬱傷肝脾。是因懷抱不暢。致氣血不和。逍遙散減白

朮加山查香附。不欲其守中。務在宣通氣血耳。今經來

日遲。鬱痺宜通。而氣弱不主統血。况春深泄氣之候。必

佐益氣之屬。方為合法。歸脾湯

又則向有鬱傷肝脾。用逍遙散歸脾湯甚合。今因動怒。少



腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷遂令昏迷此皆肝木拂逆甚則為厥夫肝臟相火內寄病來迅速皆動極之徵為肝用太過宜制其用前此芪朮守補不可用矣安胃理中丸去黃柏細辛

錢脈瀋腕悶減食經水來遲腹痛墜

柴胡此當用酒洗炒白芍黃芩鬱金

香附茯苓蘇梗神麴

又諸恙未減腹但痛不墜逍遙散去白朮甘草加鬱

金香附神麴

許十經閉寒熱便澹腹痛加味逍遙散去山梔

婦人全以血為主治法亦當以血為事

處處用柴胡而近日自附天土之門者云天土終身不用柴胡豈非夢境



血絡鬱
熱腹痛

奇脈虛
寒滯

某 血虛內熱。經不至。加味逍遙散去朮。

某

經遲腹痛風疹絡血不寧久鬱成熱法當通利

涼膈去芒硝加丹皮赤芍

孫

九 奇脈下損經遲腹痛先用當歸建中湯續商八脈治

法 歸建中湯

又

久嗽遇勞寒熱。歸芪建中去薑

謝

三 能食不運疲泄經事愆期少腹中乾涸而痛下焦麻

痺衝心嘔逆腹鳴心棘八脈奇經交病。

人參

茯苓

艾葉

製香附

淡薤蓉

淡骨脂

肉桂

當歸



鹿角霜

小茴香

紫石英

益母膏丸

王三脈右緩左瀋經水色淡後期嘔吐痰水食物畢加載餘不孕此久鬱凝痰滯氣務宜宣通從陽明厥陰方。

半夏

廣皮

茯苓

厚朴

茅朮

淡吳萸

小香附

山查肉

薑汁法丸

又

三月中用辛溫宣鬱方痰瘀自下胸次寬嘔逆緩今

喜暖食惡寒經遲至五十餘日來必色淡且少議用溫

養衝任栽培生氣方法八珍去朮草地加小茴肉桂

蘼艾香附紫石英河車膠丸

肝腎虛

朱二經水一月兩至或幾月不來五年來並不孕育下焦

肢體常冷是衝任脈損無有貯蓄煖益腎肝主之

人參

河車膠

熟地

砂仁製

歸身

白芍

川芎

香附

茯神

肉桂

艾炭

小茴

紫石英

益母膏丸

衝脈肝陰虛

程七十三三年不孕育其中幻病非一病人述經期遲至來

期預先三日周身筋骨脈絡牽掣凌楚不得舒展凡女

人月水諸絡之血必彙集血海而下血海者即衝脈也

男子藏精女子繫胞不孕經不調衝脈病也腹為陰陰

虛生熱肢背為陽陽虛生寒究竟全是產後不復之虛

損惑見病治病之悞有終身不育淹淹之累肝血陰虛
木火內寄古人溫養下焦必佐涼肝堅陰勿執經後期
為氣滯亂投破氣剛藥劫陰

尚當重用此藥

河車膠

生地

枸杞

沙苑

生杜仲

白薇

山查

黃柏

白花益母草

肝腎奇
脈陰虛

朱

經云陽維為病苦寒熱緣上年冰雪甚少冬失其藏

春半潮濕地氣升泄以肝腎血液久虧之質春生力淺

不必云脈只云衝任可也

八脈隸乎肝腎一身綱維八脈乏束固之司陰弱內熱

陽微外寒矣腎脊常痛經事愆期血海漸涸久延虛怯

情景已露局方逍遙散固女科聖藥大意重在肝脾二

經因鬱致損。木土交傷。氣血痺阻。和氣血之中。佐柴胡微升。以引少陽生氣。上中二焦之鬱勃。可使條暢。今則入暮病劇。天曉安然。顯是肝腎至陰損傷。八脈不為約束。故熱無汗。至陰深遠。古人謂陰病不得有汗也。當宗仲景甘藥之例。勿取氣辛助陽可矣。

炙甘草

阿膠

細生地

生白芍

麥冬

牡蠣

無汗不得用此

某陰虧內熱。經事愆期。

雄烏骨雞

小生地

阿膠

白芍

枸杞

天冬

茯苓

菟蔚子

女貞子

桂圓

陰虛



痛經
鬱傷氣
血滯

右十味用青蒿汁童便醇酒熬膏加蜜丸

張四
寒熱間日經來腹痛

高熱之藥古人凡員表症未有不先治其表者

小生地

丹皮

知母

花粉

生鼈甲

澤蘭

某十二
先腹痛而後經至氣滯為多晨泄腹鳴亦脾胃之病
與下焦瘕泄則異

川芎

當歸

香附

煨廣木香

查肉

茯苓

某六
寒熱無汗經先腹痛喉中燥癢咳逆食物不思此鬱
傷氣血八脈主病姑先與澤蘭湯

歸身

澤蘭

丹參

白芍

柏子仁

茯神

此方無著

周

十

室女經水不調先後非一來期必先腹痛較之平日

爲重飲食大減始於初夏入秋下焦常冷腹鳴忽瀉忽

結。究脈察色是居室易於鬱怒肝氣偏橫胃先受戕而

奇經衝任躋維諸脈皆肝胃屬隸脈不循序流行氣血

日加阻痺失治必結痕聚痞痞之累。

南山查

生香附

延胡

當歸

青皮

三稜

蓬朮

牛膝

川棟子

澤蘭

肉桂

炒小茴

葱白汁丸



顧經來筋掣腹痛。常有心痛乾嘔。此肝氣厥逆。衝任皆

病。務在宣通氣血。以調經溫燥。忌用自可得效。

川棟 一錢

丹皮 三錢

炒查 二錢

胡連 八分

延胡 一錢

澤蘭 二錢

歸鬚 二錢

生白芍 一錢半

又 柏子仁丸

吳 鬱傷絡脈痛經。

此衝任脈有寒

川芎

當歸

香附

小茴

烏藥

茯苓

紅棗

費

經水紫黑。來時嘈雜。脈絡收引而痛。經過帶下不斷。

形瘦日減。脈來右大左弱。上部火升。下焦冷徹。骨中陰

鮑魚海味也腥稔異常不堪入煎劑中欲藉以補陰豈本草中別無善藥此老不過一時弄巧以異欺人遂開後日庸醫炫竒立異之門取種種不堪入藥之物臚列成方以為獨開生面別授秘傳足徵廣博并示靈巧此風至今愈甚此老難辭作俑之

氣分熱

食酸氣血滯

陽乖違焉得孕育。問醫都以補血瀆劑。宜乎鮮效。議通

陽攝陰法。

宜用漏經法

鮑魚

內經用此別名

生地

淡蓯蓉

天冬

當歸

柏子仁

炒山查

牛膝

茯苓

紅棗斬艾湯法丸

朱

脈數右肩痛痿經不調。經來氣攻觸。皆性躁。氣分有

熱

細子芩

白芍

黑山梔

鈎藤

茯苓

當歸鬚

香附

菟蔚子

桑枝

李

酸瀝入裏。氣血呆鈍。痛自心胸。脹及少腹。昔經行三



各總之近且時
醫先未能識真
病症因不敢施
用經方反藉此
希奇怪誕之物
塞責一時明知
誤治轉可令人
無從斑駁耳是
以此風日甚而
荷葉邊豆殼螺
殼橘曰枇杷核
查核淡菜丑筋
一切神農本草
及方書所棄之
物收用不遺吁
此醫道之一變
也

經閉
木火鬱
熱

胃陽虛

日今四日猶未已為凝滯所致痛脹何疑讀內經遺意
以辛勝酸主治但辛氣最易入表當求其宣絡者宜

韭白汁

桃仁

延胡

小茴

當歸鬚

川棟子

王三苦辛泄降胸脘脹悶已舒此嗽血皆肝膽氣火上逆

必經來可安

南山查

桃仁

黑山梔

丹皮

橘葉

降香末

老韭白汁

朱

當節令呵欠煩倦秋深進食微有惡心病起至今月

事不來夫衝任血海皆屬陽明主司見症胃弱此陰柔

臍滯當停以理胃陽為務

人參

半夏麴

廣皮白

茯苓

生益智仁

煨薑

見寒症方可用

脾胃陽虛

某

脈數形疲咳經閉半年已經食減便溏浮腫無清嗽

通經之理扶持中土望其加穀四君子湯

款者不宜

胃陽不運

某

三經閉兩月腕痺嘔惡此氣窒不宜胃陽礙鈍使然當

用和中為主

半夏麴

老蘇梗

茯苓

廣皮

枳殼

川斛

濕滯腹痛瀉

某

夏令寒熱經阻少腹痛脹血結洞瀉不爽乃內傷氣