

醫學
質驗
義集

產科發蒙

三

醫學質驗五種產科發蒙四卷目錄

產後欬嗽第一

丹參湯

二母散

瓜蒌湯

旋覆花湯

產後寒戰交牙第二 二頁

附子湯

人參湯

奪命散

產後崩漏第三 三頁

膠艾湯

惜紅煎

獨黥散

瑞蓮散

產後兒枕痛第四 五頁

永類延胡索散
熊氏延胡索湯

四物加大黃湯
加味建中湯
加味通氣湯

產後發熱第五 六頁

七味益母飲
製尿尾法

產後飽悶第六 七頁

九聖飲
白丸子
指迷七氣湯

產後乳結痛第七 八頁

麥芽煎
玉露散

產後語言錯亂第八 九頁

黑龍丹

失笑散

產後嘔吐第九 九頁

半夏竹茹湯

產後淋疾第十 十頁

開閉煎

滑石散

石葦湯

緩疼煎

五聖飲

潤下飲

產後腫滿第十一 十二頁

橐吾飲

紫葳蘓木湯

澤蘭湯

禹翼湯

禹績湯

茯苓湯

集香湯

分心氣飲

琥珀湯

加味腎氣丸

加味六皮煎

產後玉門不閉第十二十六頁

石灰湯

治玉門不閉方 治陰戶突出方

孫一奎經驗方

產後口舌病第十三十七頁

當歸飲

間碧散

加味導痰湯

產後煩渴第十四十八頁

集驗括樓湯

聖惠白朮散

產後自汗盜汗第十五

十九頁

經効黃芪湯

黃耆建中湯

參附耆蠟湯

產後脇下疼痛第十六

二十頁

豁脇湯

枳殼煮散

當歸柴胡湯

柴胡疎肝散

補肝散

檳榔湯

產後大便閉結第十七

二十二頁

調道飲

桃核承氣湯

產後下利第十八

二十三頁

芍藥香附湯

茯苓建中湯

當歸湯

調中湯

神効參香散

產後遺尿第十九

二十四頁

鹿蠲飲

喬一方

桑螵蛸散

產後腹脹第二十

二十五頁

抵聖湯

忍冬飲

產後痿痺第二十一

二十六頁

健脚煎

續斷丸

思仙續斷圓

產後陰門腫痛第二十二

二十七頁

枳殼散

收傷油

六味熏洗方

失痛散

產後乳汁少第二十三

二十八頁

通乳煎

木通丸

胡桃散

玄素散

通乳瓢畜飲

產後目疾第二十四

三十頁

熟地黃湯

四物補肝湯

四製香附丸

芎藭湯

掃紅煎

產後蓐勞第二十五

三十二頁

人參驚甲散

三合散

加味四物湯

懷熟地湯

新定補元煎

竹葉湯

經効黃芪湯

麻黃根散

新定龍骨散

黃連日赤散二十四

桂枝湯續二十二

蘇合香丸

附片續

黃連日赤散二十三

六神丹

六神丹

六神丹

醫學實驗五種產科發蒙四卷

義集

紀州谷井敬英世昌

相州片倉元周深甫著門人上毛今村長順子正全校

相州伊達周禎子祥

○產後欬嗽第一

欬嗽之病雖其本不一皆是肺家病產後患之者宜先與
丹參湯功效尤勝若惡露下少而欬嗽不已者宜二母飲
嗽而牽引脇下臥則喘欬益甚者必有伏火瓜蒌湯加知
母黃芩各八分感風寒欬嗽喘滿痰涎壅盛者宜旋覆花

肺家執言肺持痰也

湯已試之驗

丹參湯

丹參 一錢

百部根

桔梗 各六分

百合

茯苓

各八分

五味子

五分

桑白皮

一錢

右以水二合煮取一合溫服

二母散

治產後惡露上攻咳嗽不已

知母

貝母

茯苓

人參

各五錢

桃仁

杏仁

並生去皮尖各一兩

右每服五錢水煎溫服

瓜蒌湯

赤水醫案

治產後咳嗽痰不易出左脇疼痛內熱氣壅

不能伏枕者

瓜蒌仁

六分

桑白皮

兼用

杏仁

煨

半夏

桔梗

太甚

紫蘇子

各一分

枳殼

各一分

右水煎溫服

旋覆花湯

治

產後傷風感寒暑濕欬嗽喘滿痰涎壅

盛坐臥不寧

旋覆花

湯

芍藥

五兩

前胡

二兩

半夏

一兩

甘草

二兩

五味子

四兩

荆芥

六兩

茯苓

五兩

杏仁

五兩

麻黃

各等分

右剉每服四錢水一盞半姜五片棗一枚煎至七分去

滓食前溫服

熊宗立云產後咳嗽此方最良元周以此法治若干人皆驗

○產後寒戰交牙第二

產後患寒戰交牙者其人瘀血不得下而發宜將折衝飲
行瘀煎之類點服獨行散一二匙若惡露下過多或難產
而用力太甚纔分娩而發者與還元煎疲勞甚者附子湯
人參湯之類宜擇用并兼用奪命散最妙

折衝飲

見產論

行瘀煎

見血暈

還元煎

見半產

附子湯聖濟

附子

人參

生薑

大棗

各等分

右水煎溫服

人參湯

人參二三錢

以水二盞煮取一盞溫服

奪命散

大全良方

治產後血暈血入心經語言顛倒健忘失志

宜及產後百病

與沒藥

血竭各等分

右細研為末纔產下便用童子小便細酒各半盞煎一

二沸調下二錢良久再服

○產後崩漏第三

產後惡血崩漏不止者當速施遏崩之術令產戶緊閉乃
與膠艾湯或惜紅煎兼用三聖散獨黥散之類若不_レ止者
宜還元煎凡血症用理血之劑而不效者非理氣之藥則
難收效不可不知也又收血理氣之藥並不效者却宜涼
血之劑三黃灸艾湯尤神效又古方有瑞蓮散實產後血
崩之神藥也

膠艾湯 一方加乾姜一兩

芍藥	阿膠	甘草	艾葉	當歸
		各二兩		各三兩

芍藥

四兩

乾地黃

六兩

右七味以水五升、清酒五升、合煮取三升、去滓內膠、令

消盡、溫服一升、日三服、不差更作。

惜紅煎治婦人經血不固崩漏不止及腸風下血等証。

白朮

山藥

炙甘草

地榆

續斷炒

芍藥

炒

五味子

荊芥

炒

烏梅

水一鍾半、煎七分、食遠服。○如火盛者、加黃連、黃芩、

獨黥散。此方不獨治經血不止、諸血用之悉驗。

蓮房不拘多少、燒存性、細末、每服一二錢、湯子送下。

過崩術

見產論翼

三聖散

見產前吐血

還元煎

見半產

瑞蓮散

治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮

百枚燒存性

棕櫚

燒存性

當歸

官桂

各十錢

檳榔

二枚

川芎

七錢半

鯉魚鱗

炒七錢半

右為細末每服三錢煨生姜酒調如未止更進一服

○產後兒枕痛第四

一名產枕痛一名血枕痛

產後臍下疼痛其痛一陳來而止復來者名曰兒枕痛此

瘀血將出而為痛者其實佳兆也然產訖則忽腹中空虛

是以產婦多不堪其痛宜用破血之劑行瘀煎獨行散延