

氏



乙酉年夏

國醫堂

方賓薰題



中醫大學
中醫大學圖書館版權所有

醫學三字經小引

童子入學塾師先授以三字經欲其便誦也識途也學醫之始未定先授何書如夫海茫
茫錯認半字羅經便入牛鬼蛇神之域余所以有三字經之刻也前曾托名葉天士取時
俗所推崇者以投時好然書中之奧旨悉本聖經經明而專家之技可廢謝退谷於註韓
書室得繕本惠書千餘言屬歸本名幸有同志今付梓而從其說而仍名經而不以為僭
者採集經文還之先聖海內諸君子可因此一字而共知所遵且可因此一字而不為余
之作

嘉慶九年歲次甲子人日陳念祖自題於南雅堂

凡例

一是書前曾託名葉天士今特收回。

一是書論證治法悉遵古訓絕無臆說浮談以時法列於前仲師法列於後由淺入深之
意也。

一坊刻萬病回春嵩崖尊生古今醫統東醫寶鑑等書所列病證不可謂不詳而臨時查

對。絕少符合。即有合處。亦不應驗。蓋以逐末而忘其本也。試觀內經難經傷寒論。金匱要略。每證只寥寥數語。何所不包。可知立言貴得其要也。此書如怔忡頭痛。歷節諸證。非遺之也。怔忡求之虛癆。頭痛有邪。求之傷寒無邪。求之眩暉。虛癆歷節。尋其屬風屬濕。屬虛而治之。所以寓活法也。

一學醫始基在於入門。入門正則始終皆正。入門錯則始終皆錯。是書闡明聖法為公門之準。不在詳備。若得其祕訣。未嘗不詳備也。有證見於此而治詳於彼者。有論此證而彼證合而並論者。有論彼證絕未明言此證。而即為此證之金鍼者。實無他訣。惟其熟而已。熟則生巧。自有左右逢原之妙。

一論中所列諸方。第三卷第四卷俱載弗遺。惟傷寒論金匱要畧方。非熟讀原文不能領會。此書偶有闕而未載者。欲人於原文中尋其妙義。闕之。即所以引之也。閱者鑒予之苦心焉。

一方後附論。或採前言。或錄一得。視諸書較見簡括。閱者自知。

醫學三字經目錄

目錄

醫學三字經 目錄 卷一

源流 中風 虛癆 咳嗽 瘰疾

痢疾 心痛 腹痛 胃痺 隔食

反胃 氣喘 血症 水腫 脹滿

卷二

蠱脹 暑症 泄瀉 眩暈 嘔吐
嘔逆

癲 狂 癪 五淋 瘰閉

渴病 遺精 痰氣 痰飲 消渴

傷寒 瘧疫 婦人 小兒

卷三

藥方

卷四

藥方

藥方

藥方

陰陽

識一字便可為醫說

臓腑十二官

肝說

肺說

脾說

腎說

膽說

三焦說

膀胱說

手心主說

命門說

絡經

說

運氣張飛疇運氣不足憑說

四診望色聞聲切脈

望色

聞聲

切脈



醫學三字經卷一

閩吳航陳念祖修園著

醫學源流第一

醫之始。本岐黃。

黃黃帝也。岐岐伯也。君臣問答以明經絡藏府運氣治療之原所以為醫之祖。雖神農本經在黃帝之前而神明用藥之理仍始於內經也。

靈樞作。素問詳。

靈樞九卷。素問九卷。通謂之內經。漢書藝文志載黃帝內經十八篇是也。醫門此書即業儒之五經也。

難經出。更洋洋。

洋洋盛大也。難經八十一章多闡發內經之旨以補內經所未言。卽間有與內經不合者其時去古未遠別有考據也。秦越人號

扁鵲戰國人
也。著難經
文而集其大成

越漢季。

有南陽。張機字仲景居南陽官長沙漢人也。著傷寒雜病論。金匱玉函經。

六經辨。

聖道彰。

內經詳於鍼灸至伊尹有湯液治病之法。扁鵲倉公因之。仲師出而雜病傷寒。耑以方藥為治。其方俱原本於神農黃帝相傳之經。

傷寒著。

金匱藏。

王肯堂謂傷寒論義理如神龍出沒首尾相顧鱗甲森然。金匱玉函示寶貴祕藏之意也。其方非南陽所自造乃上古聖人相傳之方所謂經方是也。其藥悉本於神農本經。非此方不能治此病。非此藥不能成此方所投必效。如桴鼓之相應。

垂方法。

立津梁。

仲師醫中之聖人也。儒者不能舍至聖之書而求道醫者。豈能外仲師之書以治療。

李唐後。有千金。

唐孫思邈華原人隱居太白山著千金方千金翼方各三十卷宋仁宗命高保衡林億校正後列禁經二卷今本分為九十三卷

金匱雖有浮泛偏雜之處而用意之專用藥之巧亦自成一家

外臺鑑。

重醫林。

唐王燾著外臺祕要四十卷分一千一百零四門論宗巢氏方多祕傳為醫門之類書

後作者。

漸浸淫。

足觀也已等而下之不

紅紫色。

鄭衛音。

間色亂正靡音忘倦

追東垣。

重脾胃。

金李果字明之號東垣老人生於世宗大定二十年金亡入元七年終年七十二舊本亦題元人作脾胃論辨惑論蘭室祕藏

人附以諸家合評
有東垣十書傳世

溫燥行。

升清氣。

如補中益氣及升陽散火之法如蒼朮白朮羌活獨活木香陳皮葛根之類最喜用之

雖未醇。

亦足貴。

人謂東垣用藥如韓信將兵多多益善然駁雜之處不可不知惟以脾胃為重故亦可取

若河間。

專主火。

金劉元素字守真河間人事蹟俱詳
金史方技傳主火之說始自河間

遵之經。

斷自我。

原病式十九條俱本內經至真要大論多以火立論而不能參透其經旨如火之平氣曰升明火之太過曰赫曦火之不及曰伏明其

虛實之辨若冰炭之反也

一二方。

奇而妥。

如六一散防風通聖散之類皆奇而不離於正也

丹溪出。

罕與傳。

元朱震亨字彥修號丹溪金華人其立方視諸家頗高一格

陰宜補。陽勿浮。

丹溪心法以補陰為主。謂陽常有餘，陰常不足。諸家俱辨其非。以人得天地之氣以生，有生之氣即是陽氣。精血皆其化生也。

雜病法。四字求。

謂氣血痰鬱是也。一切雜病只以此四字求之。氣用四君子湯。血用四物湯。痰用二陳湯。鬱用越鞠丸。參差互用各盡其妙。

若子和。主攻破。

張子和戴人書中所用多大黃芒硝牽牛芫花大戟。甘遂之類意在驅邪。邪去則正安。不可畏攻而養病。

中病良。勿太過。

子和之法實症自不可廢。然亦宜中病而即止。若太過則元氣隨邪氣而俱散。挽無及矣。

四大家。聲名噪。

劉河間、張子和、李東垣、朱丹溪為金元四大家。張氏醫通之考核不誤。

必讀書。錯名號。

李士材醫宗必讀。四大家論以張為張仲景。誤也。仲景為醫中之聖。三子豈可與之並論。

明以後。須酌量。

言醫書充棟汗牛。可以博覽之。以廣見識。非謂諸家所著皆善本也。

詳而備。王肯堂。

金壇王宇泰諱肯堂著證治準繩。雖無所採擇。亦醫林之備考也。

薛氏按。說騎牆。

明薛己號立齋吳縣人著薛氏醫按十六種。大抵以四君子六君子逍遙散歸脾湯。六八味丸主治語多騎牆。

士材說。守其常。

李中梓號士材國朝人也。著醫宗必讀。士材三書。雖曰淺率。却是守常初學者所不廢也。

景岳出。著新方。

明張介賓字會卿號景岳山陰人著類經質疑錄全書所用之方。不外新方八陣。其實不足以名方。古聖人明造化之機。探陰陽之方。

本製出一衣。非可以思議。及者若僅以熟地補陰。人參補陽。
薑附桂寒芩連除熱隨拈幾味皆可名方何必定為某方乎。

石頑續。溫補鄉。

張璐字路玉號石頑。國朝人也。著醫通立論。多本景岳以溫補為主。

獻可論 合二張

明寧波趙獻可號養葵著醫貴大旨重於命門與張石頑張景岳之法相同

診脈法 濱湖昂

明李時珍字東壁號濱湖著本草綱目五十二卷雜收諸說反亂神農本經之旨卷末刻脈學頗佳今醫多宗之

數子者 各一長

知其所長擇而從之

長沙室 尚彷徨

數子雖曰私淑長沙升堂有人而入室者少矣

惟韻伯 能憲章

慈溪柯琴字韻伯國朝人著傷寒論註論翼大有功於仲景而內經之旨賴之以彰

徐尤著 本喻昌

徐樹號忠可尤怡號在涇二公金匱之註俱本喻嘉言名昌江西南昌人崇禎中以選舉入都卒無所就遂專務於醫務尚

律頤能闡發金匱之祕旨

大作者 推錢唐

張志聰號隱菴高世栻號士宗俱浙江錢塘人也國朝康熙間二公同時學醫與時不合遂閉門著書以為傳道之計所註內經

未發為漢後第一書今醫畏其難而不敢談及

取法上 得慈航

取法乎上僅得其中切不可以醫方集解本草備要醫宗必讀萬病回春本草綱目東醫寶鑑馮氏錦囊景岳全書薛氏醫按等書

為捷徑也今之醫輩於此書並未寓目止取數十種庸陋之方冀圖幸中更不足論也

中風第二

人百病 首中風

內經云風為百病之長也昔醫云中臟多滯九竅有脣緩失音耳聾目聾鼻塞便難之症中腑多著四肢中經則口眼喎斜中血脉則半身不遂

驟然得。

八方通。

中風病驟然昏倒不省人事或瘓湧掣搐偏枯等症八方者謂東西南北東北西北東南西南也

開與脫。

大不同。

屬虛寒則風水相遭寒水徹骨而風為寒風矣。熱風多見閉症宜疏通為先寒風多見脫症宜溫補為急

開邪閉。

續命雄。

小續命湯風症中之雄師也依六經見症加減治之。耑主驅邪

開其壅滯之痰如稀涎散滌痰湯是也

回氣脫。

參附功。

脫者宜固參附湯固守腎氣尤附湯固守脾氣者附湯固守衛氣歸附湯固守榮氣先回其氣次治其風若三生飲一兩加人參一

兩則為標本並治之法。正虛邪盛必遵此法。

顧其名。

思其義。

名之曰風明言八方之風也名之曰中明言風自外入也後人議論穿鑿俱不可從

若舍風。

非其治。

既名中風則不可舍風而別治也

火氣疾。

三子備。

劉河間舉五志過極動火而卒中皆因熱甚故主乎火大法用防風通聖散之類亦有引火歸源如地黃飲子之類李東垣以元氣不足而邪湊之令人卒倒如風狀故主乎氣虛大法補中益氣湯加減朱丹溪以東南氣溫多濕有病風者非風也由濕生痰痰生熱熱生風故主乎濕大法以二陳湯加蒼朮白朮竹瀝

薑汁之類

不為中。

名為類。

中者自外而入於內也此三者既非外來之風則不可仍名為中時賢名為類中風

合而言。小家伎。

虞天民云古人論中風言其證也三子論中風言其因也蓋因氣因濕因火挾風而作何嘗有真中類中之分

瘡喝斜。昏仆地。

瘡者不能言也喝斜者口眼不正也昏仆地者不省人事猝倒於地也口開目合或上視撒手遺尿鼾睡汗出如油者不治

急救先。柔潤次。

柔潤熄風為治中風之祕法喻嘉言加味六君子湯資壽解語湯甚妙

填竅方。宗金匱。

內經云邪害空竅全匱中有侯氏黑散風引湯驅風之中兼填空竅空竅滿則內而舊邪不能容外而新風不復入矣喻嘉言曰仲

景取藥積腹中不下填竅以熄風後人不知此義每欲開竅以出其風究竟竅空而風愈熾長此安窮哉三化湯愈風湯大秦艽湯皆出機要方中云是通真子所撰不知其

姓名然則無名下士煽亂後人見聞非所謂一盲引眾盲耶

虛癆第三

虛癆病。從何起。

欬嗽吐血五心煩熱目花耳鳴口爛鼻乾氣急食不知味羸瘦驚悸夢遺往來寒熱急墮嗜卧疲倦骨蒸不寐女子不月等症皆成癆病

七情傷。上損是。

扁鵲謂損其陽自上而下一損肺二損心三損胃過於胃則不可治其說本於內經二陽之病發心脾有不得隱曲為女子不月

按心脾上也至不得隱曲女子不月則上極而下矣

歸脾湯。二陽旨。

卽內經二陽之病發心脾之旨也此方為養神法六味丸為補精法高鼓峯並用之

下損由。房帷通。

扁鵲謂損其陰自下而上一損腎二損肝三損脾過於脾則不可治其說本於內經五藏主藏精也不可傷傷則失守而無氣無氣

則死矣

按精生於五藏而統司於腎如色慾過度則積傷而下損至於失守無氣則下極而上矣

傷元陽。

虧腎水。

腎氣即元陽也。元陽傷為困倦食少。便溏。腰痛。陽痿等症。腎水即元陰也。元陰虧為蒸熱。咳嗽。吐血。便血。遺精。喉痛。口瘡。齒牙浮動等症。

腎水虧。

六味擬。

六味地黃丸為補腎水之主方。景岳左歸飲。右歸丸亦妙。推之三才湯。八仙長壽丸。都氣丸。天王補心丹。皆可因證互服。

元陽傷。

八味使。

崖氏腎氣丸。後人名八味地黃丸。立方之意。原為煖腎逐水。非補養元陽。明薛立齋及趙養葵始用以補溫命穴。時醫遂奉為溫補。

腎命之主方。景岳右歸丸。皆本諸此。如火未大衰者。以還少丹代之。陽虛極者。宜近效白朮湯。

各醫書。

伎止此。

苦寒敗胃。及辛熱耗陰。固無論已。即六味歸脾。何嘗非流俗之套法耶。

甘藥調。

四生理。

扁鵲云。針藥莫治者。調以甘藥。仲景因之。喻嘉言云。壽命之本。積精自剛。然精生於穀。穀入少則不能生血。血少則不能化精。猶經云。精不足者。補以味。而節其發。則積貯漸富。大命不傾。

建中湯。

金匱軌。

小建中湯。及加黃耆。加人參。加當歸。加白朮等湯。皆急建其中氣。俾飲食增而津液旺。以至充血生精。而復其真陰之不足。但用稼

稿作甘。之本味。而酸辛苦鹹。在所不用。蓋舍此別無良法也。按災甘草湯。即此湯化為潤劑。喻氏清燥湯。即此湯化為涼劑。

薯蕷丸。

風氣弭。

金匱薯蕷丸。自註云。治虛勞諸不足。風氣百疾。

麤蟲丸。

乾血以。

金匱大黃麤蟲丸。自註治勞諸傷。內有乾血。肌膚甲錯。

二神方。

能起死。

尤在涇云。風氣不去。則足以賊正氣而生長不榮。以薯蕷丸為要方。乾血不去。則足以留新血。而灌漑不周。以麤蟲丸為上劑。今之



咳嗽第四

氣上喎。咳嗽生。

內經云五臟六腑皆令人咳不獨肺也然肺為氣之市諸氣上逆於肺則喎而咳是咳嗽不止於肺而亦不離於肺也

肺最重。

胃非輕。

內經雖分五臟諸咳而所尤重者在聚於胃關於肺六字蓋胃中

熱氣而化為痰隨寒氣而化為飲胃中既為痰飲

所滯則輸肺之氣亦必不清而為諸欬之患矣

肺如鐘。撞則鳴。

肺為臟腑之華蓋呼之則虛吸之則滿只受得本然之正氣受不得外來之客氣客氣干之則喎而咳矣亦只受得臟腑之清氣受

氣濁氣干之亦喎而咳矣肺體屬金譬若鐘然一外一內皆所以撞之使鳴也

風寒入。外撞鳴。

經云微寒微咳可見咳嗽多因於風寒也風從皮毛而入於肺寒從背俞而入於肺背主半外也後註雖言熱言濕言燥令不自行亦

必假風寒以
為之帥也

癆損積。

內撞鳴。

癆傷咳嗽主於內也二
者不治

誰治外。六安行。

六安煎。

冬時先傷非節之暖復加風寒外過以致咳嗽痰結咽腫身重自

汗脈浮者風熱也宜萎蕤湯辛潤之劑切勿辛熱發散而風燥一症辨治尤難蓋燥

為秋氣令不獨行必假風寒之威而令乃振欬乃發也內經只言秋傷於濕何也以長

夏受濕土鬱蒸之氣隨秋令收斂伏於肺腎之間直待秋深燥令大行與濕不能相容至冬而為

欬嗽也此症有肺燥胃濕兩難分離之勢惟全參門湯五味子湯獨得其祕後人以

出棄之昧之甚也

欬散不分燥潤雜

誰治內。虛癆程。

宜於虛癆門擇其對症之方。審是房勞傷精則補積審是思鬱傷脾則養神。

挾水氣。

小龍平。

柯韻伯治咳嗽不論冬夏不拘淺深但是寒嗽俱用小青龍湯。方中驅風散寒解肌逐水利肺緩腎除痰定喘攘除安內各盡其效。蓋以肺家有沉寒痼冷非麻黃大將不能搗其巢穴羣藥安能奏效也。

兼鬱火。

小柴清。

寒熱往來咳嗽者宜去人參大棗生薑加乾薑五味治之。

薑細味。

一齊烹。

金匱治痰飲咳嗽不外小青龍湯加減。方中諸味皆可去取惟細辛乾薑五味不肯輕去即面熱如醉加大黃以清胃熱及加石膏。

杏仁之類總不去此三味學者可不深思其故也徐忠可金匱辨註有論。

長沙法。細而精。

金匱痰飲咳嗽治法宜熟讀之。

瘧疾第五

瘧為病。

屬少陽。

少陽為半表半裏邪居其界入於陰爭則寒出於陽爭則熱爭則病作息則病止後其邪仍據於少陽之經。

寒與熱。

若迴翔。

寒熱必應期而至。

日一發。亦無傷。

邪淺則一日一作邪深則二日一作。

三日作。

勢猖狂。

瘧三日一作時醫名三陰瘧流連難愈。

治之法。

小柴方。

以小柴胡湯為主初起俗忌人參姑從俗而去之加青皮一錢。

熱偏盛。

加清涼。

小柴胡湯加知母花粉石膏黃連之類隨宜擇用。

寒偏重。

加桂薑。

加乾薑桂枝甚者加附子肉桂。

邪氣盛。

去參良。

身熱者。小柴胡湯去人參。加桂枝。
二錢服後食熱粥。溫覆取微汗。

常山入。

力倍強。

知常山非截邪之品。乃驅邪外出之品。仲景用其苗名曰蜀漆。
虛人久瘧不愈。以人參一兩生薑五錢。水煎五更服。
極效。貧者以白朮一兩代之。熱多者以當歸代之。

單寒牡。

理中匡。

單寒無熱名曰牡瘧。宜附
子理中湯加柴胡治之。

單熱癰。

白虎詳。

單熱無寒名曰癰瘡。或先熱後寒。名曰熱瘡。俱宜以白虎湯加桂枝治之。時醫以六味湯加柴胡芍藥治之。

法外法。

辨微芒。

已上皆前醫之成法。更法
外有法。不可不辨而治之。

消陰翳。

制陽光。

熱之不熱是無火也。益火之原以消陰翳。
寒之不寒是無水也。壯水之主以制陽光。

太僕註。

慎勿忘。

王太僕消陰制陽等証千古不刊之論。趙養葵遵之以八味丸。益火之源。六味丸。壯水之主。久瘧多以此法收功。

病症第六

濕熱傷。

赤白痢。

王損菴論痢。車主濕熱。其症裏急後重腹痛。
便不便是。膿血穢濁。或白或赤。或赤白相半。

熱勝濕。

赤痢清。

胃為多氣多血之海。熱陽邪也。熱勝於濕。則傷胃之血分而為赤痢。

濕勝熱。

白痢墜。

渴陰邪也。濕勝於熱。則傷胃之氣分而為白痢。赤白相半。則為氣血兩傷。

調行箴。

須切記。

行血則膿血自愈。調氣則後重自除。
此四句為治初痢之格言。須切記之。

芍藥湯。

熱盛餌。

芍藥湯調氣行血。雖為初
病之總方。究竟宜於熱症。

平胃加。

寒濕試。

寒濕濁病初起者。以平胃散加乾薑澤瀉。
猪苓木香治之。久而不愈。送下香連丸。

熱不休。

死不治。

方書云。病症發
熱不休者不治。

痢門方。

皆所忌。

凡病症初起。即發熱。非肌表有邪。即經絡不和。溫散而調衛。外邪一解。病亦鬆去。若概以為熱。閉手即用痢門套。多有陷入變劇者。

桂葛投。

鼓邪出。

時醫有發汗之戒。以其無外證而妄汗之也。若頭痛發熱。惡寒。有汗。宜用桂枝湯法。無汗。宜用葛根湯法。鼓邪外出。然後治其病。

外疏通。

內暢遂。

此二句是解所以發汗之故也。張飛疇云。當歸四逆湯治痢極效。若發熱而嘔者。小柴胡湯。葛根黃連黃芩甘草湯。口渴下重者。白頭翁湯。如確。

嘉言書。

獨得闕。

喻嘉言醫門法律
中議論甚見透徹

寓意存。

補金匱。

喻嘉言寓意草中。如麻黃附子細辛湯。及
人參敗毒散等案。却能補金匱所未及。

心腹痛胸痺第七

心胃疼。

有九種。

真心痛不治。今所云心痛者。皆心胞
絡及胃脘痛也。共有九種。宜細辨之。

辨虛實。

明輕重。

虛者喜按。得食則止。脈無力。實者拒
按。得食愈痛。脈有力。二主各有輕重。

痛不通。

氣血壅。

痛則不通。氣
血壅滯也。

通不痛。

調和奉。

通則不痛。氣血調和也。高士宗云。通之之法。各有不同。調氣以
和血。調血以和氣。通也。上逆者使之下行。中結者使之旁達。亦通。

也虛者助之使通寒者溫之使通無非
通之之法也若必以下洩為通則妄矣

一蟲痛。烏梅圓。

蟲痛時痛時止唇舌上有白花點得食
愈痛蟲為厥陰風木之化宜烏梅丸

二注痛。蘇合研。

入山林古廟及見非常之物脈乍大乍
小兩手若出兩人宜蘇合丸研而灌之

三氣痛。香蘇專。

因大怒及七情之氣作痛宜香蘇飲加元胡索二錢
七氣湯亦妙又方用百合一兩烏藥三錢水煎服

四血痛。失笑先。

瘀血作痛痛如刀割或有積塊脈
濤大便黑宜桃仁承氣湯失笑散

五悸痛。妙香詮。

悸痛卽虛痛也痛有作止喜按得食稍止脈
虛弱宜妙香散或理中湯加肉桂木香主之

六食痛。平胃煎。

食積而痛嗳腐吞酸其痛有一條杠起者宜平胃散加山楂穀芽主
之傷酒再加葛根三錢砂仁一錢然新傷吐之久傷下之為正法

七飲痛。二陳咽。

停飲作痛時吐清水或脇下有水聲宜二陳湯
加白朮澤瀉主之甚者十棗湯之類亦可暫服

八冷痛。理中全。

冷痛身涼脈細口中和宜理中湯加附
子內桂主之兼嘔者吳茱萸湯主之

九熱痛。金鈴瘡。

熱痛身熱脈數口中熱宜金鈴子元胡索各二兩研末黃酒送下二
錢名金鈴子散甚效如熱甚者用黃連梔子之類入生薑汁治之

腹中痛。照諸篇。

臍上屬太陰中臍屬少陰臍下屬厥陰兩腸屬少陽
厥陰之交界地面宜分治之然其大意與上相同

金匱法。可回天。

金匱要略中諸議論皆死症求生之法

諸方論。要拳拳。

中庸云則拳拳服膺而弗失之矣。腹滿痛而下利者虛也吐瀉而
痛太陰症也宜理中湯雷鳴切痛嘔吐者寒氣也宜附子粳米湯。

此以下利而知其虛也。腹滿痛而大便閉者實也。閉痛而不發熱者宜厚朴三物湯。專攻其裏閉痛而兼發熱者宜厚朴七物湯。兼通表裏閉痛發熱。痛連腸下。脈緊弦者宜大黃附子湯。溫下並行。此以便閉而知其實也。若繞脣疼痛。名寒疝。烏頭煎之峻。不敢遽用。而當歸生薑羊肉湯之妙。更不可不講也。

又胸痺。非偶然。胸膺之上。人身之太空也。

宗氣積於此。非偶然也。

薤白酒。

妙轉旋。

括囊薤白酒湯或加半夏或加枳實薤白桂枝湯之類皆轉旋妙用。

虛寒者。建中填。

心胸大寒痛嘔不能飲食。寒氣上衝有頭足不可觸近。立大建中湯主之。上中二焦為寒邪所痺。故以參薑啟上焦之陽合飴糖以

建立中氣而又加椒桂之下行降逆。上之氣復下焦之陽為補藥主方。

隔食反胃第八

隔食病。

津液乾。

方書名膈脊以病在膈上是也。又名隔脊以食物不下而阻隔也。津液乾枯為隔食病源。

胃脘閉。

穀食難。

胃脘乾枯閉小水飲可行。食物難下。

時賢法。

左歸餐。

趙養葵用大劑六味湯主之。高鼓峯仿趙養葵之法。以六味加生地當歸主之。楊乘六用左歸飲去茯苓加當歸生地。以左歸飲中其旁流注入坎。不如專顧陽明之速效也。

胃陰展。

資門寬。

如膏如脂疊積胃底。即胃陰也。久隔之人。則胃陰亡矣。高鼓峰云。則食物入在下之幽門闢門滋潤。則二便不閉。而隔症愈矣。