



中華民國十九年五月再版

版權  
所有

藥用植物圖考中裝六冊

定價大洋兩元

編輯者 東陽王適聲

藥用植物圖考

藥用植物圖考卷六

東陽王適聲編

眼子菜科

眼子菜 眼子菜屬生於池塘淺處及水田中多年生雜草根



着生於水底土中其在水面之葉革質橢圓形上面深綠色有光澤下面暗紫色葉脈並行十五條乃至十九條葉柄甚長在水中之葉狹披針形夏日葉腋出花軸長二三

寸梢上綴以多花呈穗狀帶綠色

效用 漢藥實驗談民間用為解毒藥民間治療法酒中毒煎

眼子菜鯉及禽獸肉之中毒用水煎眼子菜多飲其汁

解毒酒毒禽  
獸魚毒

# 梭櫚科

梭櫚

梭櫚屬栽培於園圃常綠喬木莖圓柱形無枝在周圍



之全面留有舊葉柄之基脚部徑四寸至八寸高三四寸有雄株與雌株之別葉叢生莖頂柄甚長掌狀分裂開向四面花小淡黃色集生於分枝之花軸上由苞以包被

之其苞大而淡黃雄花形如粟粒雌花結實呈核果狀似豌豆大葉柄之基部有毛包莖稱為梭毛頗強韌能耐水濕適於製繩帚蓑衣等

效用 筍及子花苦瀉平無毒陳藏器云有小毒戟人喉未可

止瀉痢腸  
風金瘡疥  
癬

治蛇蟲  
痛

輕服主治瀉腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血 皮氣味同子  
大明本草主止鼻衄吐血破癥治腸風赤白痢崩中帶下燒存  
性用 李珣主治金瘡疥癬生肌止血  
省藤 產於亞細亞熱帶地方常綠木本有刺其數甚多莖細



而頗長倚於他大木上得以上升  
有長至數百尺者但其周圍不過  
四五寸而已葉大長六尺許羽狀  
複葉自許多小葉成此植物之莖  
用以編椅子及籃等又供其他種  
種之用

效用 植物名實圖考長編云苦平無毒主治蛇蟲煮汁服之

又主齒痛打碎口中含之又取和米煮粥飼狗去癩


藥用植物圖考 卷六

二

除痰辟殺  
三蟲濕痢  
後重心腹  
諸痛

檳榔子

檳榔子屬東印度原產木本高三十尺許葉為羽狀



複葉小葉之上端其形狀宛如嚼而斷之者此植物之幹似椰子而細每一幹有三四穗每一穗上結實三四百顆其果實於健胃利尿有效外又可以強齒在東印度馬

來半島之土人則將果實切細色於胡椒類之葉中時時啗之與嚼烟草相似故土人之口中如血鮮紅色齒呈黑色云


效用 味苦辛溫澀無毒別錄主消穀逐水除痰辟殺三蟲伏尺寸白 時珍治瀉痢後重心腹諸痛大小便氣秘痰氣喘急

療諸瘧藥瘴瘍

椰子

椰子屬亞非利加及東印度原產熱帶各地皆有之常

綠喬木幹高五丈至十丈許周圍三尺以內葉大羽狀分裂叢



生於樹幹之頂上花單性雌雄同株果實每年生數十枚長形有三稜長八九寸徑四五寸此植物在熱帶為重要之品物其木材堅牢美麗供建築及器具之用樹液含多量之糖分用以釀酒葉供屋頂及其他用果皮外圍所採之纖維甚強韌適於作網果皮內圍之一層甚堅牢可代玻璃杯用在此層之內圍有堅胚乳含有多量之油此油為蠟燭及石礮之原料或供藥用其堅胚乳之內部有汁液如乳樣者為土人重要之食品也又此植物隨所產之地分為數種有南洋椰子錫蘭椰子西貢椰子鳳凰椰子帝王椰子等

吐血水腫  
鼻衄吐逆

楊梅瘡筋  
骨痛

效用 椰子瓢甘平無毒開寶本草主治益氣時珍食之不飢  
令人面澤 椰子漿甘溫無毒開寶本草止消渴塗頭益髮令  
黑李珣云治吐血水腫去風熱 椰子皮苦平無毒開寶本草  
止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁飲之時珍治卒心痛燒存性研末  
以新汲水服一錢極驗 殼時珍主治楊梅瘡筋骨痛燒存性  
臨時炒熟以滾酒泡服二三錢暖覆取汗其痛即止神驗



枕椰子 生於亞西亞之暖地與  
椰子相似木本高至四十尺許葉  
羽葉複葉自許多小葉成小葉細  
而長花小單性雌雄同株其肉穗  
花序之汁液可製砂糖又自幹之  
髓部採取澱粉葉柄之纖維有用

破宿血補  
益虛羸

除痰嗽補  
虛損

以作繩者

效用 子苦平無毒開寶本草主破宿血 麴甘平無毒李珣云作餅炙食腹美令人不飢補益虛羸損乏腰脚無力久服輕

身辟穀

無漏子

一名海棗

無漏子屬南方草木狀海棗樹身無間枝直聳



三四十尺樹頂四面共生十餘枝葉如栴櫚五年一實實甚大如栝盤兩頭不尖雙卷而圓其味甚甘美安邑御棗無以加也

效用

本草拾遺味甘溫無毒

主溫中益氣除痰嗽補虛損好顏色令人肥健生波斯國如棗

一云波斯棗

治心腹卒  
痛補心色  
路之血

麒麟竭

蘇頌曰今南番諸國及廣州皆出之木高數丈婆娑



可愛葉似櫻桃而有三角其脂液從  
木中流出滴下如膠飴狀久而堅凝  
乃成竭赤故又名血竭作血色采無  
時

效用 味甘鹹平無毒唐本草主治心腹卒痛金瘡出血破積  
血止痛生肌去五臟邪氣 李珣云傷折打損一切疼痛血氣  
攪刺內傷血聚補虛並宜酒服 補心包絡肝血不足并益陽  
精消陰滯氣

### 香蒲科

香蒲 香蒲屬生於池沼中多年生草本高至五六尺葉細長  
而尖闊約五分許有平行脈花單性花序圓柱狀雌花在其下

治五臟心  
下邪氣



部雄花在其上部此雄花所成之  
部與雌花所成之部互相接近其  
形狀與水燭同惟水燭葉長而較  
香蒲細雄花所成之部與雌花所  
成之部大相隔離故有差別為觀  
賞之用其葉作席與繩等雌花成  
熟之穗灌以油可代蠟燭之用又雌花成熟者裂為火線嫩莖

與葉供食用

效用 本草經味甘平主治五臟心下邪氣口中爛臭堅齒明目聰耳久服輕身耐老


### 浮萍科

水萍 水萍屬浮生於水塘或池沼等渌水之面上一年生水

藥用植物圖考 卷六

五

日赤翳膜  
口舌生瘡  
吐血癰風  
丹毒



草其植物扁平倒卵形上面綠色下帶紫赤色其根為無枝之纖維於植物體之下面叢生數條以孢子繁殖發生頗速

效用 本草經味辛寒主暴熱身痒下水氣勝酒長鬚髮止消

渴久服輕身

別錄下氣以沐浴生毛髮

時珍主治風濕麻

痺脚氣打撲損傷目赤翳膜口舌生瘡吐血

紫背浮萍焙半兩黃芪炙二錢半每

服一錢薑水調下血吹之

癰風丹毒又治惡疾遍身瘡者取水中

浮萍濃煎汁漬浴半日多效此方甚奇驗也

萍田字

蘋屬生於水田或淺水中多年生草本莖葉軟細長

匍匐於泥下莖之上方抽出長葉柄其頂端輪生四小葉片狀

塗熱瘡治  
蛇傷



若田字故名其下生變形之  
根狀體夏秋之候葉柄下部特  
歧出小枝着生囊狀體質堅如  
豆二枚或二枚以上孢子着生  
於囊狀體中

效用 味甘寒滑無毒吳普主治暴熱下水氣利小便 陳藏  
器云搗塗熱瘡搗汁飲治蛇傷毒入腹內曝乾枯樓等分為末  
人乳和丸服止消渴

### 天南星科

蒟蒻 蒟蒻屬栽培於園圃中多年生草本高至三尺餘掌狀  
複葉由各羽狀之裂片而成葉脈呈網狀葉柄長五月開單性  
花為肉質穗狀花序頗長有苞頗大名曰佛燄其地下球狀部  
藥用植物圖考 卷六

治癰腫風  
毒并治肥  
癰



療百物不忌見鄰家脩葺藥求食之美遂多食而療愈又有患肥癰者數人多食之亦皆愈

半夏

半夏屬生於平野

金華為多年生有毒草本莖高七八寸地下有塊莖如球形由此抽一莖或數莖莖頂著葉自三小

葉而成複葉有網狀脈葉柄生肉芽開單性花肉穗花序花軸甚長雄花位於上部雌花位於下部外有大苞片包圍名曰佛焰花軸之長部突出於苞外如線狀

味最發製為褐腐可供食用製為粉末供輕汽球及空汽枕之塗料以防氣體洩漏

效用 開寶本草莖頭辛寒有毒主治癰腫風毒摩敷腫上其

塊莖亦可敷癰毒按三元延壽書云有人患

消痰開胃  
健脾止嘔  
腫

白芎

白芎屬

亦作石  
芎屬

生於池

塘邊多年生草本有長根莖橫

卧地中節節生鬚根其全部具  
特殊之香氣葉狹扁如劍狀有  
平行脈長三四尺其與石芎異  
者石芎葉較細無中肋白芎  
葉較闊中肋甚明瞭是也夏月  
自葉腋出花軸開淡黃色小花



為肉穗花序。

效用 俗於端陽節將此植物之葉插於檐前以禦疫癘其根莖製香味料或用於健胃藥。

芋 芋屬栽培於田野多年生草本四月下種抽苗至秋即成熟可食高至四五尺其塊莖



多肉埋存於地下內含澱粉甚多葉大具長柄色綠狀如短箭秋自葉腋伸出花軸開單性花肉穗花序外包大苞如佛焰雄花集生花軸上

部雌花生於下部此地下莖供食用葉飼家畜

效用 芋子辛平滑有小毒別錄主治寬胸胃充肌膚滑中

傳蛇虫咬  
癰腫毒痛

大明本草破宿血去死肌和魚煎食甚下氣調中補虛  
辛冷滑無毒大明本草除煩止瀉療妊婦心煩迷悶胎動不安  
又鹽研傳蛇虫咬癰腫毒痛及署毒箭  
虎掌 天南星屬生於山野中多年生草本高至二三尺葉有



長柄掌狀分裂花與天南星相類  
似惟虎掌之肉穗花序上部甚延  
長成為纖維狀黑紫色天南星之  
肉穗花序上部不延長而有鈍頭  
是其異也此植物有毒圖經本草  
曰虎掌初生根如豆大漸長大似

半夏而扁累年者其根圓及寸大者如雞卵周匝生圓芽二三  
枚或五六枚三四月生苗高尺餘獨莖上有葉如爪五六出分  
藥用植物圖考 卷六