

大字
足本
陳修園醫書四十八種

三星書店發行

S29.42/46-2

1756

178

省中醫學會藏

編號 11-187 $\frac{8}{24}$



醫學從衆錄卷五

閩吳航陳念祖修園甫著

次男元屏靈石參訂

膈症反胃

膈者阻隔不通。不能納穀之謂也。又謂之隔食。病在胸膈之間也。上焦出胃上口主納中焦並胃中主腐化。下焦別迴腸主濟泌。此症三焦失職百無一生。丹溪指為胃脘乾枯以四物湯入牛羊乳竹瀝韭汁之類主之。薛氏指為佛鬱傷肝。肝木剋土以左金丸逍遙散六君子湯歸脾湯六味丸八味丸之類。隨症間服。易思蘭本此法以治氣膈。晨吞八味丸百粒。暮服暢衛湯。開導其上。滋補其下。多效。趙氏以此病多得之五旬以上。腎水既乾。陽火偏盛。煎熬津液。三陽熱結。則前後閉滯。下既不通。必反於上。直犯清道。上冲吸門。須以六味丸料大劑煎飲。久服可挽十中之一二。然以余觀之。隔症既成。終無治法。問曰。既無治法。豈真坐視其亡耶。修園曰。即欲服藥。亦不過盡人事而已。吾鄉老醫某。只守程氏啟膈飲一湯。始服頗效。久亦增病。然而痰火鬱氣阻逆於上者。亦藉為引導也。已任篇專取陽明。以左歸飲加生地當歸。亦所以開賁門。此門開則能納食幽門。此門開則小便利闌門。此門開則大便潤之法也。此數方之意。皆仿於仲景大半夏湯用甘瀾蜜水之法。而不知仲景取半夏以升降陰陽。藉人參以重生津液。復得蜜之滋潤。灌溉流通。而阻隔之憲乃免。程氏以半夏耗液為禁。豈知仲景麥門冬湯及此方之微旨哉。張石頑云。古人指噎膈為津液乾枯。故

水液可行。乾物梗塞。為枯在上焦。余竊疑之。若果津液枯槁。何以食纔下咽。涎隨上涌乎。故知隔飲之間。交通之氣。不得降者。皆衝脈上行逆氣所作也。惟氣逆。故水液不得居。下之常。隨氣逆涌耳。若以津枯而用潤下之劑。豈不反益其邪乎。宜六君子湯加減。挾寒脈遲細者。加肉桂附子。挾熱脈數滑者。加枳實黃連。若噎而聲不出者。加五味子。竹茹。喉中有一塊。食物不下者。痰氣也。加海石。訶子。膈間作痛。多是瘀血。加歸尾。桃仁。並汁童便。甚者。加大黃微利之。千金五噎丸。五膈丸。亦可擇用。按張石頑主於衝脈上逆。誠千古灼見。亦從仲景大半夏湯悟出。然必謂潤下之劑。反益其邪。是因其涎沫之多。而狃於見症之陋習也。衝脈不治。取之陽明。故仲景以半夏降衝脈之逆。即以白蜜潤陽明之燥。加人參以生既亡之津液。石頑此論。得其半而遺其半也。蓋人之胃中。疊積如膏脂者。謂之胃陰。今因衝氣上逆。口嘔出粘涎。即日亡其胃陰。尚得謂滋潤之劑。宜屏絕乎。余所以不敢阿好也。人鏡經曰。內經云。三陽結。謂之隔。蓋足太陽膀胱經水道不行。手太陽小腸經津液枯涸。足陽明胃經燥糞結聚。所以飲食拒而不入。縱入太倉。還出喉嚨。人之腸胃。一日一便。乃常度也。今隔食之人。五七日不便。陳物不去。新物不納。俗醫強分為五隔。十噎。支脈既多。併喪其實。標本不明。是以火裏煨薑。湯中煮桂。胡椒未已。華撥繼之。丁香未已。豆蔻繼之。雖曰和胃。胃本不虛。雖曰溫脾。脾本不寒。此病之所以日盛也。法當用三一承氣湯。節次微下之。後用芝蔴飲。啜之。陳腐去而腸胃潔。癥瘕盡而營衛昌。飲食自進矣。

按此法雖偏。而百無一生之症。而急用之尚有餘望。否則逡巡觀望。何濟於事。反胃

症朝食暮吐。暮食朝吐。初患者尚可治。王太僕云。食不得入。是有火也。食入反出。是無

火也。遵趙氏法。以六味丸治隔症。是壯水之主。以制陽光。以八味丸治反胃。是益火之

原。以消陰翳。而自愚論之。食入反出。脾失其消穀之能。胃失其容受之能。宜理中湯溫

脾。加麥芽以暢達一陽之氣。與參朮消補同行。土木不害。而脾得盡其所能。或吳茱萸

湯溫胃。藉吳萸以鎮納厥陰之逆氣。合參朮甘溫相濟。震坤合德。而胃得盡其所能。而

猶恐中土大寒。溫補太緩。以乾薑吳萸附子華撥蜜丸。俾火化之速。復恐燥熱上僭。傷

上焦。細溫之氣。以沙參白朮茯苓麥芽五穀。甘草白蔻仁為末。厚裹於外。又以礞砂

六一散為衣。使溫和之藥。在外先行於上。而辛熱之藥。由中焦以直達命門。熱腐水穀。

續以八味丸收其全功。若病勢之甚。第以八味丸緩服。未免迂濶矣。張石頑云。有陽虛不能統運。嘔逆便

秘用人參大黃附子攻之即通。瘀血在膈。阻滯氣道。而成者。用

祇當丸作芥子大吞二錢。但飲熱湯及食椒姜。輒呃者。有瘀血也。

診脈 浮緩而滑 沉緩而長 弦濇短小。為難治

大半夏湯。方見金匱 啟膈飲。方見寶易 三一承氣湯。方見時方

按久病與羸敗之人。前方未免太峻。余用麻仁丸及高鼓峯新方代之。高鼓峯悟王損

菴治隔用大黃之妙。融會一方。頗為穩當。方用熟地五錢。當歸白芍桃仁麻仁各三錢。微微潤之。其形體如常。即以前方內大黃一二錢。以助血藥。

加減左歸飲

經云腎乃胃之關。關門不利，升降息矣。關門即氣交之中天之樞也。故腎旺則胃陰充，胃陰充則能食。

己任篇曰：隔症、陽

明盡之。予治荆溪潘爾修之隔，用左歸飲去茯苓，加生地當歸。兩大劑而便潤，食進。

十劑而兩便如常。飲食復舊。蓋以左歸飲中有甘草，則直走陽明，以和其中。且當歸、

地合用，則能清胃火，以生其陰。胃陰上濟，則賁門寬展，故飲食能進。胃陰下達，則幽門

關門皆滋潤。故二便如常。去茯苓者，恐其分流入坎，不若專顧陽明之效速也。

和中暢衛湯

紫蘇梗

五分

香附

醋炒

神麴

炒

沙參

各一錢

桔梗

連翹

去子尖

各六分

木香

四分

蒼朮

撫芎

貝母

各八分

砂仁

三分

生姜

三片

水煎服

易思蘭

自注云

香附

蘇根

開竅行氣

蒼朮健中

貝母開鬱痰

連翹散六經之火。撫芎發肝木之困。神麴行脾之鬱。

木香逐氣流行。桔梗升提肺氣。沙參助正氣而不助火。此方提上焦之大邪，乃大鬱發

之義也。然徒用此方，而不兼補下之藥，雖能解散於一時，其火無水制，必然復生。而

痞滿噎膈之疾，恐尤甚於前也。愚按內經云：隔塞閉絕，上下不通，則暴憂之病也。可

見此病多起於鬱結不舒。胃氣不能敷布所致。張難峯所謂神思間病是也。方中雖是

解鬱套藥，而分兩多寡，氣味配合，似有獨得之妙。又與八味丸間服，所以多效。喻嘉言

資液救焚湯，與八味丸間服，亦是此意。但救焚湯大涼大降，流於奇險，不如此湯之平

易近人也。

五噎丸

千金

治胸中久寒，嘔逆妨食，結氣不消。

乾姜

蜀椒

吳茱萸

桂心

北細

辛各一兩 人參 白朮各二兩 橘皮 茯苓各一兩 附子一枚 右為細末。煉蜜丸。桐子大。

酒服十五丸。日三服。漸加至三十丸。

五膈丸金 治飲食不得下。手足冷。上氣喘息。麥門冬三兩 甘草二兩 蜀椒炒去汗 遠志

肉桂心 細辛 乾姜炮各一兩 附子一枚 人參二兩 右為細末。煉白蜜丸。彈子大。先

食噉一丸。細細嚥之。喉中胸尚熱。藥丸稍盡。再噉一丸。日三夜二服。七日愈。張石頑

曰。二丸同用。參附椒辛姜桂之類。一以肝氣上逆。胃氣不下而嘔噎。故用芡。橘以疎肝

降逆。苓朮以健脾通津。一以腎氣不蒸。肺胃枯槁而不納。故用冬草以滋肺和胃。遠志

以補火生土。又嘔噎而藥食可進者。頻與小丸調之。膈塞而飲食不納者。時用大丸噉

之。其立法之詳若此。可不辨而忽諸。

吳茱萸湯方見傷寒 理中湯方見傷寒 連理丸理中丸加黃連 八味丸方見時方

又改膈食反胃。及嘔吐粒米不入之症。多係七情不遂。激動其氣。氣亂載血上逆。菀積於

中。胃氣阻隔。用生鵝血乘熱飲之。取其生氣未離。以血攻血。直透關鑰。引宿積之痰。一涌

而出。而胸脇豁然。此法詳於蘇東坡瑣錄。前輩金淳還公。即韓幕廬東垣。俱已驗效。推之

生鴨血生黃牛血亦可用。

西洋藥酒方錦囊秘授 治膈食翻胃。一切痢疾水瀉等症。立驗。紅豆蔻去壳 肉荳蔻麝香

包鹽去油 白荳蔻去壳 高良薑切片 甜肉桂去皮 公丁香各研淨細末 先用上白冰糖四兩。

水一飯碗。入銅鍋內煎化。再入雞子清二個。煎十餘沸。入好燒酒一斤。離火置穩便處。將藥末入銅鍋內打勻。以火點著燒酒片刻。隨即蓋鍋火滅。用紗羅濾去渣。入磁瓶內。用冷水去火氣。隨量少飲之。

繆仲淳秘傳隔噎膏。人參濃汁 人乳 牛乳 梨汁 蔗汁 蘆根汁 龍眼濃汁

右七味各等分。加姜汁少許。隔湯熬成膏子。下煉蜜徐徐頻服之。其效如仙丹。

貝母糖酒方。好陳酒 一酌 冰糖 十兩 貝母 去心 砂仁 木香 陳皮 錢各二

右咀片入

磁瓶內。箬葉紫繫。上放米一撮。煮以米熟為度。每日清晨服一大杯。

糖薑餅。用糖坊內上好糖糟 一斤 生姜 四兩 先將糖糟打爛和姜再搗做小餅。曬乾

放磁瓶內。置竈烟櫃上。每日清晨將餅一枚泡滾水內。少停飲湯。

八汁湯。治噎食。生藕汁 生姜汁 雪梨汁 蘿蔔汁 甘蔗汁 白菓汁 蜂蜜

竹瀝 右各一盞和勻。飯上蒸熟任意食。

牛羊人乳汁。治翻胃隔氣。此症必起於腸枯血燥。大便三四日一次。糞如馬屎。若如羊

屎者不治。口常吐白沫者不治。牛乳 羊乳 人乳 不拘分兩。總宜常服。為生血

潤腸之妙藥。

瘧症

瘧疾不離少陽。少陽為半表半裏。邪居表裏之界。入與陰爭則寒。出與陽爭則熱。爭則病

作息則病止。止後其邪仍據於少陽之經。淺則一日一作。深則二日一作。再深則三日一作。雖有別經。總以少陽為主。故仲景以弦字該本症之脈。蓋於治法只一小柴胡湯。熱多煩渴。加知母花粉。寒多身疼。加乾姜桂枝。治之得法。一二服可愈。朱丹溪云。無汗要有汗。散邪為主。帶補正。有汗要無汗。補正為主。帶散邪。大抵於小柴胡湯中無汗。麻黃可加二錢。即三解湯意也。有汗桂枝酒芍可各加二錢。即柴胡桂枝湯意也。如三五作不休。即於前方加常山三錢。一服即愈。俗謂常山截瘧。用之太早。則截住邪氣。而成他病。不知常山祛痰涌吐。從陰達陽之藥。正所以鼓邪氣外出。何截之有。余每合川山甲金銀花三味。取其通達經絡。又以人參當歸白朮何首烏之類。擇用一二兩為君。於瘧未出時服之。多愈。至於方書分定名色。多歧反惑。而所應別者。如單寒無熱為牡瘧。宜理中湯。理陰煎。加柴胡主之。單熱無寒為瘧瘧。或先熱後寒為熱瘧。宜白虎湯加桂枝主之。勞役飢飽過度為勞瘧。宜補中益氣湯加柴胡主之。受山嵐瘴氣為瘧瘧。宜霍香正氣散。平胃散加柴胡主之。久瘧心腹有塊者。名瘕母。以鯨甲飲主之。只此數症。畧宜分別。究亦不離少陽一經也。若瘕痢交作。只以小柴胡湯疎少陽之氣。則陷者自舉。加花粉三錢。滋陽明之液。則滯者自通。或即以此湯送香連丸一錢五分。挾虛者。以補中益氣湯倍柴胡。煎送香連丸二錢。此薛立齋先生之心法也。

小柴胡湯

方見傷寒

男元犀

按凡服治瘧藥。宜瘧未至前三時服。或煎兩服。一服於瘧期五

鼓時服。留一服於瘧未至前二時服。最妙。凡治瘧藥。古法必露一宿。以瘧為暑邪。暑氣得露而消也。又近醫以初瘧。忌用人參。白朮。茯苓。此說本之嵩崖尊生。余雖不滿。

亦當從衆。今即照嵩崖去人參。加青皮一錢五分。寒多加乾姜。桂枝各二錢。熱多。

加知母。花粉各二錢。或加黃連。石膏。本方去人參。加常山。草果。知母。檳榔。川貝母。各

二錢。名清中驅瘧飲。大意以無痰不成瘧。此方為治瘧之總方也。然亦多效。

鼈甲飲。鼈甲三錢 醋炙 白朮炒 黃芪 川芎 酒白芍 檳榔 草菓煨 厚朴 陳皮 甘

草各一錢 生薑三片 棗肉三枚 烏梅一枚 水煎服。

又有久瘧流連不愈。及三陰瘧。三日一作。者。當分五藏之虛。而施溫補。宜以景岳何人飲。

休瘧飲。常服。瘧作之期。或加少陽藥一二味。及常山川山甲。附子。金銀花之類。以通經絡。

或用人參一兩。生薑一兩。濃煎服之。此不截之截法也。家貧者以冬白朮一二兩代之。血

虛者。以當歸一兩代之。瘧雖有五藏之分。而久瘧症治法。只以補脾為主。益以土為萬

物之母。五藏六府。皆受陰焉。沉瘧為少陽之邪。戊己之土。久受甲木之剋。扶弱抑強之法。

權實操於醫者。宜於六君子湯。四君子湯。補中益氣湯。諸方。加之意焉。

何人飲。何首烏一兩 不見錢 或生用人參 二錢 或一兩 陳皮 一二錢 虛 煨生薑二錢 水煎服。

休瘧飲。何首烏一兩 錢 或生用人參 二錢 或一兩 陳皮 一二錢 虛 當歸三錢 炙甘草一錢 陰陽水煎服。

又久瘧不愈。必求之腎。如腎水不足。熱多者。以六味丸加味。主之。腎水不足。寒多者。以八



味丸加味主之。高鼓峯醫案云。余治一人三陰瘧不愈。令吞八味丸。服人參養榮湯。冬至日。再加附子一錢。至半夜汗出而愈。汗出者陽回之兆。亦邪解之徵也。愈於冬至日者。以陽生而陰退也。

瘧疾脈象

瘧脈自弦。浮弦表邪。沉弦裏邪。洪弦屬熱。遲弦屬寒。滑弦食積。久瘧之

脈。微細虛弱。漸緩則愈。弦緊則殆。土敗雙弦。代散莫救。

雄黃龜酒方。治三日久瘧神效。用活大烏龜一個。連殼左右肩各攢一孔。以明雄

黃六錢。研細末。每孔摻入三錢。外以磁黃泥包固。勿令洩氣。炭火上煨存性。研細末。每

服一錢。空心陳酒送下。二三服即止。

香圓雄黃散。種福堂陳香圓一個。去頂皮。大者每隻加透明雄黃三錢。研細末。摻入香圓

內。炭火中煨存性。再研極細末。每服七分。用軟腐衣作六七包好咽下。此日不可吃湯

水。任其嘔去頑痰。

斑貓截瘧丹。種福堂斑貓巴豆肉硃砂錢各一分麝香二分雄黃一分蟾酥五分右用

黑棗三枚。搗丸如菜豆大。貼眉心一周時。揭下投長流水中。

椒雄貼臍丸。種福堂胡椒雄精右二味等分研末。將飯研爛為丸。如桐子大。外以硃

砂為衣。將一丸放在臍中外以膏藥貼上。瘧即止。

常山草菓散。種福堂常山草菓川烏草烏陳皮甘草各一錢用絹袋盛貯。

聞於鼻間。瘧即止不必再服。

求薑烏棗丸 種福堂

白朮一斤 生薑一斤 搗出汁 拌白朮 晒乾

右為細末。將黑棗一斤。煮爛去皮。

核為丸。

桂麝椒雄膏 種福堂

治虛寒瘧。孕婦忌貼。

桂心一分 麝香三厘 雄黃七厘 川椒七枚

共研極細末。納臍中外。以膏藥貼之。

茅薺燒酒 種福堂

治不論雙單瘧。

用大茅薺。將好燒酒自春浸至秋間。如瘧至不食飲。

食。食則脹滿不下者。每日服茅薺兩個。三日即愈。

痢症

王損菴云。痢症不外濕熱二字。所受不外陽明一經。陽明為多血多氣之府。濕陰邪也。濕勝於熱。則傷陽明氣分。而為白痢。熱陽邪也。熱勝於濕。則傷陽明血分。而為赤痢。濕熱俱盛。則為赤白俱見。初病即以芍藥湯主之。大意以行血則膿血自愈。調氣則後重自除。真百發百中之奇方也。若發熱頭痛。脈浮而緊。是風寒鬱而不解。內陷而為痢。宜以人參敗毒散。鼓之外出。苟得微汗。其痢自鬆。若徒用痢門套藥。殺人不少。大抵痢症漸久漸虛。而用藥亦宜漸補。漸調。四君子湯。六君子湯。四物湯。補中益氣湯之類。煎送香連丸。是薛立齋先生治法。余遵用甚效。

芍藥湯 方見時方

治痢初起。腹痛裏急後重者。

小便短澀者。加滑石二錢。澤瀉錢半。腹

痛者加砂仁一錢 滯澀難出者加當歸白芍各錢半。甚者加大黃一錢 若食積者

加山查三枚。白痢者加陳皮砂仁茯苓各一錢。紅痢者加川芎桃仁各一錢

白相雜者加川芎桃仁以理血。滑石陳皮蒼朮以理氣。如嘔吐食不下者加黑梅連

子去殼三錢倉米三錢入生薑汁一滴緩緩呷之以瀉胃口之熱濕。


人參敗毒散 方見時方

加味平胃散 蒼朮 二錢 陳皮 甘草 各一錢 厚朴 五分 猪苓 黃芩 澤瀉 各一錢 乾姜

五分 白芍 三錢 陳倉米 五錢 水煎服 色紅去乾薑加當歸三錢黃連一錢

香蓮丸 方見時方

張景岳謂痢症是夏月畏暑貪涼過傷生冷至大火西流新涼得氣則伏陰內動應時而為下痢初起宜抑扶煎佐關煎溫藥以調之導之久痢用胃關煎溫補命門真火以扶脾土則痢自止景岳此說雖偏不可盡信而陰藏之人素多寒病一有不慎即患此症不可不知余每於此症初起察其脈遲而細手足俱冷腹痛而裏急後重者以乾姜二錢附子一錢吳萸一錢當歸三錢炙甘草一錢大黃白芍各一錢五分溫通之久痢每以八味丸與補中益氣湯間服收功栗壳訶子赤石脂肉豆蔻兜瀉之藥不可早服久痢亦不可廢又噤口痢乃胃中濕熱之毒薰蒸清道而上以致胃口閉塞而成噤口之症亦有候服瀉熱之藥而邪氣停於胃口者用人參石蓮子等分煎服強呷但得一口下咽虛熱即開



更以二味為末。頻頻服之。種福堂用五穀虫三錢。微炒研末。以米湯送下。又休息痢。流連年餘不愈。愈而又作。是兜瀉太早。餘邪未淨。宜巴豆仁一錢。研去油淨。當歸一兩。煎服。子五錢。炒。同研為末。以冬蜜為丸。如桐子大。每空心以開水送下。三九至七九。以竭其餘邪自愈。張石頑曰。血色鮮紫濃厚者。屬熱。若瘀晦稀淡如瑪瑙色者。為陽虛不能制陰而下。非溫理其氣。則血不清。理氣如爐冶分金。最為捷法。設不知此。概行疎利之法。使五液盡隨寒降而下。安望有甯止之日哉。以伏龍肝二兩。取其溫暖土藏煎湯代水。煮參朮苓草姜桂等藥。多取奇效。

五色痢。是精氣受傷。五液不守之患。宜益火消陰。實脾瀉水。兼分理其精氣。即噤口不食者。亦不出此法。又曰。丹溪治噤口痢。多用石蓮子。今此物真者絕無。余常用藕汁煮熟。稍加糖霜頻服。兼進多年陳米稀糜。調其胃氣。取效。此即石蓮子之意也。又曰。休息痢。服補中益氣數劑不應。反下鮮紫血塊者。此久風成瘕。泄風氣通於肝。肝傷不能藏血也。三奇散倍防風。加羌葛升麻。其一切利水破氣藥。皆為切禁。

三奇散。

治痢後下重。

枳殼

生

防風

各一兩

黃芪

二兩

為散

每服二錢

米飲下

伏龍肝湯丸。

治胎前下痢。產後不止。

炮黑山查肉

一兩

熬焦黑糖

二兩

二味一半

為丸

一半為末

用伏龍肝二兩煎湯代水

煎末二錢

送前丸二錢

日三夜二服

一晝夜

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

令盡

氣虛加人參二三錢

以駕馭之

虛熱加炮薑肉桂茯苓甘草

兼感風寒加葱白香

致。膈氣不舒。磨沉香汁。數匙調服。

羊脂煎

金千

治久痢不痊。

羊脂子一基

白蠟

子二基

黃連

升一

酢

七合煎

蜜

七合煎

烏梅

肉

二兩

亂髮

炭洗去垢

末一升

右七味。

合內沙鍋中湯上煎之。

攪可丸。

如桐子大。

飲服三十九。

日三服。

張石頑曰。

羊脂性滑利。

千金方用治久痢不痊。

專取滑利。

以通虛中留滯也。

其後且有羊脂阿膠蜜蠟黍米作粥方。

深得文帝本經補中寓瀉之意。

生死症及脈法

身不熱者輕。

身熱者重。

發熱不休者死。

能食者輕。

不能食者重。

絕食者死。

發嘔者死。

直腸自下者死。

久痢忽大下結糞者死。

小兒出痘後即發痢者死。

婦人新產即發痢者死。

瀉為血少。

尺微厥逆。

滑大主積。

浮弦急死。

沉細無害。

痢疾續論

次男

元犀

按近傳治痢有三禁。

一曰發汗。

蓋以下痢一傷其津液。

發汗再傷其津液。

津液去則胃氣空。

而下出之濁氣隨汗勢而上入胃中。

遂成脹滿難治。

二曰利水。

蓋以痢疾裏急後重。

滯痛難忍。

若前陰過利。

而後陰愈瀉。

而積滯之物欲下甚難。

三曰溫補。

蓋以痢為濕熱所傷。

得溫則以大濟火。

恐致腐腸莫救。

得補則截住邪氣。

多致流連難愈。

此三者。

時醫傳授之心法也。

然亦有不可泥者。

醫學真傳曰。

凡痢疾初起。

發熱不休。

非肌表有邪。

即經絡不和。

溫散而調營衛。

外邪一解。

其利自鬆。

若概以為熱。

開手即用寒

肌表有邪。

即經絡不和。

溫散而調營衛。

外邪一解。

其利自鬆。

若概以為熱。

開手即用寒

涼多有陷入變劇者不少。故喻嘉言所謂下痢必從汗。先解其外。後調其內。首用辛涼

以解其表。次用苦寒以清其裏。一二劑愈矣。用治利之方。再加發表之藥。失於表者。外邪但從裏出。

不死不休。故雖百日之遠。仍用逆流挽舟之法。引其邪而出之於外。則死症可活。危症

可安。人參敗毒散主之。服後通其暫時燥熱。項邪從表出。熱自解矣。此可見發汗是治痢之要法也。又喻嘉

言有急開支河一法。謂熱邪之在裏者。奔逼於大腸。必鬱於膀胱。膀胱結熱。則氣不化

而小便短赤。不可用逆挽。宜從其小便而順導之。然而水出高源。尤宜用辛涼之藥。清

肺之化源。金匱有下利肺痛者。紫參湯主之。通因。通因氣利。訶黎勒散主之。宿食破結。氣逆

以因腸脫通塞互用之意也。亦見利水非古人之所忌也。至於溫補法。詳於景岳全書。如佐關柙扶

二煎。非溫劑乎。胃關煎非補劑乎。雖矯枉之說。不能無偏。亦堪為肆用芩連查朴者之

救弊也。誰曰治痢有三禁乎。喻嘉言曰。又有驟受暑濕之毒。水穀頃囊而出一晝夜

七八十行。大渴引水自救。百杯不止。此則腸胃為熱所攻。頃刻腐爛。更用逆挽之法。迂

矣。遠矣。每從內經通因通用之法。大黃黃連甘草。一晝夜連進三五十杯。俟其利止渴

緩。乃始平調於內。更不必挽之於外。蓋邪如決水。轉石乘勢出盡。勿可挽也。又曰。治

瘧之法。當從少陽而進退。其間進而從陽。則從少陽為表法固矣。乃痢疾之表。亦當從

於少陽。蓋水穀之氣。由胃入腸。疾趨而下。始焉少陽生發之氣不伸。繼焉少陽生發之

氣轉陷。故泛而求之。三陽。不若專而求之。少陽。俾蒼天清淨之氣。足以升舉水土物產

之味自然變化精微轉輸有度而無下痢奔迫之苦矣。況兩陽明經所藏之津液既已下泄尤不可更發其汗。當從少陽用和法。全非發汗之意。津液未傷者汗出無妨。津液既傷者皮間微微得潤。其下陷之氣已舉矣。

小柴胡去半夏加括蕒根湯

方見金匱

喻嘉言曰：此方乃少陽經半表半裏之的劑。原方用

半夏之辛溫半兼乎表。今改用括蕒之涼苦半兼乎裏。退而從陰則可進而從陽不勝其任矣。但不必更求他藥。惟於柴胡增一二倍用之。尤為進之之法也。

人參敗毒散

方見時方

喻嘉言曰：活人此方全不因病痢而出。但余所為逆挽之法推重此

方蓋藉人參之大力而後能逆挽之耳。

胃關煎

見泄瀉

佐關煎

景岳

治生冷傷脾瀉痢未久者宜此湯。此胃關煎之佐也。

厚朴

炒

陳皮

各一山錢炒

藥

扁豆

猪苓

澤瀉

各三錢

乾姜

二錢炒

肉桂

一二錢

甘草

七分炙

水煎服

如腹痛者加

木香吳萸之類泄甚者加故紙肉蔻之類

抑扶煎

景岳

治暴傷生冷致成瀉痢初起血氣未衰者。此胃關煎表裏藥也。

厚朴 陳

皮

烏藥

各一錢五分

猪苓

澤瀉

炮乾姜

各二錢

吳茱萸

五分

甘草

一錢炙

水煎服

斗門秘傳方

方見時方

治毒痢藏府振痛膿血赤白或下血片日夜不息及噤口惡痢他藥

所不能治者立見神效

附子丸

聖濟總錄

治洞泄寒中注下水穀或痢赤白食已即出食物不消

春陽熱風邪氣流連至長夏發為洞

泄中之至陰故陰氣盛陰氣既盛則生內寒而洞泄矣

附子 烏梅肉 各一兩 炒 川連 二兩

乾姜 半兩 炒 蜜丸 桐子大 米飲下二十九

通聖散

聖濟總錄

治血痢腹痛日夜無度

大棗

烏梅 各三枚

甘草

三錢

乾姜

五錢

水煎服

和中散

聖濟總錄

治冷熱痢腹痛裏急

附子

一錢四分

赤痢減半

川連

一錢四分

白痢減半

乳香

五錢

共為

末米飲湯下未止用青皮再下二服

黑豆湯

聖濟

治赤白痢服藥不止

黑豆

炒去皮

甘草

二兩

用綿裹

入湖水煎

二升

分二服

醫學從衆錄卷六

傷暑

夏日炎炎耗傷元氣故病必體倦脈弱身熱自汗煩躁面垢唇青李東垣以動而得之為中熱靜而得之為傷暑熱陽而暑陰也其實未確蓋以暑字從日暑即熱也何必分名但動靜二字是陰陽分別茲仍分動以得之靜以得之以為此症提綱

何謂動以得之長途赤日荷重作勞因而致病如大熱

傷暑而發熱頭痛與傷寒症同但傷寒脈浮而緊傷暑脈洪而虛以此為辨香薷是解表却暑之藥夏月之用香薷與冬月之用麻黃同義也

大渴脈浮自汗以白虎人參湯主之更加身體重著

是暑而挾濕宜蒼朮白虎湯主之若有吐瀉腹痛此方不可輕用也若前症發熱身疼口

燥咽乾或吐或瀉宜黃連香薷飲主之又有暑風症因暑氣鼓激痰火塞礙心竅以致卒

倒不省人事宜吐之或以千金消暑丸灌之

