

孟河丁氏用藥法

丁氏甘仁爲孟河名醫，民初赴滬行道，並溯上海中醫專門學校，聲譽隆起，子仲英先生，孫濟萬先生，克紹箕裘，願享令譽。氏有醫案如千卷行世，其遺著「用藥一百一十三法」，立法謹嚴，用藥切當，爲臨床處方簡要之祕訣，尙未公之於世，民三十年春，沈仲圭先生，偶得之於青木關中醫診療所胡頌芬遺書殘編中，一時傳鈔者甚衆，曾一度刊載於廣東醫藥旬刊，惜傳佈未廣，原本轉輾傳鈔，脫漏錯誤，在所不免，且有藥無量，初學每感不便，因將原書，重加釐訂，每藥補用量，每法增按語，以明用藥之方法，每類略加擴充，以補不足，雖未必能啓發蘊義，亦可爲中醫入學之門乎。

一 原本有藥無量。初學頗感不便。茲爲酌加用量。惟各地習慣不同。氣候各異。各藥用量。每有出入。茲所用者。乃斟酌江浙習慣而定。讀者不必拘泥。隨時地活用可也。

二 原本有一方中蘇合香丸與至寶丹同用者。亦有一方中小金丹與醒消丸並列者。溫涼並用。此必傳寫之誤。茲特爲校正。

孟河丁氏用藥法

丁氏甘仁爲孟河名醫，民初赴滬行道，並溯上海中醫專門學校，聲譽隆起，子仲英先生，孫濟萬先生，克紹箕裘，願享令譽。氏有醫案如千卷行世，其遺著「用藥一百一十三法」，立法謹嚴，用藥切當，爲臨床處方簡要之祕訣，尙未公之於世，民三十年春，沈仲圭先生，偶得之於青木關中醫診療所胡頌芬遺書殘編中，一時傳鈔者甚衆，曾一度刊載於廣東醫藥旬刊，惜傳佈未廣，原本轉輾傳鈔，脫漏錯誤，在所不免，且有藥無量，初學每感不便，因將原書，重加釐訂，每藥補用量，每法增按語，以明用藥之方法，每類略加擴充，以補不足，雖未必能啓發蘊義，亦可爲中醫入學之門乎。

一 原本有藥無量。初學頗感不便。茲爲酌加用量。惟各地習慣不同。氣候各異。各藥用量。每有出入。茲所用者。乃斟酌江浙習慣而定。讀者不必拘泥。隨時地活用可也。

二 原本有一方中蘇合香丸與至寶丹同用者。亦有一方中小金丹與醒消丸並列者。溫涼並用。此必傳寫之誤。茲特爲校正。

一 原本有分門舛錯。類屬謬誤者。亦必傳瀉之誤。亦爲訂正。

一 一方之中。因傳鈔者多。用藥排列次序。不免錯亂。茲每方照時方格式。重加排定。照此排列法開方。則整齊美觀。一目瞭然。爲初學者必遵之格式。

一 原本行用丸散各方。本擬附載於後。以備參攷。茲以篇幅有限。待日後刊單行本時補入。

一 原本但載藥方。而無說明。茲每方之後。各加按語。每類復有總按語。以解釋用藥治病之意義。但按中引用成方。亦以限於篇幅。暫不列入。

一 原本各類。詳略不同。如時病門風溫類濕溫類。及婦科門妊娠類。皆只列一法。兒科門僅疳積二法。似欠詳盡。外科門外科與喉科合而不分。似眉目欠清。茲爲存真起見。暫照原本。而不更改增補。

一 此稿忽促編成。且出寄寓他鄉。參攷不足。學識簡陋。難免附會穿鑿之處。幸方家有以指正之。



孟河丁氏用藥百一三法按

孟河丁甘仁原著
梁溪侯敬輿校按

時病門

感冒類

疏邪表解法

大豆卷 三錢

紫蘇梗 三錢

赤茯苓 三錢

桂枝 一錢五分

佩蘭葉 一錢五分

枳殼 二錢 麩炒 嫩前胡 二錢

晚蠶砂 三錢 包

六神麴 三錢 炒焦

葱白 三莖 拍

鮮生薑 三錢 去皮拍

和營達邪法

按此治表實無汗之法也。葱白生薑豆卷解表發汗。以代麻黃。桂枝和營。前胡桔梗開肺降氣。蘇梗疏邪理氣。蠶砂化伏邪。佩蘭芳香赤苓淡滲以化濕。枳殼神麴消積。一方而諸法備焉。

桂枝 二錢

佩蘭葉 二錢

製半夏 三錢

赤芍藥 三錢

晚蠶砂 三錢 包

赤茯苓 三錢

蘇梗 三錢

淡黃參 一錢五分 炒



麩枳殼 二錢 焦穀芽 五錢 鮮荷葉 一角洗 鮮佛手 三片乾者用一錢

按此治表虛有汗之法也。桂芍和營以止汗。蘇梗蠶砂佩蘭荷葉佛手芳香以化邪。枳殼半夏寬中以化濕。苓赤淡滲。穀芽和胃。黃苓清熱。卽桂枝湯和營之意也。

三 疏邪化痰法

荆 芥 一錢五分 霜桑葉 一錢五分 法半夏 三錢 蘇 梗 三錢

前 胡 一錢五分 薄橘紅 六分鹽水炒 薄 荷 八分後下 玉桔梗 一錢

光杏仁 三錢 去衣尖打 江枳殼 二錢炒焦 赤茯苓 三錢

按肺主皮毛。風邪襲表。由毛孔而入肺絡。於是肺氣窒阻。氣管發炎。病必兼見咳嗽多痰。治宜本法。以疏邪化痰。方中荆薄蘇桑疏邪以達表。前桔杏枳順氣以利肺。夏橘化滯。赤苓化濕。

四 宣化暢中法

荆芥穗 一錢五分 佩 蘭 三錢 春砂仁 一錢五分打後下 蘇 梗 三錢

薑半夏 三錢 江枳殼 二錢麩炒 廣藿香 一錢五分 廣 皮 一錢五分

大腹皮 三錢洗 六神麩 三錢炒焦 赤茯苓 三錢 佛 手 一錢



按感冒而中氣不暢。胸腹痞脹不舒者。則宜解表而兼宣和之法。茲以荊蘇疏邪。藿佩芳香以暢胸中之氣。而解痞悶。腹砂佛手利氣以化腹中之脹。二陳赤苓化濕。枳麴消積。又按感冒之證。乃感冒四時風寒不正之氣而成。多見惡寒發熱頭疼骨楚。或有汗。或無汗。或咳嗽痰多。證類傷寒。而實不同乎傷寒。故治法不用六經之經方。而用辛平解表之劑。芳香化濁之法。前人治感冒。有香蘇青蘇參蘇等飲。葱豉神朮等湯。今丁氏分列四法。別出谿徑。而不背前人之意。堪為後學楷法。

風溫類

辛涼疏解法

大豆卷 三錢

淨蟬衣

一錢 去翅足洗

光杏仁

一錢 去衣尖打

薄荷頭

一錢 後下

前胡 二錢

象貝 三錢

冬桑葉

一錢五分

玉桔梗

一錢

淡竹茹 一錢五分

赤茯苓 三錢

江枳殼

二錢 炒

枇杷葉

三錢 去毛切

按本方豆卷薄荷葉蟬衣透表疏邪泄風。前胡杏仁順氣。竹茹象貝化痰。桔梗開泄肺氣。枇杷葉清肺熱。枳殼寬中下氣。茯苓淡滲利濕。

又按風溫者溫病之由於外感者也。其邪由口鼻皮毛而入。首先犯肺。故見咳嗽。邪爲濕熱。而鼻塞氣。故見口渴。而不惡寒。其由口鼻入者。宜芳香解穢。由皮毛入者。宜辛涼透表。本涼透表之法也。至芳香解穢之法。丁氏未列。茲特補之。以備偶反。

新增芳香解濁法

淡豆豉 三錢 薄荷 五分後下 玉桔梗 一錢 蘇葉 三錢

廣鬱金 一錢五分 方通草 一錢 廣藿香 一錢五分 佩蘭 三錢

鮮生薑 三片 去皮拍 有熱者加連翹 三錢 竹葉 一錢五分

渴者加蘆根尖 五錢 括樓根 三錢 胃不和者加半夏 三錢 姜製

廣皮 一錢

溼溫類

六 疏解宣化法



藿香 三錢

姜半夏 三錢

光杏仁 三錢
去衣生打

滑石 四錢
研

薏仁 七分
打後下

竹茹 一錢五分
水炙

佩蘭 三錢

淡黃芩 二錢
炒

象貝母 三錢

赤茯苓 三錢

方通草 七分

荷葉 一角
洗

按濕溫之爲病。乃暑濕相搏而成。其證初起。陽爲濕過。則惡寒。繼則濕暑合化爲火。乃但熱不寒。熱盛則汗出。濕鬱則胸痞。熱盛於內。而津不升。則湯不欲飲。以言舌苔。若邪盛者。苔白。與暑交蒸。則苔黃矣。凡病見此證象。卽是濕溫。治法。初起宜疎解濕邪而宣化之。本方最宜。更審其證。暑勝者。宜加蘆根牛蒡子。其不用香薷羌活者。恐暑勝之病。易於化火也。惟濕勝者。可加香薷羌活蒼朮以化溼也。

扶暑類

七 清解宣化法

淡豆豉 三錢

前胡 一錢五分

江枳殼 一錢五分
麩炒

黑山梔 三錢

玉桔梗 五分

赤茯苓 三錢

廣藿香 一錢五分

竹茹 一錢五分



光杏仁 三錢 去衣尖打川通草 七分 六一散 五錢

鮮荷葉 一角 洗切

按伏暑者。於暑天感受熱毒。繼爲風寒所閉。不得外越。由飢腠而入三焦腸胃之間。伏而不出。至秋末多初。久而始發。故其證狀。多見吐瀉泄痢。腹痛。寒熱如瘧。伏之既深。應用裏藥。如內外俱熱。煩躁自汗。大渴喜冷者。宜先用黃連香薷飲。繼進白虎湯。先解其表。而後清其裏。若暑毒深入。熱格在裏。譫語煩渴。而便祕澀赤者。則又應用調胃承氣湯及三黃石膏湯矣。至如本法。不過治伏暑未深。發時未晚者耳。若病勢既進。輕靈之劑。尙未足勝任也。

溫熱類

八 養陰清宣法

鐵石斛 三錢

淡黃參 二錢 炒

黑山梔 三錢

青蒿 三錢

連翹 三錢 去心

竹茹 一錢 五分

薄荷 五分 後下

象貝 三錢

白薇 一錢 五分

淨蟬衣 一錢 去翅足

光杏仁 三錢 去衣尖打

六一散 五錢

赤苓 三錢

茅蘆根 各五錢 去心節

枇杷葉 三片 去毛切

按本法有解養陰清熱。蘆根生津解熱。青蒿薄荷蟬衣茅根透表泄熱。連翹黑梔清心解熱。白薇杏仁竹茹枇杷葉宣肺化痰洩熱。黃芩清內熱。赤苓六一利水化濕。

九 育陰清熱法

石斛 三錢 天花粉 四錢 黑山梔 三錢 黑元參 三錢

雲茯神 三錢 白薇 一錢五分 鮮生地 五錢 南沙參 三錢

川貝 三錢 去心麥冬 四錢 去心連翹殼 三錢 淡竹茹 一錢五分水

枇杷葉 三片去毛切 雪梨汁 二匙 沖 甘蔗汁 二匙 沖

按本法以石斛花粉生津。元參生地麥冬養陰。竹茹白薇川貝枇杷葉宣肺化痰。三汁潤肺。梔翹清熱。參神扶正。

又按溫熱者。溫病熱病之總稱也。古人熱病亦包括於溫病之中。後人則以邪之漸受而輕者爲溫病邪之急中而重者爲熱病。上二法雖列類爲溫熱。實則皆係溫病之方。傷寒論曰。「太陽病。發熱而渴。不惡寒者。爲溫病。」其病有由外感者。邪自口鼻入。首先犯肺。多見發熱咳嗽口渴不惡寒。亦有初起略惡寒。二三日後。始不惡寒者。又有由於伏氣者。素問曰。「冬傷於寒。春必病溫。」蓋其邪伏於經絡。隨時令之日漸溫暖而發出。所感各殊。所發亦異。不循六經。隨感而發。



。其伏至夏秋之交而發者。所感之暑熱既盛。伏邪乃從包絡三焦。乘暑天汗泄之機。一齊發出於三陽。是以溫病有上中下三焦之說也。又外感溫病之治法。邪從口鼻入者。宜芳香解穢。從皮毛入者。宜辛涼透表。熱在肺胃。則宜涼泄裏熱。熱灼肺胃。謔語脈弦。而將動風者。則宜清裏泄風。至熱勢大熾。大渴引飲。發狂譫語。則白虎承氣犀羚至寶紫雪之屬。隨證應用。不可緩矣。伏邪溫病。先從血分。而後達於氣分。故起病之初。即宜清解營陰。逮邪從氣化。再清其氣分。不似外感溫邪之由營及血也。惟有實邪者。猶宜先解其表。無客邪者。始可直清其裏。至若上列二法。乃伏邪傷陰之二例耳。尚非治溫病之全弦。用者參酌而神會之。庶幾思過半矣。

風溼類

十 祛風化溼法

荆防風 各一錢五分 晚蠶沙 三錢包 橘皮絡 各一錢五分 獨活 一錢五分

桑枝 三錢炒 絲瓜絡 三錢 左秦艽 一錢五分 連皮苓 五錢

淡竹茹 一錢五分 天仙籐 三錢 土瓜根 三錢

按此治風溼相搏。無汗身疼。發熱。日晡而盛之法也。荆防桑枝祛風發汗。芫獨天仙籐香砂竹茹

化溼。二絡腫皮通絡化溼。連皮苓利水化溼。

十一 和營通絡法

當歸 三錢

連皮苓 五錢

桑枝 三錢 炒

赤芍 三錢

秦艽 一錢五分

片姜黃 一錢

川芎 一錢五分

海桐皮 三錢

牛膝 一錢五分

晚蠶砂 三錢 包

絲瓜絡 三錢

按此治風溼傳營之法也。以歸歸芍芎牛膝薑黃和營秦艽海桐皮桑枝伏苓化溼。絲瓜通絡絡

十二 化痰通絡法

桑桂枝 各一錢五分

薑半夏 三錢

淡竹茹 一錢五分

明天麻 二錢 煨

廣陳皮 一錢五分

薏苡仁 五錢

左秦艽 二錢

連皮苓 五錢

晚蠶砂 三錢 包

絲瓜絡 三錢

水炙 指迷茯苓丸

三錢 開水過下

按本法以桂枝桑枝天麻秦艽泄風。半夏陳皮竹茹指迷茯苓丸化痰。薏苡蠶砂化溼。絲瓜絡通絡。又按風溼之爲病。乃因腠理不密。春夏之交。或感暑溼。或引飲過度。或汗出當風。既中於溼。而復傷於風之病也。金匱瘧溼喝病脈證篇曰。一風溼相搏。一身盡疼痛。法當汗出而解。值天陰



雨不止。醫云此可發汗。汗之病不愈者。何也。蓋發其汗。汗大出者。但風去。溼在內。溼氣在。是故不愈也。若治風溼者。但微微似欲汗者。風溼俱去也。」故第十法祛風化溼法。不用麻黃湯之發汗。而用荊防令其微微有汗。更以甘獨荅橘蠶等。或祛風以化溼。或淡滲以利濕。或通瘀以宣溼。風去而溼亦隨盡矣。他如十一之和營通絡。十二之化癥通絡。不過隅反而已。至於金匱所論。則有「傷於汗出當風。或久傷取冷所至」者。則爲風勝於表。既風重於表。故可汗之而解。」「可與麻黃杏仁薤白甘草湯」若「風溼脈浮。身重。汗出惡風」者。是溼重於裏。風傷於營。而濕重於裏者。宜「防已黃耆湯主有。」「至金匱又云。」「傷寒八九日。風溼相搏。身體煩疼。不能自轉側。不嘔不渴。脈浮虛而澀者。桂枝附子湯主之。若大便堅。小便自利者。去桂加白朮湯主之。」「又「風溼相搏。骨節煩疼。掣痛不得屈伸。近之則痛劇。汗出氣短。小便不利。惡風不欲去衣。身微腫者。甘草附子湯主之。」「乃在傷寒範圍之內。備錄之。以資參攷云爾。

雜病門

瘧疾類

十三 和解化痰法

柴胡 一錢五分 薑半夏 三錢 廣陳皮 一錢五分 黃芩 一錢五分

光杏仁 三錢 去衣尖打 赤苓 三錢 前胡 一錢五分 象貝母 三錢

佩蘭葉 一錢五分 薑汁炒竹茹 三錢

按本法取小柴胡湯之柴胡半夏黃芩以和解表裏。二陳象貝竹茹杏仁化痰。赤苓佩蘭化濕。

十四 溫化溼痰法

桂枝 一錢五分 廣陳皮 一錢五分 大貝母 三錢 薑半夏 三錢

川朴 一錢 姜汁炒 光杏仁 三錢 去衣尖打 柴胡 一錢五分 草果仁 一錢五分

老蘇梗 三錢 枳實 二錢 點炒 雲茯苓 四錢 鮮生薑 三片 去皮拍

按本法以桂枝柴胡蘇梗生薑解半表而疏邪。赤苓半夏陳皮化濕。杏仁大貝化痰。川朴草果止痞。

十五 扶正達邪法

潞黨參 三錢 柴胡 一錢五分 炒 薑半夏 三錢 台白朮 三錢 土炒

淡黃芩 二錢 炒 光杏仁 三錢 去衣尖打 雲茯苓 三錢 佩蘭葉 三錢



大貝母 三錢

炙甘草 二錢五分

廣陳皮 一錢五分

淡竹茹 二錢 薑汁炒

按此治久瘧而虛之扶正達邪法也。以四君扶正。柴胡達邪。黃芩解裏。陳佩化溼。夏茹杏仁豁痰。

十六 和解宣化法

大豆卷 三錢

佩蘭 三錢

大貝母 三錢

蘇梗 三錢

薑半夏 三錢

光杏仁 三錢 去衣尖打

嫩前胡 二錢

陳皮 一錢五分

江枳殼 一錢五分 麩炒

赤苓 三錢

川通草 七分

六神麴 三錢 炒焦

甘露消毒丹 三錢 開水吞下

按本法以疏解為主。方中豆卷前胡蘇梗疏邪。苓佩通草化溼。二陳杏仁化痰。枳麴助葉氏甘露消毒丹以清瘧。

又按瘧疾多因暑熱內伏。秋寒外來。暑寒相搏而成。故曰「夏傷於暑。秋必瘧瘧」是也。時醫恆以傷寒論之小柴胡湯為治瘧「正方。即用亦不肯用全方。只取柴苓等二三味。即算小柴胡湯矣。誠可笑之至。且小柴胡湯。不過以治傷寒邪逆半表裏間。欲入不得。欲出不能。遂成寒熱往來之

少陽證狀之劑也。以治正式之瘧。已不可靠。若再不敢全用。甘草之甘。畏其膩。大棗之甘。恐其滯。人參之甘。懼其補。生薑之辛散。慮其熱。畏首畏尾。當然百無一效矣。茲備錄數方。以資參考。

一 金鑑柴胡白虎湯。治溫瘧。

柴胡 一錢 常山 石 膏 一兩 黃 芩 二錢 麥 冬 二錢

竹 葉 二錢 甘 草 一錢 知 母 三錢

此治溫瘧之方也。溫瘧熱多寒少。舌乾口渴。乃少陽陽明合病。取小柴胡湯之半方。以泄少陽之邪。白虎以勝陽明之熱。

二 條辨杏仁湯。治肺瘧。

光杏仁 三錢 黃 芩 一錢五分 連 翹 一錢五分 滑 石 三錢

桑 葉 一錢五分 茯 苓 三錢 薏 苡 仁 八分 梨 皮 錢二

肺瘧由溫瘧轉變而來。潮熱。口渴。咳嗽。係伏暑晚發。另以桑翹泄外熱。黃苓梨皮清內熱。苓滑利水。薏苡運中。杏仁利氣。其病未深。故用輕宣。

三 華繩麻黃羌活湯。治寒瘧。



麻黃 二錢 去節 羌活 二錢 防風 二錢 炙甘草 二錢

吐者。加半夏麴二錢。溫服三之一。覆取微汗。無汗再服。寒瘧寒多熱少。無汗。脈遲。皆白。頭痛。項強。風寒外束。寒解則愈。故用麻黃羌防洩風祛寒也。

四 傷寒論柴胡桂枝湯。治牡瘧。

柴胡 四錢 黃芩 一錢五分 人參 一錢五分 桂枝 一錢五分
芍藥 一錢五分 半夏 四錢 炙甘草 一錢 生薑 三錢
大棗 六枚

寒瘧邪逆少陽。樞機不轉。邪不得外達。故但寒而不熱。此謂之牡瘧。以小柴胡湯開少陽之樞。桂枝湯達太陽之表。

五 金鑑小柴胡加常山檳榔烏梅桃仁薑棗湯。治虛人之瘧及間日瘧。

小柴胡湯原方，倍薑棗，加常山 三錢 檳榔 三錢 烏梅 三錢 桃仁 三錢
不足之人。宜用本方。以小柴胡湯清未盡之邪。常山烏梅截瘧。桃仁破瘀於絡。檳榔消痰於下。虛人以此截瘧。和平而不傷正。自是相宜。

六 截瘧七寶散。治三陰瘧。（間一日或二三日發者）瘧瘧。鬼瘧。食瘧。一切瘧疾。

