


金匱要畧淺註補正
三



乙庚化金

漢張仲景原文

閩長樂陳念祖修園淺註

男

元
犀靈右
蔚古愚
全校

蜀天彭唐宗海容川補正

夔門鄧其章雲航參校

黃痺病證并治第十五

寸口浮脈而緩。浮則為風。緩則為痺。

者風與濕非若疼中風所以然者風得濕而變四肢不
合而不去非痛之熱濕應脾而內行是以

痛苦煩脾者色必黃脾以瘀之熱以外行則肢體黃矣

此以寸口脈而言黃瘰初時之病因也。

正曰痺非中風四肢苦煩相連讀蓋脈緩者本主風痺乃今之痺非中風四肢煩痛之痺

是既無四肢煩痛証。而又見緩脈。其應當在脾經。必係風熱內陷。入於脾經。必見脾濕合熱。

之色而發黃也。本文一個非字。直貫到四肢苦煩。一個必字。恰與上文反接。淺注將四肢苦

煩屬於脾色必黃。文法既乖。而脈証亦不合矣。又按瘀熱以行一瘀字。便見黃皆發於血分。

凡氣分之熱不得稱瘀。小便黃赤短澇而不發黃者多矣。脾為太陰濕土。主統血。熱陷血分。

脾濕遏鬱。乃發為黃。故五色惟赤色受潮濕則發黃色。五行惟火生土。五色惟赤回黃。故必

金匱要略淺註補正

黃癰病

—

己未至戊

辰十位五

不得數

壬寅至甲

辰三位丁酉

至甲辰位

木二宮得

正氣

乙卯至丙

辰二位庚戌

至丙辰七

位方合火

血分濕熱乃發黃也。所以鼻衄目黃亦是此義。觀茵陳湯硝石梔子猪膏止治黃之方皆治

血分。惟五苓小半夏是治氣分。然皆變法也。若茵陳諸方乃為正法。可知黃屬血分矣。

跌陽脈緊而數。數則為熱。胃熱則消穀。緊則為寒。脾寒食即為滿。滿者必生濕。是胃熱而

脈浮為風傷於腎。跌陽脈緊為寒傷於脾。是腎得風生熱。脾得寒○凡風與寒濕相搏。其氣必

食穀即助其熱。眩穀氣而不消。則胃中苦濁。濁氣自下流。若小便通則濁小便不通。則濁雖下

出於陰臟。被其寒客熱流。入膀胱。膀胱為太陽統主。身體盡黃。名曰穀瘕。以病雖始於風寒。而實成於穀氣也。

此言跌陽脈以明胃熱脾寒鬱而成瘕。又言腎脈浮跌陽脈緊為腎熱脾寒亦能鬱而成瘕。

又歸於膀胱之不化氣以膀胱主一身之肌表。不化氣則濕熱無去路而亦成瘕。其病雖有

各經之不同而總以脾胃為主故以穀瘕結之。

補曰陰被其寒是言太陰脾受寒生濕。此句總承上文脈緊為傷脾穀氣不消而言。總見

脾寒生濕也。熱流膀胱是言陽明胃熱。此句是總承胃中苦濁而小便不通言。總見陽明胃

熱陷於濕土之中也。淺註解陰為陰臟解熱為邪熱與上文理不相承接則義不明矣。

額上心之部也。腎邪重而黑。腎熱上行而微汗出。手心名勞宮屬心。足心名湧泉屬手足中熱。水色見於火部故黑。通於心則微汗出。腎腎虛不能配火。水火未濟則

數位重

至而辰四

位戊申至

丙辰九位

乃得金

數

丁丑至庚

辰四位至

申至庚辰

九位方合

金數之五

至庚辰六

位庚午至

庚辰十位

商主腎腎虛則其熱薄暮即發膀胱為腎中府腎病則外府必急攝水則小便自利此得之房勞過名曰女勞瘵

腹滿如水狀脾腎兩敗不治

此為女勞瘵而另言其證也

正曰女勞瘵色慾過度慾火結於胞宮血海之中故曰腹如水狀言如水實非水少腹血室中脹滿也血室有瘀熱脹滿則膀胱受其逼窄而急其實病在胞室不在膀胱故膀胱雖急而小便自利以見病不在膀胱而在血室中也此如蓄血小腹滿而小便自利者同一例也故手足心屬血分薄暮入夜屬血分即發熱與熱入血室夜則譫語同例陰虛不能斂陽瘀熱發則微汗胞室瘀熱上應心部則額上黑總見女勞瘵在胞宮血分之中也凡陰陽易男女交感為瘡為淋者其病皆在胞室與女勞瘵一例淺註以腎與膀胱不能攝水為解不知硝石方條明言非水病也何得復以膀胱為主哉

脾雖黃色有因於酒者酒多濕而性陽故傷在上焦心為酒所困則心中懊懣而熱蓄則不能食熱上衝時欲吐酒氣薰心而味

名曰酒瘵

此言酒瘵之證也



乃得小數

丁亥至壬

辰六位壬

午至壬辰

十一位壬

水數壬

至壬辰在

丙戌至壬

辰七位壬

得火數

庚辰壬辰

身生一數

痺病屬實者多而陽明病實者脈必脈遲其胃弱可知胃食難用飽飽則不運火發煩胃中填
屬虛亦復不少陽明病數今竟脈遲弱則化穀不速食難用飽飽則聚而火發煩胃中填
俱阻清者阻頭眩濁者阻於小便必難此因穀氣鬱而生熱而非欲作穀瘴雖下之腹滿如故
於上升則頭眩下降則小便必難此胃有實熱察其病勢

所以然者脈遲為虛故也

此言胃虛欲作穀瘴之證也

正曰淺註言胃虛欲作穀瘴非也此即上文陰被其寒熱流膀胱之義陽明病三字是言

胃家實熱凡仲景稱某經病皆照傷寒六經提綱言之故知此陽明病是言胃家實熱

者脈當數今脈遲則是脾受寒故不見胃之數脈而見脾之遲脈必脾不運化食難用飽飽

則當腹滿且反壅胃熱發煩頭眩胃中濁氣下流必小便難欲作穀瘴雖其證有胃熱腹滿

之象然兼脾寒亦不當若下之則腹滿如故穀瘴之病仍能不解也所以然者以脈遲脾

寒故不當也按腹滿如故承上文言其如故也則知上文食難用飽句下有腹滿證在矣

讀仲景書者雖於文法明暗處細心體玩

上言心中懊憹等證酒瘴之夫病酒黃瘴固屬上焦之病而實不止於上焦必小便不利然其
證猶未備也今且歷陳之夫病酒黃瘴也水出高原上焦濕熱既盛其下焦必小便不利然其
有確切不候曰心中熱等從心熱來其小便不利自不足下熱又不等於女勞瘴是其為酒瘴證
可易之候

庚午壬午

除十得一

同也

再以洛書

方數配元

天後天八

卦政尋

其位探

求其理

二	七	六
九	五	一
四	三	八

也。

補 曰酒味厚入血分。一入於胃則上薰心包故必心中熱。心中懊懣。心中如噉大蒜狀。皆

是酒薰心包之故。包絡與三焦相表裏。包絡移熱於三焦。則決瀆不清。而小便不利。足下熱

亦是血分之熱。與女勞瘵之手足心熱同義也。溫經湯証手足心熱皆同義也。知酒瘵在血

分。益知女勞瘵亦在血分。酒瘵腹滿與女勞瘵之腹滿皆是瘀血。如溫經之腹滿証亦是此

義。惟其發見之因各有不同。故不獨溫經湯單治血。與此治法不同。即酒瘵女勞瘵一則傷

在包絡。一則傷在胞宮。故治方又各不同。此數節當互參之。

酒黃瘵者。以心中熱。或有熱去。無熱。則青則言了了。然亦有心中無熱。而腹滿。為欲吐。又驗

鼻燥。則知其為陽明證無疑。夫腹滿宜下。欲吐宜越。因勢而利。其脈浮者。為邪近

者。為邪近。先下之。導之法。今既腹滿而且欲吐。則可下而亦可吐。必須審

上言無熱。吐下。尚未可定也。若酒瘵心中熱。而且欲吐之者。機吐之則愈。

上言可下。為無熱。而心中熱。病下之。則傷其下。其陽明之邪。乘下之虛。久久為黑瘵。乙癸

而腹滿者言也。若酒瘵在上而誤下之。其邪別入少陰。積漸而腎傷。故

肝病目青。腎病面黑。然雖曰黑瘵。而其心中熱氣。如噉蒜薑狀。此於變證中。露出酒瘵真面目

而肝病目青。腎病面黑。原則仍是酒家。故其心中熱氣。如噉蒜薑狀。也。腎虛則陰火熱血。而為瘀血。

金匱要畧卷注補正

黃瘵病

三

巽	乾	兌
坤	震	坎

坤	兌	乾
巽	震	坎

戊申癸丑

從雜爻

而化火

乙亥庚午

從乾坎而

瘵於皮膚爪之不仁。此絕類女勞瘵何以知其為酒瘵也。然酒脈必浮此雖因下而弱要辨。大便正黑。血不榮於表則其脈浮帶弱色雖黑仍帶微黃故知之。

此四節言酒瘵之相因為病以補二條懍懍等證所未備也。

補曰仲景言酒瘵久為黑瘵女勞瘵亦云作黑瘵酒瘵大便正黑女勞瘵亦云大便必黑

酒瘵足下熱女勞瘵亦云足下熱蓋酒入於胃味厚歸血酒味薰灼心包絡受之醉則心神

先亂多飲則醉成死血凡酒瘵者皆病在血分瘵血入大便則化黑色瘵血在經絡壅熱則

為足下熱瘵血發出心血焦灼之色則為黑瘵瘵悴黑瘦皆是血分瘵熱之故女勞瘵欲飲

於血室病亦在血分之中故與酒瘵見證皆同其不同者酒瘵以心中熱小便不利為別蓋

酒先入心包遺熱於小腸故見心中熱小便不利也若女勞瘵又以膀胱急小便自利為別

蓋瘵熱在胞室逼窄其膀胱故急然膀胱之中實無瘵故小便自利此所以異也故治酒瘵

以心胃為主治女勞瘵以三焦胞室為主

師曰病黃瘵。濕熱也濕淫於內則煩喘胸滿口燥者以病發時不用汗解之火切

逼其汗。以熱兩熱相博所得然必不作黃凡黃家所得從濕得之原不可以一下盡其法也須審其一身盡熱

熱而黃。且吐熱。視一身之熱為尤甚。熱盡在裏。法當下之。

此概言黃瘧。有因誤水而得之證。又辨其濕熱相合者。為瘧病之常。獨熱在裏者。為瘧病之

變。使人分別論治也。

瘧病將成。未必先見。有一脈沉。裏熱渴欲飲水。飲水而小便不利者。水無去路。則鬱於裏。而為

二證。而可卜之。凡病在裏。則脈沉。則渴欲飲水。而小便不利者。又躁不得睡。是胃有

皆其發黃。脾之部位在腹。脾之脈絡連舌本。散舌下。若

和矣。濕熱屬黃家。相合為此二節言黃之將成。欲人圖之於早。不俟其既成而藥之。意含言外。

黃者土之色也。土無定位。寄黃瘧之病。當以十八日為期。蓋謂十八日。脾氣至而虛。治之者當

王於四季之末各十八日。故黃瘧之病。當以十八日為期。者當復。即實者亦當通也。治之使其

十日以上。即瘧也。若踰十八日不瘥。而反劇為難治。土氣不能應期而主難治

此言黃瘧之愈有定期。欲醫者期前而速治也。按沈目南云。此取陽病陰和。陰病陽和為大

綱也。十八乃三六陰數之期也。十日二五陽土之數也。黃瘧乃濕熱鬱蒸。陽邪亢極。脾陰大

衰。故治之須候一六二六三六。陰氣來復。制火之期。而為定期。若至十日以上。土陰氣復。則

當瘥。而反劇者。乃脾陽亢極。陰氣化滅。故為難治。此雖非正解。亦互相發明。

化金 戊午 從後天 坤元 化水 從 先天 坎 吳加化 水木性 濕氣根 濕邪者 能養水 源也 壬寅丁酉



得先天龍

震後天

震後天

震後天

震後天

震後天

震後天

震後天

震後天

震後天

震後天

震後天

震後天

瘧病是鬱熱。瘧而渴者，內熱更結，外蒸之象。其瘧難治。瘧而不渴者，熱從外宣，內之正氣自運。其瘧可治。發於陰部，裏氣逆。其人必嘔，發於陽部，表為陽，裏為陰。其人振寒而發熱也。

此以渴不渴別瘧之難治可治。以嘔與寒熱辨黃之在表在裏也。

今試為瘧病出其方。穀瘧之病，其初多病寒熱，則寒熱作時。不食，寒熱止時，即或時食。食即熱，熱上。頭眩，內滯。心悶，心悶不安。濕熱，濕熱。解久久面發黃，為穀瘧。以茵陳蒿湯主之。

此為穀瘧證。而出其方也。徐忠可云：前第一段論穀瘧，不言寒熱，而有小便不通。第二段

論穀瘧，不言心胸不安，而有小便必難。此獨不言及小便。蓋穀瘧證亦有微甚不同。前所云

小便不通，此勢之甚急者也。所云陽明病脈遲者，小便必難。乃既見陽明證，而因脈遲挾虛

以致不運。此表病中之間有者也。若此云寒熱，則非二三日之病矣。不食，食即頭眩，則雖眩

而食未嘗斷，可知矣。故曰久久發黃，見遲之又久，乃相因而為病。其勢漸而緩，則小便亦未

至不通耳。然觀方下註云：一宿腹減，此亦必小便不快，而腹微脹可知。但不必專責小便耳。

穀瘧三證止出一方。蓋陽明病一至發黃，則久暫皆宜開鬱解熱。故此方實為主方。若陰黃

則後人以附子合茵陳，乃此方之變也。按心胸不安，與酒瘧之心中懊懣亦不同。彼因心中



以木之數

位兩舍為

得正故

人生于

寅與

木同運

居水火

之交得

大地五六

之中乾坤

二五之精華

五行之秀

熱至有無可奈何之象此言不妥僅微煩也即陽明脈遲證所謂發煩頭眩耳

茵陳蒿湯方

茵陳蒿 六兩

梔子 十四枚

大黃 二兩

右三味以水一斗先煮茵陳減六升納二味煮取三升去滓分溫三服小便當利尿如

皂角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也

男元犀按

太陰濕土也陽明燥土也經云穀入於胃游溢精氣其上輸下轉藉脾氣之能也穀瘴者食穀入胃脾氣不輸濕與熱併久則蘊蒸成黃黃成則榮衛流行之機為

之阻而不利故有寒熱不食之病經云食入於陰長氣於陽食即頭眩心胸不安者穀入於胃挾濁氣以上干也主以茵陳蒿湯者茵陳禀冬令寒水之氣寒能勝熱佐以梔子味苦瀉

火色黃入胃挾大黃以滌胃腸之鬱熱使之屈曲下行則穀瘴之邪悉從二便而解矣

凡發熱而不惡黃家當申酉之時名曰晡所時應其發熱而反惡寒此非陽明為女勞得之病在腎腎日晡所時發熱而反惡寒此非陽明為女勞得之病在腎腎

之府為膀胱申時氣血注於膀胱必急膀胱既少腹亦滿一身雖盡黃而額上獨黑晡時氣血注於膀胱必急膀胱既少腹亦滿一身雖盡黃而額上獨黑

熱足下熱此病勢侵淫腎邪遍於周作黑瘴然其中猶有可疑者腹脹便溲證同脾濕然究其腹脹而非水如水狀大

便必變黑而時溲此女勞之病腎熱而脾濕水不行病也但證腹滿者為陽氣併難治以硝氣內結非脾濕水之為病也兼腹滿者為陽氣併難治以硝

石礬石散主之

金匱要略卷之五

黃瘧病

五

中國醫藥大學圖書館藏

氣為萬物

之最靈

澤于詩書

三教名理

取精多而

用物極廣

醞釀深

而精神凝

結其性

光端不消

散再以服

食導引

此為女勞瘵。出其方治也。立論獨詳。所以補先之未備也。

正曰此條淺註以腎與膀胱為解。不知女勞瘵是瘀熱在血室。不在腎與膀胱。故本之曰

非水病也。又觀其方自注曰。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。蓋胞官在大腸之前。膀胱

之後。前後全以油膜相連。胞乃油膜中一大火室。故用硝礬均走油膜。去瘀濁。使瘀血從油

道走。大腸而出。使熱邪從清道走。小便而出。皆從油膜透達而出。此兩途也。淺註以為屬腎

似指為虛勞之證。而又見其方非治虛。故解不的確。余已詳於上條。當細參之。

硝石礬石散方

硝石

熬黃

礬石

燒等分

候也。

右二味為散。大麥粥汁和服。方寸匕。日三服。病隨大小便去。小便正黃。大便正黑。是其

徐忠可云

硝能散虛鬱之熱。為體輕脫。而寒不傷脾。礬能却水。而所到之處。邪不復侵。如紙

於氣血陰陽汗下補瀉等

正曰硝與堅速降。而云散虛鬱之熱。非也。礬能逐濁。有澄清之力。但云却水。亦非也。蓋本

吐納收運

修鍊之功

而廣行陰

陰精功累

仁誠懇篤

致手深美

不倦則氣

物皆備于我

反身而誠

不假外求

求則得之

真寶不虛

天之與我者

備我之保天

文原言是女勞瘵。非水也。須知女勞瘵。是男女交媾慾火結聚在胞宮精室之中。硝鹹寒直達精室以攻其結。熱白礬佐之以除其濁。令結汗之邪從大小便出。故曰小便正黃大便黑。徐註謂與汗下等法。毫不相干。豈不謬耶。

酒瘵前論已詳。似可毋庸再贅矣。而心中懊憹為此證第一的據。或熱痛為此證中之更甚者。以梔子大黃湯主之。

此為酒瘵。而出其方治也。

梔子大黃湯方

梔子十四枚

大黃二兩

枳實五枚

豉一升

右四味以水六升。煮取二升。分溫三服。

元犀按梔子豆豉徹熱於上。枳實大黃除實去滿於下。此所謂上下分消。順承熱氣也。徐忠可云。因酒徒陰分大傷。故不用燥藥。以耗其津。亦不用滲藥。以竭其液。謂熱散則

濕不能留也。凡治濕熱而兼燥者。於此可悟。

正曰既有濕矣。何又兼燥。自相矛盾。只因於燥濕之理未明也。燥即不濕。濕即不燥。其不

用燥藥者。因此是濕。熱燥能助熱。故不用也。

諸凡病黃家槩屬濕熱交鬱而成。小便為氣化之主。但利其小便下氣自不能久鬱。則諸假令脈浮。則氣病全滯於表。分



者全吉身

中自有無

至寶美鍊

而善用之

塵埋迷失

不浪費斷

喪不消亡

漸減不寒

落不全攢

簇五行空

鍊融合固

結乃一私

欲私意小

當以汗解之宜桂枝加黃耆湯主之

此以下皆治正黃瘧方也

徐忠可云黃瘧家不獨穀瘧酒瘧女勞瘧有分別即正黃瘧病

邪乘虛所著不同予治一黃瘧百藥不效而垂斃者見其偏於上令服鮮射干一味酌許而

愈又見有偏於陰者令服鮮益母草一味數酌而愈其凡有黃瘧初起非係穀瘧酒瘧女勞

瘧者輒令將車前根葉子合搗取自然汁酒服數碗而愈甚有臥床不起者令將車前一味

自然汁數盞置牀頭隨意飲之而愈然則汗下之說亦設言以啟悟其可無變通耶

補曰但利其小便是治黃正法亦治黃定法也此後汗下溫補諸方皆是變法故其文法

以假令二字別之便是仲景示人有別之意蓋在仲景之意以為世多知正治之法而惟變

證變法則恐不知故凡正法每以一一語了之反於法之變者特加詳焉此仲景著書

之通例玩其文法便可識矣有如此條諸黃家但利其小便一語已盡正治之法其餘變證

兼證主中之賓讀其書者幸勿玩其所詳而忽其所畧也

桂枝加黃耆湯方見水

男元犀按

黃瘧證多由濕熱內鬱而成為病在內也鬱在內者宜內解故曰但當利其小便
小便通則所鬱皆去矣假令脈浮者在肌表也當外解故曰當以汗解之桂枝湯

智小識劍

剔掃除消

散鎔淨盡

雲府清

虛天君素

定性尤發

現于是用

定慧之法

不搖不散

圓光結彩

凝聚其精

華金欲收

厚充實

解肌發表加黃者助之以黃者有發汗退黃之專長也

諸黃綠濕熱經久變為堅燥譬如蠶麵濕合熱鬱而成黃熱則久濕去而乾也以豬膏髮煎主之

此言黃瘡中另有一種燥證飲食不消胃脹有燥屎者而出其方治也徐氏謂為穀氣實所致并述治友人駱天游黃瘡腹大如鼓百藥不效服豬膏髮灰各四兩一劑而愈按此條師止言諸黃二字而未詳其證余參各家之說而註之實未愜意沈自南註浮漫又極附會余素不喜惟此條却有悟機姑錄而互參之其云此黃瘡血分通治之方也寒濕入於血分久而生熱鬱蒸氣血不利證顯津枯血燥皮膚黃而暗晦即為陰黃當以豬脂潤燥髮灰入血和陰俾脾胃之陰得其和則氣血不滯而濕熱自小便去矣蓋瘡皆因濕熱鬱蒸相延日久陰血必耗不論氣血二分皆宜兼治其陰故云諸黃主之

豬膏髮煎湯

豬膏

半斤

亂髮

如雞子大三枚

右二味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出千金云太醫校尉史脫家婢黃病服此胃中燥糞下便差神驗

男元犀按

豬膏主潤燥髮灰主通小便本神農本草經有自還神化句最妙謂髮為血餘乃水精奉心化血所生今取以煉服仍能入至陰之臟助水精以上奉心臟之神以

圓滿園

轉運數

陰動升

陰凝日月

之先年相

之膏液

滯養精液

數之以震

大府之以

風濕之

之需乾

金而大丹

成矣此

化其益也沈自南謂寒熱入於血分久而生熱鬱蒸氣血不利證顯津枯血燥皮膚黃而暗晦即為陰黃當以此治之且熱鬱既久陰血無有不傷治者皆宜兼滋其陰故曰諸黃主之
又按時醫感於以人補人之說每遇虛證輒以紫河車配藥余幼時隨侍聞家君與客常談及紫河車一物曰某也服此今反服肉羸瘦某也服此病反增劇吾行道數十年見有等證即曰非紫河車不能成功也嗚呼是醫也而能活人乎是藥也而能活人乎
黃瘧病審其當用表裏
茵陳五苓散主之
若夫脈沉腹滿在裏則為大黃硝石湯證脈浮無汗在表則為桂枝加黃耆湯證矣當知此方非治黃通

此為黃瘧而出表裏兩解之方也徐云治黃瘧不貴補存此以備虛證耳

茵陳五苓散方

茵陳十分

五苓散五分

右二味和先食飲服方寸匕日三服

男元犀按

五苓散功專發汗利水助脾轉輸茵陳蒿功專治濕退黃合五苓散為解鬱利濕之用也蓋黃瘧病由濕熱瘀鬱薰蒸成黃非茵陳蒿推陳致新不足以除熱退黃

非五苓散轉輸利濕不足以發汗行水二者之用取其表裏兩解為治黃之良劑也

黃瘧腹滿小便不利而赤

最難得汗若自汗出也表和此為表和裏實者當下之宜大黃硝石湯

此為黃瘧而出其裏實之方也視梔子大黃及茵陳蒿湯較峻



大黃硝石湯方

大黃

黃柏

硝石各四兩

梔子十五枚

右四味以水六升煮取二升去滓納硝更煮取一升頓服

男元犀按

黃瘧病濕熱交鬱不得外通今自汗出者外已通也腹滿小便不利而赤者濕熱仍實於裏也實者當下故用大黃除滿去實硝石領熱氣下趨二便又以黃柏除

濕退黃梔子散熱解鬱濕熱散二調便則裏氣亦和矣

黃瘧病

實熱者小便赤短若

小便色不變

且欲自利其無內熱確鑿有據可知其

腹滿而喘

非裏實氣盛乃為虛滿虛喘也雖有裡熱亦

不可

以寒下之藥

除其熱

熱除則必作

噦噦者

宜先調其胃降其逆然後消息治之以

小半夏湯主之

此為黃瘧之虛證誤治增病而出其救治之方非謂小半夏湯即能治黃瘧也後人以理中

湯加茵陳蒿頗有意義

小半夏湯方

見痰飲

元犀按

傷寒論云痰熱在裏身必發黃此云小便色不變欲自利者可知內無痰熱矣蓋喘滿屬中氣虛弱故曰不可除熱師恐後人誤投寒劑傷中故立小半夏湯以救誤治

也用半夏和胃以鎮逆生薑溫理中膈中溫則升降自如而喘滿嘔逆自愈又按若中虛發黃者余每用理中湯真武湯等加茵陳蒿多效

諸黃腹痛而嘔者

少陽之不和

宜柴胡湯

此言黃瘧。有土受木尅之證。以柴胡湯治其嘔痛。亦非謂柴胡湯治諸黃也。止言柴胡湯未分大小。意者隨見證而臨時擇用也。

柴胡湯方

見傷寒

男元犀按

陽者胃氣不和也。腹痛者木邪犯胃也。小柴胡湯達木鬱和胃。氣使中樞運則嘔痛止而黃退矣。非小柴胡湯可緊治諸黃也。

男子黃。小便自利。為土虛其色外現之黃。當與虛勞小建中湯。

此為虛黃證而出其方也。黃證不外於鬱。虛得補則氣自暢而鬱開。鬱開則黃去矣。單言男子者。謂在婦人則血分有熱。正未可知。又當另有消息也。

補曰女勞瘵。亦小便自利。然有膀胱急證。是胞宮有瘀積也。此小便自利。無膀胱急証。則知為虛矣。虛勞二字。是此節眼目。男子虛勞而發痿黃之色者多矣。非黃瘧之本證也。不可不知。

尤在涇云。瘵黃之病。濕熱所鬱也。故在表者。汗而發之。在裏者。攻而去之。此大法也。乃亦有不濕而燥者。則變清利為潤導。如豬膏髮煎之治也。不熱而寒。不實而虛者。則變攻為補。變寒為溫。如小建中之法也。其有兼證錯出者。則先治兼證。而後治本證。如小半夏。及小柴胡。