

西 13

5-3<2

葉天士先生方案下



此血熱生風之症

沈廿九歲男子左血右氣左麻木血虛生風延右面頰

吸陽明脉矣以辛甘血藥理血中之氣

枸杞 菊花 刺蒺藜 桑寄生 蜜丸

李廿八歲酸梅泄氣傷中陽升失血議養胃陰

生白扁豆 肥白知母 生甘草 麥門冬

甜北沙參

酸主收斂但過助木氣則肝強肆橫轉主疎洩
中氣木來侮土胃血不寧而湧泄矣議養胃陰
既足供木之吸取兼以生血滋肺而木有所制



南京中医药大学图书馆藏

陰中氣濁此
症必是獨覺
鼻中有穢氣
難耐也故以
酸易辛收之

細玩如字不
必指定麥門

徐醋庫
年多下元自餒氣少固納凡辛能入腎辛甘

潤藥頗效陰中之陽氣由陽明脉上及鼻中當以
酸易辛為靜藥

紫胡桃 莢肉 五味 茯苓 瑣陽 補骨

脂 青鹽丸

既以酸鹹下降收束又以瑣陽瑣住陽氣蓋陰

中之陽乃是下元真火本宜潛伏不可上炎也

江
夏濕化熱清肅氣分已愈七八濕解漸燥乃有

敏捷

勝則復胃津未壯食味不美生津當以甘涼如金

也
冬湯為板方

匱麥門冬湯

濕氣甫解即慮燥勝心源活潑呆鈍人何從不

手

宋

五十歲

內經曰中氣不足溲便為變不飢口苦脾陽

不得旋轉運行胃津脉絡久已呆鈍乃勞傷氣分

暑邪虛實藥中議縮脾飲

人參 廣皮 烏梅肉 煨薑 益智仁 茯苓

苓

張

四十歲

平昔勞形傷陽遭悲憂內損臟陰致十二經

脾挾濕熱則
緩大弛長不
司旋轉縮之
以甘補酸收
辛開淡滲則
健運矣

245

246



七情動中營
衛皆為阻逆
心營肺衛兼
理清甯其神
明之主也藥
味更須着意

脉逆亂氣血混淆前後痛欲搥摩喜其動稍得流
行耳寢食不安用藥焉能去病悲傷鬱傷先以心
營肺衛立法

川貝 枇杷葉 松子仁 柏子仁 蘇子

麻仁

病至經脉逆亂氣血混淆醫從何處着手先以
心營肺衛乃理其氣血之本君主安十二官皆
甯也示後人以下手之法

此病是生傷陽繼傷陰方藥並不以重劑陰

五志無形之
火皆本于先
天元陽靜則
溫養臟真為
生生之氣燔
灼則通鑠津
液肌肉日削

247

陽並補先理心營肺衛調其逆亂之經絡混淆
之氣血初看似乎迂遠細想知先甯君主而後
再用調補治病有法

羅六十三歲情懷內起之熱燔燎身中脂液嘈雜如飢厭

惡食物無味胃是陽土以陰為用津液既窮五火
皆燃非六氣外客之邪膏連苦辛寒不可用必神
靜安坐五志自甯日餌湯藥無用

人參 知母 扶神 甘草 生地 天冬
鮮蓮子

至言明確
惟其病延胃
府所以人身
氣餒失司維
續也

248

潘

廿六歲

少年失血遺精陰虛為多夫精血有形既去

胃是陽土以陰為用故胃陰須養真名語也
性情隨氣血改移肌皮寬厚者往往弛緩每見
燥急人瘦如骨立津液不充火氣飛揚耳

難復即是內損陰虛日久漸干陽位肝腎病必延
胃府所列病原大暑令節乃天運地氣之交替人
身氣餒失司維續必有不適之狀褚澄云難狀之
疾謂難以鳴訴病之苦況也

妙香散

中年人氣分
已不旺再因
病傷氣更弱
矣強中壯氣
即是驅邪

顧

節令交替氣旺者潛移不覺中氣虛衰少力旋
轉樞紐幾于或息故維續為難耳

暑濕必傷脾胃二邪皆陰不必苦寒清熱調氣

分利水此邪可去中年病傷氣弱以強中醒後天

人參 炒扁豆 木瓜 茯苓 炙草 廣皮

暑因乎濕挾濕已蒸化為熱必須甘涼淡滲亦
不必用苦寒若未經化熱不致傷津刮液但調
氣分利水足矣暑濕一門變症最多不可不辨
此必是未經化熱者



人身隨天地
氣機升降元
氣旺時不覺
氣血衰而有
病便六氣爲
主而此身無
穢矣

胡三十此人素稟必是偏于火重不量自己每事爭先此非傷于一時春夏天

暖地中陽升失血咳嗽聲音漸啞填實真陰以和

陽
熟地 萸肉 淮山藥 茯苓 天冬 麥冬

龜甲心 女貞 芡實 建蓮肉

錢四十歲瘦人暑熱入營瘧來咳痰盈碗平日飲酒之

熱蓄于肝胃舌黃渴飲議用玉女煎

玉女煎的係肝胃之藥暑熱外侵酒熱內應內
外合邪專在營分非石膏生地等屬難以清營

形倦舌赤必
是脾氣傷而
脾營耗者

脂明豁然

中之熱

楊八^三歲^十胃傷食減形倦舌赤此係脾病

匹獸飲

六君子加烏梅草果等分薑棗煎三因和四藏

以輔脾故名四獸飲

王^司前^十液被瀉損口渴舌白面黃不是實熱血由

絡下糞從腸出乃異歧也

炒歸身 炒白芍 煨葛根 炒南查 炒焦

麥芽 炒荷葉

通閱全部傷
 寒論止是存
 津液為主自
 西昌喻氏法
 律一書通首
 發明此旨故
 先生得力處
 全在于此
 六氣病邪原
 先傷氣分治
 之非法燥液
 劫津即延人
 咄分矣

錢七
 暑風上入氣分先受非風寒停滯用發散消導

者氣分室痺頭眩腹痛治之非法邪熱入血分矣

連翹心 竹葉心 犀角尖 益元散

殼 南花粉

從來治病要訣皮毛之邪輕劑發散疎之泄之

微汗即已若熱入肌肉漸留經絡臟腑此時鬱

熱在裡汗出津津燥燥津液即應存養津液以

達邪若夫臟腑真陽發露亟予滋補惟恐不及

矣敢燥燥乎



徐廿四歲 據述暴驚動怒內傷由肝及胃胃脉衰肝風

動浮腫下起若漫延中宮漸次凶矣兩年餘久恙

先請薛新甫法

入味丸 二兩五錢勻十服

謝葑門三十四歲 上下失血頭脹口渴溏瀉若是陰虛火升

不應舌白色黃飢不納食忽又心嘈五十日病中

吸受暑氣熱氣察色脉須清心養胃

人參 竹葉心 麥冬 木瓜 生扁豆 川

石斛

用藥清靈工夫到此躊躇滿志矣

辨症細切



人知消痰理嗽為要務此以消痰理嗽為大忌醫理精超極矣

大凡瘧痢並作只要宣發瘧邪鬆透肌表俾得津津汗泄則濕熱外出而痢自止

張三十歲中年色萎黃脉弦空知飢不欲食不知味據

說春季外感咳嗽延秋氣怯神弱乃病傷成勞大

忌消痰理嗽

麥門冬湯

楊關上四十五歲瘧痢乃長夏濕熱二炁之邪醫不分氣血

反傷胃中之陽呃逆六七晝夜不已味變焦苦議

和肝胃

人參 炒黑川椒 茯苓 烏梅肉 生淡乾

薑 生白芍



熟虛孰實了
了分明

以資生丸為
藍本是謂平
調和暢

顧四十歲據云負重閃氣繼而與人爭哄勞力氣洩為

虛毆氣拂意為實聲出于上金空乃鳴凡房勞動

精亦令陰火上灼議左歸法

周十三歲凡交夏肉瘦形倦氣短欲寐俗謂注夏病是

後天脾胃不旺時令熱則氣洩也

人參 茯苓 藿香 南查 白朮 神麴

川連 麥冬 砂仁 廣皮 桔梗 米仁 是

丸方

高五十歲足心湧泉穴內合少陰腎臟中年已後下元

內景如燭照
虛風內起不
遺一隅精細
絕倫

聖于此矣

精血先虛虛風內起先麻木而骨稟筋縱乃痿之

象必以血肉溫養

生精羊肉 肉苁蓉 青鹽 牛膝 歸身

大茴 製首烏 茯苓

盛木漬五十四歲暑必兼濕濕鬱生熱頭脹目黃舌腐不飢

能食暑濕熱皆是一股邪氣迷漫充塞三焦狀如

雲霧當以芳香逐穢其次莫如利小便

杏仁 厚朴 蔻仁 滑石 苓皮 橘白

綿茵陳 寒水石 佩蘭葉



南京中医药大学图书馆版权所有

肥人氣走于表中外之陽不固最易汗泄陽虛固其陽以宣通攻邪而宣通攻邪卽在固陽藥中是爲並行一貫非兩事也

張一歲四十此膏淋也是精腐離位壅隧精溺異路出于

同門日久精血化痰新者亦留腐敗考古法用虎

杖散虎杖草名生田野中卽土牛膝也俗名臭花娘

尹三十六歲此痿症也診脉小濡無力屬陽氣不足濕著

筋骨凡筋弛爲熱筋縱爲寒大便久澀爲濕生五

泄之徵汗易出是衛外之陽不固久恙不可峻攻

倣東垣肥人之病慮虛其陽固護衛陽仍有攻邪

仍有宣通之用世俗每指左癱右瘓謂男子左屬

血右屬氣者非此



溺道有病即
用溺道所出
之物治之

266

265

生於朮 川烏頭 蜜炙黃芪 防風 生桂

枝 熟附子

李廿八歲 暑濕氣痺欬逆微嘔有發瘧之象

杏仁 白蔻仁 厚朴 絲瓜葉 連喬

象

貝 射干

鄧葑門橫街 易飢能食陽亢為消此洩溺忽然如淋乃陰

不足也

天冬 麥冬 生地 熟地 知母 黃柏

人中白 阿膠為丸

