

校句点正

卷十二 風熱門

丹溪心法第八冊

風熱門

已集

斑疹 五十九

丹溪心法

○斑屬風熱。挾痰而作。自裏而發於外。通聖散中消息。當以微汗散之。切不可下。內傷斑者。胃氣極虛。一身火遊行於外。所致。宜補以降。於陰証略例中求之。發斑似傷寒者。痰熱之病。發於外。微汗以散之。若下之非理。疹屬熱與痰在肺。清肺熱降痰。或解散出汗。亦有可下者。疹即瘡疹。汗之即愈。通聖散中消息之。癰疹多屬脾隱隱然在皮膚之間。故言癰疹也。發則多痒。或不仁者。是熱風熱濕之殊色。紅者熱火化也。黃瓜

風熱

斑疹

水調伏龍肝去紅點斑

戴云斑有色點而無頭粒者是也疹無頭粒者隨地即收收則又出是也非若

斑之無頭粒者當明辨之

附諸方

玄參升麻湯 三因方治傷寒失下熱毒在胃發斑或汗下吐後餘毒不散表虛裏實發於外甚則煩躁譫妄

玄參

升麻

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一鐘煎七分溫服濕毒發斑亦宜服之

陽毒升麻湯 活人方治陽毒赤斑狂言咽喉痛出膿血

升麻

三分 犀角

射干

黃芩

人參

甘草

炙各二分

右吹咀水二鍾煎至一鍾去滓溫服不拘時

梔子仁湯活人方治發斑煩燥面赤咽痛潮熱

梔子仁

赤芍藥

大青

知母各一兩

升麻

黃芩

石膏

各二兩

甘草

炙半兩

杏仁

去破尖

柴胡

一兩五錢

右吹咀每服四錢姜三片豉百粒水煎溫服

化癰湯 治傷寒汗吐下後癰發脉虛

人參

石膏

知母

甘草

守真加白朮一方加玄參

右吹咀時時煎服

黃連橘皮湯

治濕毒發斑

丹溪心法附錄 醫經編目上卷

黃連

四兩

陳橘皮

杏仁

去皮枳實

麻黃

湯去節

葛根

各二兩

厚朴

姜製甘草

各二兩

右咬咀水煎服

調中湯

治內傷外感而發陰斑

蒼朮

一錢

陳皮

一錢

藿香

芍藥炒

甘草

炙

桔梗

半夏

白芷

羌活

枳殼

各一錢

川芎

五分

麻黃

桂枝

各五分

右咬咀姜三片水煎服

消毒犀角飲子

牛旁子

六錢

荆芥

防風

各三錢

甘草

一錢

右咬咀水煎服

通聖散出丹溪經驗方

川芎

當歸

麻黃

薄荷

連翹

白芍

各半

黃芩

石膏

桔梗

各一

滑石

三

荊芥

梔子

白朮

各二

甘草

二

右剉水煎服

如身疼加蒼朮羌活一痰嗽加半夏

每服細末三錢生薑三片搗細盪起煎沸服之

豆眩

六十

已集

丹溪心法

○頭眩○痰挾氣虛併火○治痰為主挾補氣藥及降火藥○
无痰則不作眩痰因火動又有濕痰者○濕痰者多宜二陳湯

頭眩

火者加酒芩挾氣虛者相火也治痰為先挾氣藥降火藥如東垣半下白朮天麻湯之類○眩暈不可當者以大黃酒炒為末茶湯調下○火動其痰用二陳加黃芩蒼朮羌活散風行濕○左手脉數執多脉濇有死血○右手脉實有痰積脉大是久病久一作虛久病之人氣血俱虛而脉大痰濁不降也○昔有一老婦患赤白帶一年半豆眩坐立不得睡之則安專治赤白帶七愈其眩亦安

附脉理

脉訣舉要曰風寒暑濕氣鬱生涎下虛上實皆暈而眩風浮寒絛溫細暑虛涎弦而滑虛脉則无治眩暈洪左當審諦朱理痰氣次隨證治

附諸方

獨活散

楊氏家藏方

消風化痰治豆目眩暈

細辛

去葉 一刀

石膏

研

甘草

炙各 一刀

防風

去芦

藁本去土

旋覆花

蔓京子

川芎

獨活

去青各 一刀

右為末每服二小水一鍾姜三片煎至六分食後熱服

川芎散

本事方

治風眩豆暈

山藥

甘菊花

人參

茯神

小川芎各五小

山茱萸肉

一刀

右為末每服二小酒調不拘時日三服不可候用野菊花

芳本湯

濟生方

治冒雨中濕眩暈吐逆豆重不食

川芎

半夏

白朮

甘草

炙半 一刀

頭眩

右咬咀每服四分。水一鍾。姜七片。煎七分。溫服。不拘時。

芳朮除眩湯 直指方 治感寒濕。豆目眩暈。

甘草 炙 川芎 附子 白朮 官桂 等分

右咬咀每服三分。姜七片。水煎溫服。食前。

荊黃湯 張子和方 治豆眩。

大黃 荊芥穗 防風 各等分

石為粗末。大作劑。水煎去滓。服。以利為度。

芎辛湯 濟生方 治風寒在腦。或感邪濕。豆重痛。眩暈欲倒。嘔吐。

不定。並皆治之。

川芎 一刀 細辛 洗去土 白朮 甘草 各半刀

右咬咀每服一二兩。姜五片。茶芽少許。水一鍾半。煎八分。臨卧。

溫服或食後服亦可

豆暈方

利痰清氣降火

南星

炙五分

半下

一名

桔梗七分

枳殼

一名

陳皮

一名

甘草

二分

茯苓

一名

黃芩

一分

右作一服姜七片水煎服食後

香橘飲 治氣虛眩暈

木香

白朮

半下

麴

橘皮

茯苓

砂仁

各半

丁香

甘草

炙二分

五分

右剉散水二鍾姜五片煎服

加當歸川芎官桂治

血虛眩暈

白附子丸

治風痰上厥眩暈豆疼

全蝎

炒半

白附子

炮

南星

炮

半下

旋覆花

頭眩

甘菊

天麻

川芎

橘紅

僵蚕炒

干姜

生各一兩

右為末生薑半斤取汁打糊丸梧子大煎荊芥湯下五十丸

人參前胡湯

治風痰豆暈目眩

半下麴

木香

枳殼炒

紫蘇

赤茯苓

南星炮

甘草

炙各五兩

人參

三斤

前胡

橘紅

各五兩

石劉散每服五兩姜五片水煎服

川芎茶調散

治風眩豆痛

見傷風

半下白朮天麻湯

見豆痛

喝起散

大金良方

治婦人血風攻腦豆旋悶倒不知人事喝起

草即蒼耳草也

右取嫩心不以多少。阴干為末。每服二升酒調下。

里錫丹 治早起眩暈。須臾自定。以為常。此因老痰鬱痰所作。必須此藥劫之。

見痰類

○廣按豆眩之症。多主於痰。无痰則不作眩。有因寒痰濕痰者。有因熱痰風痰者。有因氣虛挾痰者。有因血虛挾痰者。其証不一也。夫寒痰濕痰作眩。或因外感寒濕。或因內傷生冷。熱痰風痰作眩。或因外感風暑。或因內動七情。氣虛眩暈。或因脾虛不進飲食。或因胃弱嘔吐泄瀉。血虛眩暈。男子每因吐血下血。女人每因崩中產後而作也。已上數方。雖各有所主。未能尽其變在智者。擴充之也。又嘗論之。夫咳嗽豆痛豆眩三者。乃病之標。必治其病之本。而病方

已如產後眩暈只補其血如脾虛眩暈只補其氣是治其病之本也

豆痛

六十一 附眉睭痛

丹溪心法

○豆痛多主於痰痛甚者火多可有吐者可下者 清室膏治諸豆痛除血虛豆痛不可治 出東垣試効方 血虛豆痛自魚尾上攻豆痛用芎歸湯古方有追涎藥

附諸賢論

王節齋曰久豆痛病畧感風寒便發寒月須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱本熱而標寒世人不識率用辛溫解散之藥暫時得効誤認為寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常踈故風寒易

頭痛

入外寒束其內熱閉逆而爲痛。辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪。然以熱濟熱病本益深。惡寒愈甚矣。唯當瀉火涼血爲主。而佐以辛溫散表之劑。以從治法治之。則病可愈而根可除也。○附脈理

脈訣舉要曰。頭痛陽弦浮風緊寒風熱洪數。溫細而弦。氣虛頭痛。雖弦必瀉。痰厥則滑。腎厥空實。

頭痛治例

心法附錄曰。頭痛須用川芎。如不愈各加引經藥。

太陽川芎。陽明白芷。少陽柴胡。太陰蒼朮。

少陰細辛。厥陰吳茱萸。

如肥人頭痛是溫痰。宜半夏蒼朮。

如瘦人頭痛是熱宜酒製黃芩防風

如感冒頭痛宜防風羌活藁本白芷

如風熱在上頭痛宜天麻蔓荊子台芎酒製黃芩

如白人頭痛是氣虛宜黃芪酒洗生地黃南星秘藏安神湯

如形瘦蒼黑之人頭痛乃是血虛宜當歸川芎酒黃芩之類

如苦頭痛用細辛

如頂顛痛宜藁本防風柴胡東垣云頂顛痛須用藁本去芎

且如太陽頭痛惡風脈浮涼川芎羌活獨活麻黃之類為主

少陽頭痛脈弦細往來寒熱柴胡為主

陽明頭痛自汗發熱惡寒脈浮緩長實升麻葛根石膏白芷

為主

頭痛

太陽頭痛必有痰。体重或腹痛。脉沉緩以蒼朮半夏南星為主。
少陰頭痛是寒。氣逆為寒厥。其脉沉細。麻黃附子細辛為主。
厥陰頭痛或吐痰沫。厥冷其脉浮緩以吳茱萸湯主之。

血虛頭痛當歸川芎為主。

氣虛頭痛人參黃芪為主。

氣血俱虛頭痛調中益氣湯內加川芎三分蔓京子三分細辛三分其効如神。

又有痰厥頭痛所感不一是知方者體也。法者用也。徒知體而不知用者弊。體用不失可謂上工矣。

附諸方

加減三五七散

和劑方

治八風五痺。肢體不仁。大治風寒入腦。

陽虛頭痛長聞人声目旋運轉耳內蟬鳴應有溫痺脚氣緩弱並皆治之

山茱萸 去核三升

細辛 半一升

乾姜 炮三升

防風 去声四升

茯苓 玄皮三升

附子 三个半炮去皮脐

右為細末每服溫酒食前調服

川芎茶調散

治諸風上攻頭目偏正頭痛

見傷風

都梁丸

和劑方

治風吹項背頭目昏眩以及腦痛婦人產前產後傷風頭痛

香白芷揀大者沸湯洗五次剉細乾

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一丸細嚼用荆芥湯下

小芩辛湯

齊生方

治風寒在腦頭痛眩暈嘔吐不已