

驗方新編

卷三 卷四

貳

肩部 胸部 氣痛 哮喘 食積

手部 肋部 咳嗽 脾胃 噎膈

腋部 心部 勞傷 痰疾 呃逆

乳部 肺部 吐血 三消 嘔吐



驗方新編卷二目錄

肩部

擔肩離節

肩甲縫中積痛

手部

蛇頭惡毒

生各指頭又足趾頭生者亦是

脫骨疽

甲疽

又名嵌甲

灌甲初起

油灰指甲

指頭麻木痛癢

指頭畏冷

手足指頭羅紋生瘡

指頭生瘡

指甲下生瘡



北京中醫藥大學圖書館藏

十指節斷壞惟有筋連虫出長數尺遍身緣毛

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍

手了枝痛不可忍

手指觸着衣物痛癢破爛

手指斷落

手皮咬傷

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已

手指手掌皮厚如鉄

掌中紅絲斷之血流不止

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

鵝掌風

手腕生物如豆紅紫疼痛

手臂生瘡腫大如拳

熱毒攻手腫痛欲脫

四肢節脫但有皮連不能舉動



手足作痛

手足生瘡久不收口

小兒手軟

腋部肩下即是

腋下腫硬形如鴨蛋

腋下疔瘡音隔苦

腋下癭瘤

腋下狐臭

乳部

乳頭破裂

乳上溼瘡

乳頭生瘡痛不可忍

乳癰

乳癰多至二三百頭者

乳癰腫及頭面

乳癰日久腫痛不愈

乳癰久不收口



南京中醫藥大學圖書館版權所有

乳岩

婦人乳忽縮入

婦人乳內吹氣有聲

婦人乳汁不通

乳多發脹

胸部

胸膈閉結不通

乳前生乳

肋部

肋下生瘡久則有聲如嬰兒啼哭

男子乳忽壅腫如婦人乳

婦人產後兩乳長細垂下

婦人乳孔塞痛

乳汁自流不止

無子食乳腫痛難消

胸滿腹脹

胸旁生瘡

偏胸



南京中醫藥大學圖書館版權所有

驗方新編卷之二

局部

擔肩癱瘓 此惟擔天有之

五倍子燒存性為細末加黃丹

飛過醋調敷之甚效

又方 照癰毒各方治之

肩甲縫中積痛

查中風筋骨各方治之


手部

蛇頭惡毒

趾頭生者亦是

此症初起痛甚急用頭髮紮住指根取癩蝦蟆一個

目赤腹無八破



南京中醫藥大學圖書館版權所有

去腸雜不可破胆胆將瘡頭套住用繩紮好並將蝦蟆心肝焙枯研

末沖酒服以免毒氣攻心約一對時破口出膿而愈套住之後瘡頭

猶如針刺痛更難忍甚至心中難過遍身發熱或嘔吐惡心不必驚

慌急服護心散見瘡毒或服麻油一盞菜子油心中自安蝦蟆能拔

極重惡毒切不可輕易揭去忍耐片時自能破口出膿而愈慎將

蝦蟆揭去別藥難醫為害不小去膿後如發昏暈亦不必驚慌用

麗參三四錢以砂罐煮濃汁服之自然無事參不宜蒸一時蒸不出

濃其色只如淡黃煮則其色濃厚易見功效無力者用好黨參一二

兩煎服亦可愈後若再腫痛此痛氣未盡之故再用蝦蟆套上少頃

膿盡此不再發此瘡最為陰惡即方極屬神效不可輕視



又方

鳳仙花

下半截連根不用水洗

和甜酒糟搗融敷有人指頭生瘡

如李痛不可忍用此敷之半日腫消痛止較蝦蟆方尤為神速

又方

用磁片將瘡刺破查照疔瘡方內蜘蛛拔毒治之

止痛消腫最為神效○又方

蜈蚣

焙枯為末

猪胆調搽神

又方

雞蛋一個穿一小孔入信石一分

套指頭上熱則再換

止痛如神真仙方也較前各方功效更大

又方

雄黃

枯礬

各等分研末用麻油或醋敷亦極效驗

又方

白蘿蔔榨孔入雄黃三分蒸半熟套指上或用真烏梅仁嚼

爛敷之均極神效

又方

如色白者照後脫骨疽陽和湯各方治之



脫骨疽

此症生手足各指

或云只生手足第曰指者是

或生指頭或生指節指縫初生

白色痛極或如粟米起一黃泡其皮或如煮熟紅棗黑色不

潰爛節節脫落延至手足背窩爛黑陷痛不可忍古方有

一法斷不可用宜用

頂大甘草研極細末用香麻油調敷

厚一日一換不可間斷忌食發物不出十日必愈真神方也再用

金銀花

元參

各三兩

當歸

二兩

甘草

一兩

水煎服

一連十劑

永無後

患藥味不可減少減則不效並忌抓擦為要

又方 大人用陽和湯小兒用小金湯重則用犀黃丸

均見陰疽諸方

色紅

者照上蛇頭惡毒方治之此林屋山人百發百中之方也

又方 甘草嚼融厚敷乾則隨換日夜不斷數日必愈神效

甲疽 又名嵌甲

凡指甲邊生一赤肉突出時常舉發者甲疽也用狼毒

醋浸一宿入猪油五兩微火上煎取二兩絞去渣退火氣敷之

換三次神效此林屋山人方也

又方 乳香 胆礬 研細時時敷之此病須剔去甲不藥亦愈若

已成瘡久不愈者此方甚效

又方 皂礬 五錢火煨候冷研末 先以鹽湯洗瘡拭乾以礬末敷之舊紬裹定

一日一換神效或用枯礬亦可惟敷之微覺疼痛

又方 陳皮濃煎湯浸良久甲肉自相離開輕手剪去肉中爪甲外



南京中医药大学图书馆版权所有

用蛇退燒灰雄黃一錢為末乾摻或香油調敷

又方 輕粉 乳香 沒藥 各一錢 黃丹 二錢 赤石脂 五錢 寒水石

三錢 煨 共為末濕則乾摻乾則油調最妙

又方 甘草嚼融厚敷乾則隨換數日全愈神效

又方 見頭部頭角太陽生瘡方

灌甲初起

用磁鋒於甲上刮去一層並用枯礬末敷之其效如神

油灰指甲

每日取鳳仙花

又名指甲花

連根蒂葉搗敷指甲上用布包好一日一換

月餘乃愈此林屋山人方也



南京中醫藥大學圖書館版權所有

指頭麻木痛癢

取蛭蚰查藥物備和銀硃共搗擦之若遲延不治必生蛇頭蛭蚰

疔痛苦難受初起多擦幾遍決不生矣

指頭畏冷

天氣不寒指尖作冷名曰螺瘡用醋和鹽調勻將指頭泡入自愈

手足指頭羅紋生瘡

生橄欖核

有塩者煮去塩味用

切兩段醋磨雞毛蘸搽二十日後漸消

指節生瘡

名曰蛙節生黃豆嚼融敷須先漱口再嚼即愈

指甲下生瘡



名曰蛙甲治與上蛙節同

十指節斷壞惟有筋連虫出長數尺遍身綠毛

此名血餘症用

赤茯苓

白茯苓

胡黃連

各錢半煎服

虎口並各手指縫生瘡或腫或爛痛不可忍若不早治即爛

手

大指二指間為虎口又名又指

生蒲公英搗融敷之數日即愈○又用生黃豆嚼融敷將口漱盡再嚼甚效

又方 通草為末用雞蛋清調敷其腫即消

又方 白芨 三錢研末 蟾酥 一錢 共和雞蛋清搽神效

又方 白芷 滑石 黃丹 各等分研極細末敷之神效

手了枝痛不可忍



角草研末調生雞蛋白敷即愈

手指縫觸着紙角衣角痛癢破爛

雖癢極難受斷斷不可抓擦務必忍住並忌沾水數日自好倘一
抓擦則纏綿難愈用 白芷 黃丹 滑石 各等分研極細末敷
之神效或用玉真散見跌打損傷門敷之亦極效也

手指斷落

方見卷十三跌打損傷門

手被咬傷

方見卷十三人畜蛇虫咬傷門

手指及掌生黃白膿泡痛癢無時纏綿不已內必有虫



猪肝切片和桃葉搥融敷之神效或用白油膏見腿貼之更妙

手指手掌皮厚如鉄

苦參酒煎服外用苦參末酒敷極效如神

掌中紅絲斷之血流不止

用燈火燒之自能漸收平愈

手足心中忽然腫起或痛或不痛或爛或不爛

此名穿掌又曰擎疽又曰托盤用生附子切片貼之或用生附子煎水泡之更妙數日後不痛者必然作痛作癢切不可用手抓仍用附子水泡之或附子切片加輕粉一分貼之必愈

又方 白鹽 花椒末等分醋和敷之未破者極效已破者勿用



南京中医药大学图书馆版权所有

大方 唐雜書敷之或用鮮桑葉搗敷均極效如腫而不紅又不整
痛者照卷十一陰疽各方治之為要

鵝掌風

生手掌上紫白

斑點疊起白皮堅硬乾燥甚則疊疊脫皮

或癢或痛久則成癬難愈用一大碗以紙緊糊碗口

紙上用針刺破多孔

細米糠二三寸厚手銚燃炭放糠上緩緩燒之燒至離紙三分光景

將炭與糠一併棄去

不可將紙燒穿

取碗中糠油時時搽之數日斷根屢試

神效有人患此筋肉現露十餘年不愈照此醫痊永不復發

又方 真小磨麻油

壹兩

紅砒

壹錢

敲細入油煎至砒枯烟盡為度

去砒留油冷透火氣用火烘油擦三五次十日即愈血寒者最宜此



林屋山人極驗方也

又方

鉛彈子

二個如核桃大

每日在手內搓弄搓熱將鉛彈子握緊書

不歇如此十餘日即愈愈後再搓一二月則不復發

手腕生物如豆紅紫疼痛

治法見卷十一癰毒門葡萄瘡內

手臂生瘡腫大如拳

以小刀畧破其皮

或用癰毒門代刀散敷之即破

真礪砂

上冰片

各二分

輕粉

五厘為末摻之即化為水而愈矣

熱毒攻手腫痛欲脫

猪油和羊糞塗之或水煮馬糞洗之



北京中醫藥大學圖書館藏