

六書纂要辨疑序

余嘗苦夫傷寒者苦無其要也仲景之書傳世已久遺帙頗多不可為要也審矣嗣是而叔和之詮次未免穿鑿成無已之註釋並無正訛可為要乎即古之聖神見徹九天學貫千古者非不各抒其性靈但專內傷者不專外感專傷暑者不專傷寒可為要乎惟陶氏之六書要矣辨陰陽有經表裏有症虛實有脉臨病製方服藥有法井井乎有條且辨叔和之謬正無已之訛足補仲景書之未備惜其立論見之瑣言者復見之家秘見之續言見之截江見之提金見之



童序一
槌法不免層見疊出此蓋要而未集辨而未明也余
曾下闡十有餘載集其書矣有定本初集矣再集矣
其集猶未確也及見中吾劉先生之集乃欣然曰此
集真為得要然猶仍六書之舊戰汗之條未載唐結
之症多舛又為集之闕典余從而纂之辨之去其繁
蕪補其闕略剖其正訛而纂要辨疑乃成于是求其
梓於趙師有光號劔南福州人師復云乃一集也真
仁者壽世之術苦心極矣彼蒼有知諒不令苦心之
人至於湮沒知言哉知言哉

崇禎五年季冬月望日

邵武縣儒學訓導童養學題



新刻傷寒六書纂要辨疑目錄

首卷

啟蒙論

辨張仲景傷寒方論

傷寒論

脉要上

脉要下

陰陽表裏脉症論

傷寒脉症指法

浮脉形狀指法主病

中脉形狀指法主病

沉脉形狀指法主病

三陰三陽經脉症

太陽經見證法

陽明經見證法

少陽經見證法

太陰經見證法

本經用藥法



少陰經見症法

本經用藥法

厥陰經見症法

本經用藥法

合病併病論

三陽合病

風傷衛寒傷榮辨

時行為病論

傷寒不拘日數論

傷寒症內外辨

傷寒看症法則

貫珠篇

二卷

傷寒兩感論

傷寒傳足不傳手經論

傷寒言症不言病論

正傷寒

及溫暑暴寒勞力時疫治各不同辨

傷寒寒熱論

熱在皮膚寒在骨髓論



臟腑表裏論

三陽傳經論

三陰無傳經論

陰症論

陰毒論

傷寒伏脉辯

陽厥陰厥論

寒熱二厥辯

傷寒變溫熱病論

溫病論

暑病論

傷寒標本論

傷寒六經變症

傷寒見症識病法

正治逆治

從治反攻
寒熱辯

論陰分發熱為反併

用溫
汗法

急下急溫法

傷寒見壞症辯

用藥大畧

表裏虛實用藥寒溫法



南京中醫藥大學圖書館藏

傷寒用藥三法

用藥法則

按症治病法

論婦人傷寒與男子

治法不同

論妊婦傷寒

與前症異治

論產後傷寒治法

治法

熱入血室

附妊娠及月水不利

治法

三卷

傷風見寒傷寒見風

風溫

濕溫

風濕

溫毒中暍

發熱

頭痛

項強

惡寒

惡風



背惡寒

寒熱

潮熱

似瘧

無汗

自汗

戰汗

頭汗

手足汗

盜汗

煩熱

煩燥

懊懷

自痛

拘急

咳嗽

喘

氣逆

短氣

口乾



渴

胸脇滿

結胸

痞

腹滿

腹痛

小腹滿

嘔吐

乾嘔

噦

咳逆

下利

便膿血

厥逆

四逆

不大便

譫語

鄭聲

小便不通

小便自利



舌胎

臟結

咽痛

頭眩

鼻衄

吐血

心悸

發黃

發斑

發狂

肉潤筋惕

拂鬱

瘥後昏沉

勞復食復

動氣

不仁

陰陽易陰陽交

不眠

多眠

瘕瘕



二症

戰慄

霍亂

百合

狐惑

虻厥

類傷寒四症

痰症

傷食

虛寒

腳氣

四卷

傷寒劫病十三法

秘用三十七方就註三十七槌法

升麻發表湯

疎邪實表湯



羌活冲和湯

柴葛解肌湯

柴胡雙解散

桂枝大黃湯

加味理中湯

茵陳將軍湯

導赤散

六乙順氣湯

如神白虎湯

三黃石羔湯

三黃巨勝湯

冲和靈寶飲

桃花承氣對子

消斑青黛散

生地苓連湯

加味犀角地黃湯

回陽救急湯

回陽反本湯

溫經益元散

柴胡百合湯



如聖飲

逍遙湯

升陽救火湯

再造散

黃龍湯

調榮養衛湯

導赤各半湯

益元湯

桂苓散

當歸活血湯

加味導痰湯

加減調中飲

加減續命湯

芩連消毒湯

六神通解散

續補七方

小柴胡湯

又名和解散

人參敗毒散



五積散

葛根湯

升麻湯

獨活湯

鮮肌湯

製藥法

煎藥法

解藥法

新刻傷寒六書纂要辯疑目錄終



新刻傷寒六書纂要辯疑卷之一

閩中

童養學壯吾氏

纂輯

大梁

周亮節靖公氏

較閱

啟蒙論

凡初學醫者先熟藥性次明經絡再識病名講解脉理以証其所生之病乃可為醫病家云發熱惡寒頭項痛腰脊強則知病在陽經也身熱目痛鼻乾不得眠則知病在陽明經也胸脇痛耳聾口燥舌乾往來寒熱而嘔則知病在少陽經也腹痛咽乾手足自溫或自利不渴或腹滿時痛則知病在太陰經也引



衣踈卧惡寒或舌乾口燥則知病在少陰經也煩滿
囊縮則知病在厥陰經也潮熱自汗譫語發渴不惡
寒反惡熱揭去衣被擲足或發斑黃狂亂五六
日不大便則知病在正陽明胃腑也設若脉症不明
誤用麻黃令人汗多亡陽誤用承氣令人大便不禁
誤用姜附令人失血發狂正為寒涼傷其胃氣卒熱
損其汗液燥熱助其邪熱庸醫殺人莫此為甚蓋傷
寒之邪實無定體或入陽經氣分則太陽為首其脉
必浮輕手便得或入陰經血分則少陰為先其脉必
沉重手方得浮而有力無力則知表之虛實沉而有

力無力則知裏之寒熱中而有力無力則知表裏緩急脉有浮沉虛實症乃傳變不常治之之法先分表裏寒熱陰陽虛實標本先病為本次病為標先治其急者此為上工問症以知其外察脉以知其內全在活法不可拘於日數但見太陽症在直攻太陽見少陰症在直攻少陰見真寒症在直救真寒此為活法若同而異者明之似實而非者辨之在表者汗之散之在裏者下之利之在上者因而越之下陷者升而舉之從乎中者和解之直中陰經者溫補之若解表不開不可攻裏日數雖多再宜發汗此事不明攻之