

瘍科集案類編卷上

未1
67

第2册



徐靈胎先生瘍科論

瘍科之法全在外治其手法必傳授凡辨形察色以知吉凶及先後施治皆有成法必讀書臨症二者皆到然後無誤其升降圍點去腐生肌呼膿止血膏塗洗熨等方皆必純正和平屢試屢驗者乃能應手而愈至于內服之方護心托毒化毒長肉亦有真傳非尋常經方所能奏效也惟煎方則必視其人強弱陰陽而為加減此則必通于內科之理全在學問根柢

然又與內科不同。蓋煎方之道相同。而其藥則有某
毒主某藥某症主某方。非此不效。亦另有傳授。故外
科總傳授為主。徒恃學問之宏博無益也。有傳授則
較諸內科為尤易。惟外科而兼內科之症。或其人本
有宿疾。或患外科症之特復感他氣。或因外極內傷
臟腑則不得不兼內科之法治之。此必平日講于內
科之道。而通其理。然後能兩全而無失。若不能治其
內症。則并外科亦不救。此則全在學問深博矣。若為

外科者。參議于其間。使其藥與外症無害。而後斟酌施治。則庶幾有益。若其所現內症。本因外症而生。如痛極而昏暈。膿欲成而生寒熱。毒內陷而脹滿。此則內症皆由外症而生。則治其外症。而內症自愈。此又不必商之。內外科也。但其道甚微。其方甚衆。亦非淺學者所能知也。故外科之道。淺言之。則惟計煎方數首。合膏藥幾料。已可自名一家。若深言之。則經絡臟府氣血骨脉之理。及奇病怪疾。千態萬狀。無不盡。

識其方亦無病不全其珍竒貴重難得之藥亦無所
不備雖遇極竒極險之症亦了然無疑此則較之內
科為更難故外科之等級高下懸殊而人之能識其
高下者亦不易也



瘍科集案類編卷上

頭面

抱頭丹毒 風火襲入少陽、明頭額焮腫而為游火丹毒

羚羊角

元參

薄荷

黃芩

六一散

黑梔

連翹

桑葉

面顴毒

陽明熱勝面顴腫痛

五枯叶

丹皮

連翹

石斛

金銀花

黑梔

甘叶

額面



顧疔

顧疔走黃頭面焮腫脉細邪不外達漸有火毒內陷
神昏之險

鮮生地

地丁

連翹

丹皮

川連

石斛

黑梔

芦根

又上熱下寒走黃疔毒險症

羚羊角

鮮地

丹皮

黑梔

地丁

犀角

金黃

石斛

化下牛黃丸



又 疔毒走絡遍發流注不与風寒同例未可漫
投羌葛也

大豆卷

連翹

丹皮

甘州

鉤勾

金口花

杏仁

黑梔

當歸

又 疔後流注本以解毒為主但遍發不已理當
佐以攻逐

當歸

銀花

廣皮

山甲

甘州

製蚕

角刺

金虫

澤蘭

赤芍

肝火瘡

頭項發瘡胸痺噦惡此肝陽橫逆胃受戕賊治以泄降和陽

川連

廣皮

刺夕

半夏

一全

吳萸

白芍

鉤勾

決明

竹茹

發癰熱腫獨現頭面每遇九十月大發五六月漸愈



七八年來如是蓋夏令陽氣宣越營衛流行無間秋冬陽氣外薄氣血凝滯此濕熱漫無發泄乃少陽木火之鬱及陽明鬱蒸之濕故上焦犹甚耳法以辛涼佐以苦寒俾陽分鬱熱得疎庶幾發作勢緩

板枯州

鮮菊葉

苡仁

山梔

羚羊角

鮮荷邊

一盞

苦丁茶

面游風

陽明脈絡已空厥陰陽氣易逆風勝則腫熱勝則燥面發游風喉舌乾涸心胸填塞不肌不納無非陽化

內風胃受衝侮有年久恙頗慮癰中

羚羊角

元參

丹皮

連翹

黑山梔

天麻

杭菊

花粉

顧骨疽

操持思慮五志之陽亢逆陽氣化風上旋變幻不已

耳鳴齒痛右頰堅腫色白推之不肯移動此情志中

病藉區、州木之功焉能暢達情懷惟宜自愛為佳

明天麻

決明

丹皮

連翹

歸身

茯神

刺夕

鉤、



毒濁上干

頭痛鼻塞每值陰雨則遍體節骸皆痛延及一載有
餘思頭為諸陽之位諸陰寒邪不能上侵惟陽氣窒
痺濁邪得以上踞今痛久有高突之狀似屬客邪蒙
閉清竅然按之則痛緩身無寒熱其為陽虛濁邪阻
塞可知矣議搜逐血絡宣通陽氣淡食安閒百日望
愈

以芎

當歸

半夏

南星

全虫

蜂房

細辛

姜汁

頭面

腦疽

腦疽幾及三候根盤板滯膿水清稀神識時糊脉虛
細數此症虛不能化毒、反陷入于裡擬姑扶心托
毒望其轉机為幸

芡苳

金銀花

連翹

赤芍

菖蒲

洋參

丹皮

當歸

珠黃散二服

又腦疽寂怕三陷變局謂火陷乾陷虛陷也茲瘍
經三候忽面赤喘促肢冷汗出金屬少陰失藏真陽



外越勢有孤城失守之虞王先生同議且陽救逆法
稀圖幸于萬一

人參

炙艸

熟附

白芍

北味

黃芪

乾姜

炙神

大頭瘟

週歲內未得穀味精華溫邪吸入上焦先受頭面願

頤浮腫邪與氣血混處刀針破傷經絡溫邪內閉熱

壅漫延三焦昏寐痰潮舌刺卷縮小溲點滴混濁熱

氣錮結在裡但羔連苓梔之屬藥性直降竟由胃達



張誤作脹

腸而熱氣如烟如霧原非形盾可蕩可掃故牛黃產
自牛腹原從氣血而成混處氣血中邪藉此破其蘊
結是得效之因由也夫溫熱特癘上行氣分而延及
于血分非若傷寒足六經順傳經絡者大抵熱氣鳴
脹必薰塞內竅故昏蹠皆裡竅之欲閉欲宣內閉須
得芳香議用紫雪丹三分



耳目

耳癰

溫邪上鬱耳聾右脹

舊荷

馬勃

桔梗

連翹

杏仁

通草

桑葉

風火相搏頭痛目赤耳膿

羚羊

犀角

黃芩

連翹

杭菊

杏仁

苦丁茶

桑葉

暑熱上鬱耳脹作痛欬喘當清氣熱

耳目



杏仁

沙參

沒竹葉

通州

連翹

象貝

六一散

風木之鬱耳聾作痛

羚羊

玄枯州

黑山梔

為奇

連翹

苦丁茶

香附汁

先起咳嗽繼則耳聾脹痛延經百日不愈此體質陰

虧觸入風溫未經清理致外因傷及陰分少陽水火

陡起故入暮厥痛愈劇當先清降再議育陰

