

女科證治準繩卷之四

金壇王肯堂輯 門人新安閔承詔校

胎前門

求子

胡氏孝曰男女交姤其所以凝結而成胎者雖不離乎精血猶爲後天滓質之物而一點先天真一之靈氣萌于情欲之感者妙合於其間朱子所謂稟於有生之初悟真篇所謂生身受氣初者是也醫之上工因人無子語男則主於精語女則主於血著論立方男以補腎爲要女以調經爲先而又參之以補氣行

氣之說察其脉絡究其虧盈審而治之夫然後一舉可孕天下之男無不父女無不母矣

診脉 陳楚良曰人身氣血各有虛實寒熱之異惟察脉可知舍脉而獨言藥者妄也脉有十二經應十二時一日一周與天同運循環無端其至也既不宜太過而數數則熱矣又不宜不及而遲遲則寒矣不宜太有力而實實非正氣能自實也正氣虛而火邪來乘以實之也治法先當散鬱以伐其邪邪去而後正可補也不宜太無力而虛虛乃正氣正血虛也治法惟當補其氣血耳亦有男婦上熱下寒表實裏虛而

未得子者法當臨睡時服涼膈之藥以清其上每晨
食未入口時服補藥以溫其下暫進升散之藥以達
其表又服厚味之藥以實其裏又有女人氣多血少
寒熱不調月水違期或後或先白帶頻下而無子者
皆當診脉而以活法治之務欲使其夫婦之脉皆和
平有力不熱不寒交合有期不安用精必能生子子
不殤夭故欲得子者必須對脉立方因病用藥
仲男子脉浮弱而濇爲無子精氣清冷 **脉**婦人少
腹冷惡寒久年少者得之此爲無子年大者得之絕
產 脉微弱而濇年少得此爲無子中年得此爲絕

產人肥人脉細胞有寒故令少子其色黃者胸上有
寒少陰脉浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮傷
浮則亡血絕產惡寒

調經 婁胎前之道始於求子求子之法莫先調經每
見婦人之無子者其經必或前或後或多或少或將
行作痛或行後作痛或紫或黑或淡或凝而不調不
調則血氣垂爭不能成孕矣詳夫不調之由其或前
或後及行後作痛者虛也其少而淡者血虛也多者
氣虛也其將行作痛及凝塊不散者滯也紫黑色者
帶而挾熱也治法血虛者四物氣虛者四物加參芪

滯者香附縮砂木香檳榔桃仁玄胡滯久而沉痼者
吐之下之脉證熱者四物加芩連脉證寒者四物加
桂附及紫石英之類是也直至積去滯行虛面然後
血氣和平能孕子也予每治經不調者只一味香附
末醋為丸服之亦百發百中也 素問云督脉生病
女子不孕

婦人經事不調卽非受孕光景縱使受之亦不全美
宜服六味地黃丸

熟地黃

肆兩

山茱萸肉

山藥

各貳兩

牡丹皮

白茯苓

各壹兩
伍錢

澤瀉

香附米

童便浸叁次炒各壹兩

蘄艾葉

去筋醋煮伍錢

右爲末煉蜜丸如梧子大每服柒拾丸白沸湯送下隨後證作湯使或另作煎劑服

經水過期者乃血虛也宜四物湯加參芪陳皮白朮服之若肥白人是痰多宜二陳加南星蒼朮滑石芩歸香附之類經水不及期者血熱也四物加芩連肥人亦兼痰治色紫黑者同血熱論經將行而作疼者氣滯也用歸身尾香附米及桃仁紅花黃連以行之或加四物義朮玄胡索木香熱加黃芩柴胡經行後作疼者血氣虛也八物湯

丹婦人肥盛者多不能孕育以身中有脂膜閉塞子宮以致經事不行瘦弱婦人不能孕育以子宮無血精氣不聚故也肥人無子宜先服調理藥

當歸壹兩酒洗

茯苓貳兩

川芎宋錢半

白芍藥

白朮

半夏湯洗

香附米

陳皮

甘艸各壹兩

作十貼每貼薑叁片水煎吞後九子

白朮貳兩

半夏麴

川芎

香附米各壹兩

神麴炒

茯苓各半兩

橘紅肆錢

甘草貳錢以上並為末

粥丸每服捌拾丸如熱多者加黃連枳實各壹兩服

前藥訖却服後蝨斯丸

附子

茯苓

各陸錢

厚朴

杜仲

桂心

秦艽

白薇

半夏

乾薑

牛膝

沙參

各貳錢

人參

肆錢

細辛

伍錢

右爲末煉蜜和丸小豆大每服五丸空心酒下加

至拾丸不妨覺有娠三月後不可更服忌食牛馬

肉則難產當出月

按此方即秦桂丸也丹溪忌服之者盖忌於瘦人
無血者若肥人濕多者又兼前調理藥而所服丸
數十減其丸只服五分無妨也上三方得之於丹
溪之子朱懋誠者累試有效

抑氣散 治婦人氣盛於血所以無子尋常頭眩暈

膈滿體疼怔忡皆可服

香附子

炒淨
貳兩

陳皮

焙貳
兩

茯神

甘草

炙各
壹兩

右爲細末每服貳叁錢不拘時白湯調下

海大五補丸

瘦人
無血

天門冬

麥門冬去心

菖蒲

茯苓

人參

益智

枸杞子

地骨皮

遠志肉

熟地黃各等分

右為細末煉蜜丸如桐子大空心酒下參拾丸服
本方數服後以七宣丸泄之

增損三才丸

天門冬酒浸去心

熟地黃酒蒸

人參去蘆

遠志去骨

五味子

茯苓酒浸

鹿角酥炙

一法加白馬莖酥炙

一法加麥門

冬令人有力

一法加續斷以續筋骨

一法

加沉香煖下焦虛冷

右爲細末煉蜜和杵千下丸如桐子大每服伍拾

丸空心好酒下年老欲補加混元衣全個入藥混元

衣者是胎衣頭生兒者方佳用酒浸晒乾細剉爲末

紫石門冬丸

又名紫石英丸

紫石英

鍾乳石

鷺管通明者二味各七日研之得上浮卽熟

天門冬

已上各參兩

當歸

芎藭

紫葳

卷柏

肉桂

乾地黄

牡蒙

禹餘糧煨醋淬

石斛

辛夷

已上各
貳兩

人參

桑寄生

續斷

細辛

厚朴

薑製

乾薑

食茱萸

艾葉

白薇

薯蕷

烏鰂骨

甘艸

炙已上各
壹兩半

栝子仁

壹兩

右件搗羅為末煉蜜丸如梧桐子大酒服拾丸三
日漸增至叁拾丸以腹中熱為度不禁房室夫行
不在不可服禁如藥法比來服者不至盡劑即有
娠此方舊用烏頭牡丹牛膝據藥證此三物俱
墮胎求子藥中用之蓋胎未著之時若服之已著

已著而未覺服之未已反為害也今悉去之增鐵
乳艾葉白薇茲無疑矣

白薇九 治婦人無子或斷緒上熱下冷百病皆主
之

白薇

熟乾地黄

川椒

去目及閉口
者微炒出汗

白龍骨

已上各
壹兩

麥門冬

去心焙
壹兩半

藁本

卷栢

白芷

覆盆子

桃仁

湯浸去皮尖雙
仁麩炒微黃

人參

桂心

菖蒲

白茯苓

遠志

去心已上
各半錢半

車前子

當歸

剉微
炒

芎藭

蛇床子

細辛

乾薑

炮製各半兩

右件藥杵羅爲末煉蜜爲丸梧子大每服叁拾丸
空心日午以溫酒下叁拾丸予之故友江君雅曾
仲容俱無嗣因以此方贈之踰年而皆有子後有
艾君肅黃翰公者亦然故述之

趙氏菴蓉兔絲子丸

肉菴蓉

壹兩叁錢

覆盆子

蛇床子

川芎

當歸

兔絲子

各壹兩貳錢

白芍藥

壹兩

牡蠣

鹽泥固濟服

烏賊魚骨

各別錢

五味子

防風各陸錢

條芩伍錢

艾葉叁錢

此方不寒不熱助陰生子前藥俱焙乾為末煉蜜
丸如桐子每服叁肆拾丸清鹽湯下早晚皆可服
加味香附丸男服聚精丸女服此

香附壹斤四兩老酒浸兩宿炒搗碎再焙乾磨為末

便浸同上
煎濃汁去渣入香附浸同上

澤蘭淨葉陸兩洗
海螵蛸陸兩搗碎炒
當歸肆兩酒洗

川芎叁兩
白芍藥肆兩炒
懷熟地捌兩搗膏焙乾

各為末用浮小麥粉酒醋水打糊為丸如菜豆大

每日早晚服兩次忌食萊菔及牛肉生冷

調經丸

香附

半斤童便酒醋各浸一分

川杜仲

薑汁炒半斤

大川芎

白芍藥

當歸

去尾

懷生地

廣陳皮

小茴香

酒炒

延胡索

器炒

肉蓯蓉

酒浸

舊青皮

麴炒

台烏藥

炒

枯黃芩

酒炒

烏賊魚骨

炙

以上各肆兩

右十四味足秤真正好料醋和麵打糊為丸如梧

桐子大每服百丸空心好酒送下一方無陳皮

地黃有人參黃耆各貳兩

正元丹 調經種子

香附

壹斤同艾參兩先以醋同浸壹宿然後分開製之酒鹽酥重便各製四兩

阿膠

蛤粉炒貳兩

枳殼

肆兩半生用半麩炒

懷生地

酒洗

熟地

酒浸

當歸身

酒洗

川芎

炒各肆兩

白芍藥

捌兩半生半酒炒

加白茯苓琥珀治帶

末之醋糊丸如桐子大空心鹽湯吞伍陸拾丸

子和戴人過譙都營中飲會有一卒說出妻事戴人

問其故荅曰吾婦為室女時心下有冷積如覆盆按

之如水聲以熱手熨之如水娶來已十五年矣恐斷