

未
646

外科真论
下



白駁風

白駁風生於頸面延及遍體其色駁白形如雲片亦無痛痒由風邪搏於皮膚氣血失和而成宜先用山甲片刮患處至燥痛取鰻魚脂塗之自效若日久甚者宜內服浮萍丸治之

浮萍丸

背浮萍

取大者洗淨置簞墊上安水盆上晒乾研末煉蜜爲丸

梔子大每服二錢用豆淋酒送下

豆淋酒用黑豆半



升炒烟起冲入好酒三升浸一日夜去豆取酒

癰瘍風

癰瘍風生於頸項胸腋之間其色紫白點點相連亦無痛痒較
白駁形圓不延蔓開大由風邪鬱熱皮膚居久不散而成宜內
眼蒼耳膏外用羊蹄草根共硫黃醃於錢鐵片上研濃汁日塗
三三次自效

蒼耳膏

蒼耳草 鮮者連根帶葉取二十斤洗淨切碎入大鍋內



內煮爛取汁絹濾過再熬成膏磁罐盛之川時以桑木
匙挑一匙噙口內用黃酒送下服後有風處必出小瘡
如豆粒大此風毒出也刺破出汁盡即愈

丹毒

丹毒肌表忽然變赤如丹塗之狀是症有紅白乾濕痒痛之殊
用藥宜分表裏補瀉之異如色赤而乾發熱作痛者即名赤遊
丹屬心肝之火宜內服消丹飲治之外用芸臺葉汁調青代末
刷之或用側柏葉汁調亦可色白而濕爛流黃水痒痛不時者

名水丹又名風丹屬脾肺濕熱宜內服桑白分解散治之又有
痒而搔之起塊成餅成片皮色不變者名爲冷癩宜內服烏藥
順氣散治之或服霍香正氣散外以只殼煎湯浴之

丹毒有由胃氣虛極致令虛火遊行於外而發者治宜補以降
之用人參五錢當歸白朮各一錢半水煎服之

又女子十五六歲經脉未通者多發丹疹此由血有風熱乘之
也治宜涼血虛則補之慎投風藥

丹毒本於火邪其勢暴速自胸腹走於四肢者順從四肢攻於
胸腹者逆

消丹飲

元參 一兩
升麻 一錢
麥冬 三錢
桔梗 一錢
丹皮 二錢

牛子 二錢
甘草 七分
淡竹葉十片引

桑白分解散

桑皮 三錢
米仁 一兩
宅瀉 二錢
升麻 一錢
花粉 二錢

猪苓 二錢
神麴 一錢
甘草 五分
陳皮 七分

烏藥順氣散

台烏 一錢
橘紅 一錢
只殼 七分
白芷 一錢
桔梗 一錢

防風 一錢
僵虫 一錢
獨活 五分
川芎 一錢
甘草 五分



南京中医药大学图书馆版权所有

生薑一大片引

焦香正氣散

藿香

白朮

白芷

枳實

紫蘇

陳皮

半夏

伏毛

伏苓

厚朴

甘草

生薑

棗子

和筋箭

枯筋箭一名肱子多生手足胸乳之間初起如赤豆枯則微槁日久破裂鑽出筋頭蓬鬆枯槁如花之蕊由肝失血養筋氣外



發而成筋帶細小者用蛛絲扎之七日後其患自落若眼反腫
小者用銅錢套眦子上以艾火灸之自可脫落倘日久瘡口翻
空者宜用六味地黃丸滋腎水生肝血方爲盡善

瘡疽

瘡疽附着筋骨重按微痛五七日後毒勢湧出浮腫次變青色
如拳打之狀寒戰似瘧頭顱口偏手足厥逆黑睛緊小乃山嵐
瘴氣伏藏筋骨之間所致始見青色時急用砭法令出惡血外
用冲和膏刷之內服不換金正氣散加羚羊角以洩邪毒潰後

得黃白膿者順出黑汁者險

冲和膏

見上卷

不換金正氣散

蒼朮

厚朴

陳皮

藿香

半夏

甘草

生薑

棗子

翻花瘡

翻花瘡潰後瘡口努肉突出其狀如菌頭大蒂小愈努愈翻雖
不大痛大痒誤有觸損流血不止搥山肝虛血燥怒氣而成宜



北京中醫藥大學圖書館版權所有

服加味道遙散外用烏梅煨灰輕粉等分研末撒之自效

加味道遙散

見上卷

血風瘡

血風瘡生於遍身形如粟米搔痒無度破流脂水浸淫成片令人煩燥口干日輕夜甚宜內服地黃飲外用雄黃解毒散搗之兼忌椒酒雞鷲動風等物自效

地黃飲

生地

三錢

熟地

三錢

當歸

二錢

丹皮

錢五

生首烏

三錢



北京中医药大学图书馆版权所有

元參 錢五分 七厘 錢五分 僵虫 錢五分 云苓 三錢 生甘草 五分

紅花 五分

雄黃解毒散

明雄 一兩 煨寒水石 一兩 生白礬 二兩

共研末滾水調刷 或用黃連汁調更佳

瘡癰

瘡癰俗名鬼飯疔瘡山表虛之人汗出當風或露臥乘涼風邪侵襲所致初起皮膚作痒次發扁疔瘡形如豆瓣堆疊成片日



痒甚者宜服秦艽牛子湯夜痒重者宜當歸飲子服之外用麝
酒浸百部以藍布蘸酒搗之謹避風涼自效

秦艽牛子湯

秦艽

牛子

只殼

防風

紫葉

杏仁

元參

犀角

黃芩

升麻

甘草

當歸飲子

當歸

生地

白芍

川芎

首烏

防風

荊芥

七厘

甘草

天泡瘡

天泡瘡初起白色燎漿水泡小如芡實大如棋子延及遍身疼痛難忍由肺受暑熱穢氣伏結而成故名肺疽發於暑熱時者宜內服香茹飲氣虛者宜合生脉飲服之 此症上體多生者屬風熱盛宜服解毒瀉心湯下體多生者屬濕熱盛宜服潰脾甘露飲未破者用馬齒莧汁同猪胆汁刷或菊花根葉汁同猪胆調刷亦可已破者外用石珍散撒之毒氣入囊者不治有種天行斑瘡須臾遍身皆戴白漿此惡毒氣永徽四年此瘡自西域東流於海內但煮食葵菜葉以蒜蘸啖之即止

香菇散

香菇

厚朴

扁豆

黃連

水煎冷服

生脉飲

人參

麥冬

北五味

解毒瀉心湯

黃連

牛子

防風

荊芥

黃芩

梔子

元參

木通

石羔

知母

滑石

甘草

燈心引

清脾甘露飲

小斗直金

卷六

天泡瘡

火赤瘡

七



北京中医药大学图书馆版权所有

蒼朮

赤苓

芎藭

茵陳

梔子

麥冬

生地

只殼

連翹

枇杷葉

黃芩

甘草

石珍散

煨石膏

一兩

掃盆粉

五錢

洋青代

三錢

生黃柏

三錢

共研細末摻

火赤瘡

火赤瘡初起赤色燎漿膿泡黃水浸淫痛如火燎宜內服防風



北京中醫藥大學圖書館版權所有

升麻湯外用清涼汁塗之

防風升麻

見上赤膈

清涼汁

黃連

黃芩

黃柏

梔子

薄荷

桔梗

貝殼

甘草

各用五錢水煎濃汁去渣

研水片三分元寸二分末和入以鷺翎醮掃患處

火珠瘡

火珠瘡四畔紅赤中藏明亮如珠焮痛如烙始於髮中相染不

已乃心肝二經積熱熾盛而成宜內服解毒瀉心湯外用生蘿
蔔搗汁入醋少許和勻搗之

解毒瀉心湯 見上天泡瘡

貓眼瘡

貓眼瘡一名寒瘡每生於面及遍身由脾經久鬱濕熱復被外
寒凝結而成初起形如貓眼光彩閃爍無膿無血但痛痒不常
久則近脛宜內服清肌滲濕湯外用雄黃解毒散搗之兼多食
魚雞薤蒜自愈惟鮎鯉蝦蟹不可食

