

改良

雜病十篇卷十三
頁

諸傷
解毒
救急
怪疾
婦人

頁



訂正東醫寶鑑雜病篇卷之九

御醫忠勤貞亮扈 聖功臣崇祿大夫陽平君臣許浚奉教撰

諸傷

金刃傷

金瘡腸斷者視病淺深各有生死腸一頭見者不可連也若腹痛短氣不得飲食者大腸一日半死小腸一日死腸兩頭見者可速續之先以針縷如法連續之斷腸便取雞冠血塗其斷處勿令氣泄

推納之但出不斷者作大麥粥取汁洗腸以漬納之且作粥清稍飲之二十餘日乃吃糜粥百日後乃可進飯(病源)○金瘡失血其人當苦渴然須忍之常令乾食可與肥脂之物以止其渴又不待多

飲粥則血溢出殺人也又忌噎怒及大言笑動作勞力及食鹹酸熱酒熱羹輩皆使瘡痛衝發甚者即死(聖惠)○凡金瘡及折傷不可飲冷水血見寒則凝入心即死(丹心)

不治證

十不治證凡被傷入於肺者縱未即死二日難過○左脇下傷透內者○腸傷斷一半可醫全斷不可治○小腹下傷內者○證候繁多者○脈不實重者○老人左股壓碎者○傷破陰子者○

血出盡者○肩內耳後傷透於內者皆不必用藥(得效)○凡金瘡傷天竅(穴名)眉角腦後臂裏跌脈脾內陰股兩乳上下心鳩尾小腸及五藏六府愈皆死處又破腦出髓而不能語戴眼直視喉中沸

聲口急唾出兩手妄舉皆不治(聖惠)

金瘡脈候

金瘡出血太多其脈虛細者生數實者死○金瘡出血脈沈小者生浮大者死斫刺出血不至脈來大者七日死滑細者生(脈經)○金瘡出血虛細則宜實大則傾(得效)○傷雖淺命脈虛促

可慮傷至重命脈和緩永無慮也○血出甚者脈不要洪大只要平正重實(得效)

腸肚傷治法

肚破腸出在外若腸全斷難醫不斷者可治○腸及肚皮破者麻縷為線或桑白皮尖茸為線以花蕊石散付線上從裏縫之腸子則以清油擦活放入肚內乃縫肚皮不可縫外重皮

留皮開用藥糝待生肉(得效)○傷破肚皮腸與脂膏俱出先用湯藥如活血散佛手散(即芎歸湯)與服用手擘去膏不妨此是開肉放心去之然後推腸入內用線縫之仍服通利藥勿令二便秘澀

得效)



金瘡先宜調血 大凡金瘡及折傷墜內損者必有瘀血傷積先宜逐去瘀血若亡血過多則調養氣血為主(正傳)○花蕊石散奪命散雞鳴散導滯散破血消痛湯復元活血湯皆可選用

諸方)

止血牛肌合瘡藥 傷至重者海味中鹹白鰓成片鋪在傷處以帛托定血立止(得效)○止血散白膠香老松皮白芷血竭為末付之單血竭末付之尤妙○黃丹滑石末付之夏月以薄荷葉貼之一日一次以藥水湯洗(得效)○金傷散糝付神效(集要)○金瘡血不止黃丹白礬為末糝之又下子蠶蛾燒灰付之(聖惠)○下蠶室瘡不合取所割勢火煨為末酒調服昔有一人自創其勢瘡久不合用此方不數日而愈(入門)

箭鏃及金刃中骨脉不出 白欬半夏等分為末每取一錢淡薑湯調服日三至二十日自出(入門)○箭鏃及針入肉不出象牙屑和水塗其上又螻蛄取汁頻塗又鼠腦塗之又好磁石著其上自出(聖惠)

救急方 金瘡及諸傷重痛悶欲死取牛一隻剖腹納其人于牛腹侵熱血中可甦如傷腹用血竭末醋湯調飲出血而愈或戰陣砲矢所傷血流滿體氣貫胸膈悶絕者亦甦(入門)○傷重暈絕不省入熱尿多灌即甦童尿尤好(丹心)

活血散 治刀鎗傷腹裂腸出者黃芪當歸川芎白芷續斷赤芍藥鹿茸黃芩細辛乾薑附子炮各等分右為末每三錢溫酒調服日三立驗(入門)

花藥石散 治一切金刃斫傷及打撲損傷牛馬咬踢或至死者急於傷處糝藥其血化為黃水再服藥便活更不疼痛如藏府有瘀血內損煩悶欲死服此藥則化為黃水或吐出或下泄出花藥石四兩硫黃一兩為末入瓦罐內鹽泥固濟晒乾安四方塲上以炭火從巳午時煨至經宿候冷取出研細每取一大匙童尿入酒煎熱調服(入門)

奪命散 治金刃所傷及從高墮落木石壓損瘀血瘀積心腹痛二便不通水蛭以石灰拌炒焦五錢大黃黑牽牛頭末各二兩右為末每取二錢熱酒調下過數時無效再用一服以下惡血為度(得效)

雞鳴散 治金刃傷打撲傷血瘀凝積煨悶欲絕大黃酒蒸五錢當歸尾三錢桃仁二七粒研右剉作一貼酒煎雞鳴時服次日下瘀血即愈治折傷亦妙(三因)

導滯散

治傷損內有瘀血大便不通壅鬱欲死大黃一兩當歸二錢半麝香少許右爲末每三錢熱酒調下(聖惠)

破血消痛湯

治傷損墮落惡血流於脇下痛楚不能轉側水蛭炒烟盡別研三錢柴胡連翹當歸各一錢蘇木一錢半羌活防風桂皮各一錢麝香少許右除水蛭麝香外餘藥剉作三貼酒水相

半煎去滓入蛭麝調服
空心兩貼立愈(東垣)

復元活血湯

治同上大黃二錢半當歸一錢七分柴胡一錢半穿山甲炒研瓜蒌根甘草各一錢桃仁十個爲泥紅花五分右剉作一貼酒水相半煎服(寶鑑)

金傷散

治一切金瘡重午日早朝使四人各出四方採艸木莖葉各半把至日午時入石灰一斤同搗爛鑿大桑木三兩株作孔納藥實築以桑皮蔽之油調石灰密塗之勿令泄氣更以桑皮填固至

九月九日午時取出陰乾百日搗羅爲末如遇傷慘之神效(御藥)

單方凡二十四種

新汲水

人被金瘡及損傷腸出以新汲泉水噴之令身噤腸自入也(本草)

石灰

療金瘡甚良人爲金刃所傷以石灰末裹之定痛止血神效○又石灰和雞子白火煨爲末付瘡立差(本草)

葛根

療金瘡止痛爲末付之又濃煎取汁服之(本草)

桑白皮

可以縫金瘡取生皮作線縫腹破腸出者唐安金藏剖腹用此法便愈○神仙刀箭藥妙不可言桑葉爲末乾穆之○金瘡止痛桑柴灰付之佳(本草)

蟻蛭

箭鏃在咽喉胸膈不出蟻蛭搗取汁滴上三五度自出○針入肉不出蟻蛭腦同硫黃研付覺癢針自出(本草)

蟻蛭

箭鏃入骨不可拔微熬巴豆與蟻蛭同研勻塗傷處待極癢便撼動拔之立出後以生肌膏貼之○出箭鏃方蟻蛭全者麝香少許同爲末撥動箭頭藥瘡內自出(本草)

旋菖根

即旋花根也合金瘡續斷筋取根搗汁滴瘡中滓封瘡上妙(本草)



象芽 主箭鏃及針入肉不出爲末和水付瘡上即出舊牙梳尤佳(本草)

蝙蝠 主金瘡出血內漏取二枚燒爲末每一錢和水服令一日服盡當下如水乃血消也(本草)

黑虱 主箭頭入肉不出取頭上黑虱及人牙齒同研塗之即出(本草)

蔥 治金瘡因驚出血不止取蔥炙熱授取汁付之血即止○金瘡中風水腫痛惡莖葉煨研罯付立愈(本草)

小麥 主腸出不入小麥五升水九升煮取四升去滓令極冷使人含嚙瘡上又嚙其背腸漸自入勿令衆人見(本艸)

石榴花 治金瘡血流不止石榴花和石灰搗爲末糝之血便斷(本草)

壁錢 主金瘡血不止取汁點瘡上良(本艸)

鼠腦肝 治箭鏃及針刀在咽喉胸膈諸隱處不出取出生鼠腦及肝搗付之即出(本艸)

紫檀香 治金瘡急刮紫檀末付之止血止痛至妙(本草)

血竭 療金瘡止血止痛生肌最妙刮屑付之但性急不可多用(入門)

琥珀 止血生肌合金瘡作末付之○中弩箭悶絕琥珀末一錢童尿調服妙(本草)

蛇含草 主金瘡搗付之佳○又云蛇含膏連已斷之指(本草)

青蒿 生授付金瘡止血止痛生肌最妙(本草)

熟艾 楊金瘡止血止痛易合或煎湯或熏烟亦好(俗方)



小薊 主金瘡血不止 按葉封之(本草)

藍葉汁 金瘡血悶取藍汁飲之(本草)

車脂 針入肉不出取車軋脂攤紙上卷之 二日一換三五次自出(本草)

癰撲墮落壓倒傷 凡墮壓死者急安好處以袖掩其口鼻上一食頃候眼開光與熱小便數若初覺氣絕急擊開口以熱小便灌之利去瘀血(得效)○卒墮癰撲倒打死心頭溫者皆可救將本

人如僧打坐令一人將其頭髮控放低以半夏末或皂角末吹入鼻內如活却以薑汁灌之打勻灌之(綱目)○若取藥不及急扶開口以熱小便多灌之(入門)○人為刀斧所傷或墮落險地或撲身體

損傷筋骨皮肉皆出血不止或瘀血停積若去之不早則有入腹攻心之患(醫鑒)○跌撲傷損須用蘇木活血黃連降火白朮和中以童便煎服妙傷在上宜飲韭汁(丹心)○凡癰打壓傷或從高墮落

皆驚動四肢五臟必有惡血在內專怕惡心先用通二便藥和童便服之立效大小腸俱通利則自無煩悶攻心之患矣(得效)○凡傷損主血論肝主血不問何經所傷惡血必歸於肝流於脇鬱於腹

而作脹痛實者下之宜通導散桃仁承氣湯(方見寒門)奪命散(方見上)○虛者復元活血湯(方見上)當歸鬚散調之(入門)○凡出血已多而又嘔血不止者難治宜用蘇木煎湯調蚌霜散服之

入門)○諸傷疼痛宜乳香定痛散乳香散雙烏散尋痛丸陣王丹補損當歸散(諸方)○蘇合香丸治打撲墮落挾驚悸氣血錯亂昏迷不省急取三五丸溫酒童便調灌即甦(方見氣門)○得效)○頭

上有傷或打破或金刃傷用藥糊角縛不使傷風慎之(得效)

通導散 治傷損極重大小便不通心腹脹悶宜用此下瘀血大黃芒硝各二錢當歸蘇木紅花桃仁各一錢厚朴陳皮木通枳殼甘草各五分右剉作一貼水煎空心服(醫鑑)○一名大成湯(醫林)

當歸鬚散 治打撲損傷致氣凝血結胸腹脇痛當歸尾一錢半赤芍藥烏藥香附子蘇木各一錢紅花八分桃仁七分桂皮六分甘草五分右剉作一貼酒水相半煎服(入門)

蚌霜散 治傷損大吐血蚌粉百草霜各等分右為末每二錢糯米飲調服(入門)

乳香定痛散 治諸傷損疼痛白芷當歸生牡丹皮赤芍藥川芎乳香沒藥白朮甘草各等分右為末每二錢溫酒童便各半調勻服之(入門)○一名活血止痛散(醫鑑)



乳香散治打撲傷損痛不可忍白朮炒當歸炒白芷桂皮乳香

雙烏散治諸傷百損久後時常疼痛者及新破傷作痛亦宜川烏草烏略炮各三錢當歸白芍藥各三錢黃生乾地黃紅麴炒各五錢麝香少許右爲末入瓦瓶以酒煮放冷服如覺麻痺無事但寧息

用恐太猛所以略炮(入門)

尋通丸治諸傷止痛清心行氣活血如神草烏生用乳香火熨沒藥火熨五靈脂各三錢生麝香少許右爲末酒糊丸如指頭大朱砂爲衣每一丸薄荷湯薑汁磨化服(得效)

陣王丹治諸折傷止血定痛大黃一兩石灰大兩右同炒紫色爲度去火毒搗篩爲末敷傷處妙(入門)

補損當歸散治墮撲折傷疼痛叫號服此藥不復大痛三日筋骨相連川芎一兩半桂心切散當歸甘草各七錢半附子炮澤蘭各二錢半右爲末每二錢溫酒調服效如神(局方)

打撲傷消腫滅癰凡團毆被打成破傷風頭面腫大發熱以九味羌活湯方見寒門熱服取汗用杏

或傷眼上青黑不散大黃爲末生薑汁調付患處即消名將軍膏(醫鑑)○散被毆癰痕亦治跌撲麻

油清酒各一碗同煎數沸服之服了臥火燒熱地上一夜痛止腫消無痕有被傷者仇家陰令術士以

脈候及不治證凡打撲損傷內有瘀血其脉堅強者生小弱者死(脈經)○打撲傷損去血過多脈當虛細

並不治(與上下不治證參看)○入門○如傷藏府致命處一觀其脉虛促危矣(得效)

單方凡十七種

蒲黃治撲損瘀血在內煩悶蒲黃末三錢熱酒調下(得效)

白楊樹皮治撲損瘀血痛不可忍取樹皮酒漬服之(本草)



生龜治撲損痿折取血和酒飲之肉生研厚塗傷處立效（本草）

蟾蜍主打撲腕折血在脇下堅滿痛取汁和酒服又研付傷處（本草）

鼠屎治落傷筋骨痛不可忍取屎燒爲末豬脂調急裹之不過半日愈（本草）

荷葉治打撲落傷惡血攻心悶亂乾葉燒爲末熱童尿調下二錢日三○未展荷葉爲末童便調服利下惡物（綱目）

胡桃壓撲傷損胡桃肉搗爛和溫酒頓服便差（本草）

麻根主打撲落傷腕折有瘀血痛不可忍取根反葉搗取汁飲或煮服之非時則取乾麻煮汁飲（本草）

稻稈灰治墮落撲損痛楚稻稈燒灰和糟酒淋灰取汁乘溫淋洗痛處立差（本草）

芥子撲損瘀血作痛芥子和生薑研微煖塗貼患處即效（本草）

蔥白治打撲傷損痛不可忍取蔥白入爐火煨乘熱擘開其中有涕便將罨損處冷則易熱者須臾痛定（本草）○又蔥白砂糖等分爛研付之痛立止且無癰痕（丹心）

人尿主撲損落傷瘀血攻心暈絕熱尿頓服一二升即甦童子尿尤佳（本草）

烏雞被壓窄墮舟舩車轆馬蹄牛觸胸腹破陷四肢摧折氣悶欲死烏雞一隻合毛杵一千下和苦酒一升得所以新布搗病處取藥塗布上罨定乾則易覺寒振欲吐不可去藥須臾復上一雞神效（本草）

草

烏鴉治墮落損傷瘀血脹心面青氣短取右翅羽七枚燒灰和酒服當吐血便差（本草）

犬膽治撲損刀箭傷內有瘀血取胆熱酒調服瘀血盡下（本草）○犬屎燒存性爲末熱酒調下二三錢亦有奇效（俗方）



酒糟 主打撲墮落損傷瘀血腫痛酒糟和醋滓蒸溫熨之妙(俗方)

水蛭 主墮撲落傷折傷內有瘀血水蛭炒焦爲末入麝香少許每一錢熱酒調服當下瘀血(本草)

骨折筋斷傷 凡脚手各有六出曰四折骨每手有三處出曰脚亦三處出曰手掌根出曰其骨及五處出曰其骨若出外則須搦入內若出內則須搦入內若出內則須搦入內若出內則須搦入內

方入窠曰只用手拽斷難入窠十有八九成痼疾也(得效)○骨節損折肘臂腰膝出曰其骨及五處出曰其骨若出外則須搦入內若出內則須搦入內若出內則須搦入內

整頓歸元先用麻藥與服使不知痛然後可用手法(得效)○骨節損折肘臂腰膝出曰其骨及五處出曰其骨若出外則須搦入內若出內則須搦入內若出內則須搦入內

板夾定一邊不用夾須存屈直處時時拽屈拽直不然則愈後曲直一得(得效)○凡骨碎者用接骨藥火上化開糊骨自然銅散接骨紫雪丹

用麻藥(即草烏散)與服或用刀割開甚者用剪剪去骨鋒使不衝破肉或有粉碎者用去細骨定用夾骨法活血散接骨丹二生膏糯米膏內服麥斗散沒藥降聖丹接骨散自然銅散接骨紫雪丹

淋洗用蔓荊散 (諸方) 卽麻藥也凡骨節出曰用此麻之然後用手整頓皂角木鼈子紫金皮白芷半夏烏藥當歸川芎

卽麻藥 卽麻藥也凡骨節出曰用此麻之然後用手整頓皂角木鼈子紫金皮白芷半夏烏藥當歸川芎者每服二錢好紅酒調下麻倒不識痛處然後或用刀割開或剪去骨鋒以手整頓骨節歸原用夾夾

定然後醫治如箭鏃入骨不出亦用此藥麻後或鉗出或整開取出然後取鹽湯或鹽水與服立醒(效得)

夾骨法 小蝦蟆四五個皮硝三分生薑一兩酒糟一椀腫者加紅內消卽紅何首烏也同擣敷折傷之處(入門)

活血散 治折傷瘀豆粉炒紫色新汲水調成膏厚付折傷處以桑皮夾定其效如神一方熱酒醋調付(得效)

接骨丹 當歸七錢半川芎沒藥骨碎補各五錢川烏煨四錢古文錢三個火煨醋滓七次乳香二錢半木香一錢黃香松脂也六兩香油一兩半右爲末和油成痛攤油紙貼患處如骨碎筋斷用此復續

如初(回春)

Copyrighted material

二生膏

治折傷手足生地黃一斤生薑四兩右搗爛入酒糟一斤炒熱布裏褰傷處熨之傷筋損骨痛不可忍神效(醫鑑)○傷損臂白脫出痛生地黃搗爛攤油紙上次移木香末一層又攤地黃貼

患處明日痛即止(得效)○治折傷斷筋損骨生地黃搗取汁好酒和服日二三次最妙又搗爛蒸熱封傷處一月筋骨連續蓋地黃屬骨(種杏)

糯米膏

治撲傷筋斷骨折糯米一升皂角切碎半升銅錢百個同炒至焦黑去錢右為末酒調膏貼患處神效(綱目)

麥斗散

治跌傷骨節土鼈一個瓦上焙巴豆一個去殼半夏一個生乳香沒藥各半分自然銅火煨醋淬七次用些少右為細末溫清酒調服一釐如重車行十里之久其骨接之有聲初跌之時須整頓

如舊以綿衣蓋覆方服藥勿轉動端午日製尤妙(回春)

沒藥降聖丹

治打撲閃胸筋斷骨折痛不可忍生乾地黃川芎各一錢半自然銅火煨醋淬十二次別研川烏生骨碎補白芍藥當歸乳香沒藥各一錢右為末薑汁與蜜等分勻每一兩作四九

每服一丸水酒各半盞入蘇木一錢同煎去蘇木調藥空心熱服(丹心)

接骨散

治骨折乳香沒藥各二錢半自然銅煨淬別研五錢滑石一兩龍骨赤石脂各一錢半麝香少許石為末好醋浸潤煮乾炒燥為末臨睡服時入麝香和勻溫酒調下一錢若骨已接去龍骨赤石

脂而服極效(丹心)○一方將藥除麝香浸酒煮乾為末黃蠟五錢熔化乃入麝和勻作丸彈子大每一丸酒煎以東南柳枝攪散空心熱服名曰接骨丹(入門)

自然銅散

治打撲筋骨折傷乳香沒藥蘇木降真香(無則紫檀代之)川烏松明節自然銅火煨醋淬七次各五錢地龍油炒龍骨生水蛭油炒焦各二錢半血竭一錢半土狗五個油浸焙右為末每

五錢好酒調下自頂心尋病處至下兩手兩足周遍身病人自覺藥力習習往來遇病處則颯颯有聲(得效)

接骨紫金丹

治跌打骨折瘀血攻心發熱昏暈土鼈(一方用土狗)自然銅火煨醋淬七次別研骨碎補大黃血竭當歸尾乳香沒藥鵬砂各一錢右為末每取八釐熱酒調服其骨自接(入門)

蔓荊散

治打落筋骨折傷瘀血結痛頑荊葉(無則荊芥代之)蔓荊子白芷細辛防風川芎桂皮丁香皮羌活各一兩右為粗末每一兩入鹽一匙連鬚葱白五莖漿水五升煎七沸淋洗痛處冷則易(丹心)

單方 凡十
四種

赤銅屑

治打撲墮落骨折傷取赤銅火煨醋淬七次或九次細研溫酒調一字或半錢服直入骨痛處有銅屑之

自然銅

療傷損骨折火煨醋淬七次研細水飛同當歸沒藥各半錢溫酒調服仍以手摩痛處(本草)○此藥新火煨者有毒若不折骨不碎骨則不可用自然銅(丹心)

合歡皮

主骨折專能接骨取以炒黑色四兩芥子炒一兩右末酒調二錢服以滓罨傷處(丹心)

生地黃

主屬骨若傷損骨碎生地黄爛搗蒸熱裹傷處日再易(本草)

續斷

治撲損瘀血能續筋骨煮汁內服外搗付之(本草)

旋菖根

即旋花根也療被斫筋斷取根搗汁灑瘡中以滓封瘡上日二三易筋便續(本草)

白蠟

屬金稟收斂堅凝之氣外科之要藥生肌止血定痛接骨續筋補虛與合歡皮同用極神效(丹心)

蟹

脚中髓及腦并殼中黃並能續斷折筋骨取碎之微熬納瘡中筋節連○筋骨折傷生搏炒罨良(本草)

蟾蜍

療腰折骨破血結取汁和酒服又搗付傷處(本草)

人中白

治閃挫跌撲傷骨極重人中白煨為末溫酒調五分服(入門)

牡鼠

療折傷筋骨生搗付傷處三日一易新能續筋骨(本草)

生栗

主筋骨折碎血瘀腫痛細嚼生栗塗付之栗楔尤好三個共一窠居中者(本草)

高苳子

主打落折傷取子微炒為末酒服二三錢能接續筋骨名接骨散(回春)



烏雄雞 主蹠折骨傷骨痛取血和酒服仍破腹餐傷處妙(本草)○又取骨末一兩自然銅末四錢和勻溫酒調下二錢空心(綱目)

療傷斷耳鼻舌

治擦落耳鼻用油髮灰末乘急以所落耳鼻蘸髮灰綴定以軟帛縛定有人為腫咬鼻一僧用此綴之神效(綱目)○自行顛仆穿斷舌心血出不止取米醋以雞翎蘸所

處其血即止仍用蒲黃杏仁鵬砂少許為末蜜調嚙化而愈(綱目)○接指方蘇木為末敷斷指斷定外用蠶蠶包縛完固數日如故(入門)○一人落馬被所佩鎖匙傷破陰囊二丸脫落懸掛未動

杖傷

凡杖畢即用童便好酒各一鍾合而溫服免血攻心甚妙實者雞鳴散(方見上)下之虛者當歸散(方見上)加柴胡羌活煎服仍用蔥白搗爛炒熟搭杖處冷則易止痛散癰如神(種杏)○又豇豆腐

鹽水煮熟鋪杖處其氣如蒸其腐即紫復換貼以色淡為度潰爛者亦宜(種杏)○痛甚者內服乳香定痛散(方見上)隨以熱酒盡量而飲外貼黃蠟膏(方見諸瘡)有血瘀壅腫先刺出惡血然後乃貼

膏藥(入門)○杖瘡只是血熱作痛用涼藥去瘀血為先須服雞鳴散之類外貼以五黃散或大黃黃栢為末生地黃汁調付之○又野苳根嫩者洗淨同鹽搗付神妙(丹心)○又鳳仙花科連根葉搗爛

貼患處乾則易一夜血散即愈(醫鑑)○又菉豆粉微炒雞子清調付之(醫鑑)○杖瘡宜服乳香散化瘀散補氣生血湯烏龍解毒散(諸方)○又藁豆粉微炒雞子清調付之(醫鑑)○杖瘡宜服乳香散絡滿急故腫且痛凡打撲著肌肉須腫痛者以經絡傷氣血不行故如是(本草)○凡杖瘡忽乾黑陷毒氣攻心恍惚煩悶嘔吐者死(入門)

五黃散

治杖瘡止痛黃丹黃連黃芩黃栢大黃乳香各等分右為末新水調成膏以緋絹攤貼傷處日三易(精要)

乳香散

治杖瘡腫痛自然銅火煨醋淬七次當歸各五錢茴香四錢乳香沒藥各三錢右末每三錢溫酒調下(精要)

化瘀散

治杖打重血上攻心煩悶蘇木當歸尾各三錢大黃紅花各二錢右為末每三錢溫酒重便調和服(醫鑑)

補氣生血湯

治杖瘡潰爛久不愈人參白朮白芍藥當歸陳皮香附子貝母桔梗熟地黃甘草各一錢右剉作一貼酒水相半煎服(醫鑑)

烏龍解毒散

治人受杖責後疔甲爛肉疼痛難忍不能起動服此痛止便能動履其效如神木耳四兩入砂鍋內炒焦存性為末右每服五錢熱酒一椀調服服後少頃其藥力行至杖瘡上從肉裏



透如針刺癢甚不時流血水即以藥水洗淨貼膏藥（回春）去疔甲取雞子清八麝香少許以銀簪打成稀水用簪尖輕輕點上不多時其疔甲化爛取去一日換貼膏藥化盡死肉不數日復平矣

打誓不痛方

未打之前先取白蠟一兩細切入碗內滾酒泡服則雖打誓不痛名寄杖散（醫鑑）

單方凡五種

蘿蔔根

治杖瘡皮不破而內損者蘿蔔根搗爛罌傷處良（種杏）

馬糞

治杖瘡入風疼痛馬或驢溼糞替換熱熨日五十遍極效（本草）

沒藥

主杖瘡腫痛不可忍細研取一錢熱酒調服妙（本草）

鼠

治打傷瘡生鼠一枚和腸肚剉油半斤煎令焦黑收之以雞羽蘸付瘡上妙（本草）

飴糖

治打損瘀血飴糖熬和酒服能下惡血（本草）

人咬傷

人咬傷成瘡龜板或鼈甲燒灰油調付（綱目）

諸獸傷

虎傷

人被虎咬先飲清油一碗又白礬為末納傷處又砂糖水調服一二碗并塗傷處（入門）○虎傷人瘡取青布緊捲燒一頭納竹筒中向瘡口令烟熏之佳（本草）○虎傷人但飲酒常令大醉當吐毛

出良（本草）○虎犬咬人杵薤取汁飲一升日三滓付傷處（本草）○虎狼傷人生雞肉食之

熊傷

熊傷人燒青布取烟熏瘡口令毒出（本草）○又煮葛根取濃汁以洗瘡十度并搗葛根為末調葛根汁服日五（本草）○熊傷人薤薹剉水漬取汁飲滓付瘡上○熊虎傷煮生鐵令有味洗之○熊



虎爪甲傷嚼生
栗付之(本草)

馬驢咬踢傷

妙(得效)○又鼠屎二七枚故馬鞭梢五寸同燒灰猪脂調付(本草)○又用艾炙傷處

取人屎或馬屎燒灰為末付之(入門)○嚼生栗付之(綱目)○又取雞冠熱血塗瘡中
或浸之(本草)○驢或馬咬人或骨刺傷取其尿洗瘡以糞塗之又飲糞汁佳(本草)

牛傷

牛觸腸出不損者急送人以桑白皮尖或生白麻為線縫合肚皮縫上糝血竭末或百草霜末血止
立活勿封罈恐內作膿(入門)○脇破腸出臭穢急以香油摸腸用手送入煎人參地骨皮湯淋之

皮自合吃羊肉羹
十日愈(入門)

犬傷

凡春夏初交犬多發狂但見其尾直下不捲口中流涎舌黑者即是狂犬若被其傷乃九死一生之
患急用針刺去血以人小便洗淨用胡桃殼半邊以人糞填滿掩其瘡上著艾灸之殼焦糞乾則易

之灸至百壯次日又灸百壯灸至三百壯為佳(千金)○風狗咬傷即先口嚼漿水洗淨或以熱人
尿淋咬處嚼生薑擦之又用蔥白嚼爛塗之又杏仁嚼爛付之以帛繫定或同馬蘭根研細蔥湯洗後

塗之尤妙(綱目)○於患人頂心中有一紅髮即當拔去後服藥快效(十二方)○一方斑貓二十一
個去頭翅足以糲米一勺先將貓七個同炒不令米赤去貓再入七個同炒貓色變去之又入七個同

炒米出青烟去貓取米研為粉冷水入清油少許空心調服(一)勺分三服少頃又進一服以小便利
下惡物為度否則再用一服利後腹痛急以冷水調青靛服或服黃連湯以解其毒否則有傷不可便

食熱物

(綱目)

犬咬毒防再發

風狗咬急用斑貓七個去頭翅足為末溫酒調服其毒必從小便中出可將尿缸盛清水
令患人尿其中停半日見濁氣凝結如狗形則毒已出如不見狗形須服七次方可無狗

形乃不再發極驗若小便澁益元散(方見暑門)水調服最妙(十二方)○狂犬咬先口嚼漿水洗淨
用玉真散(方見風門)乾貼之更不再發神效(丹心)○又仍殺所咬犬取腦付傷處後不復發(本

草)○獐犬傷或經久復發無藥可療雄黃明者五錢麝香五分右為末酒
調二錢服服後必使得睡切勿驚動任其自醒須利下惡物乃效(綱目)

狂犬傷出毒法

宜用扶危散○防風五錢大黃黑丑頭末各三錢斑貓一錢麝香三分雄黃二錢半右為
末每二錢滾水調服惡物從小便而出(入門)○狂犬傷蚯蚓糞封之出犬毛神效(本

蚘丸內若有狗毛茸然此毒氣已出措至無茸毛方乃痊可(十三方)

扶危散

治風狗咬斑貓七日內用七個七日外每日加一個十日十個百個去翅足糯米同炒滑石一兩雄黃一錢麝香一字右爲末溫酒調服不飲酒者米飲下毒從大小便出即愈(醫案)

狂犬毒入心

狂犬咬衆治不差毒攻心煩亂喚已作犬聲天靈蓋燒灰爲末水服一錢以活止(錢)本

草)○狂犬咬人發狂如犬叫蝦蟆膾食之又虎頭骨虎牙虎脛骨爲末酒調二錢服之(本草)

禁忌法

破狂犬咬人終身禁食犬肉及蠶蛹此毒再發則不可救三年之內亦忌食一切毒物及房事常食杏仁以防其毒(十三方)○犬咬傷人忌飲酒(丹心)

單方凡六

白礬

獬犬咬白礬末納瘡中止痛速愈(本草)

葛根

狂犬咬葛根搗取汁服之洗之滓付傷處(本草)

杏仁

殺狗毒作粥常食之又搗爛貼傷處最佳(本草)

野菊

主風狗咬研細酒調服盡醉止效(綱目)

草麻子

主犬咬傷取五十粒去殼研爲膏付之(綱目)

蟾蜍

即蝦蟆也主狂犬咬發狂欲死作膾食之勿令知又取後兩腿搗爛酒調服亦佳(本草)

針灸法

狂犬咬人當先針刺去惡血仍灸瘡中十壯自後日灸一壯至百日乃止忌飲酒(資生)○被狂犬咬者無出於灸只就咬牙跡上灸之一日三壯灸至一百二十日乃止常食韭菜永不再發(千金)

○常飲韭菜自然汁以滓封灸瘡永不再發(資生)○獬犬傷毒不出發寒熱速以艾灸外丘穴三壯又灸所咬之處七壯立愈(銅人)

貓傷 人爲貓所傷取薄荷葉細嚼付之○

鼠咬傷 取貓毛燒灰入麝香少許津唾調付
(入門)○又麝香塗之差(本草)

諸蟲傷

蛇咬傷 中蛇咬毒昏困五靈脂五錢雄黃二錢半爲末酒調二錢灌之以滓付患處即愈(綱目)○又雄黃細末貼瘡口立效(綱目)○又萬臣取汁和雄黃作餅子候乾爲末貼瘡口毒水流出腫痛即消

(綱目)○卒被蛇傷白礬火上熔汁滴咬處立差無白礬則速作艾炷灸五壯良(綱目)○毒蛇蟄欲死雄黃乾薑等分爲末付傷處(本草)○中蛇毒眼黑口噤欲死者嫩葉一握搗取汁溫酒和灌之滓付瘡上(本草)○又白芷末麥門冬湯調服滓付傷處(綱目)○又細辛白芷各五錢雄黃二錢麝香少許爲末每二錢溫酒調服(綱目)○又貝母爲末酒調令病人盡量飲之少頃酒自傷處爲水流

出却以滓付患處即愈(綱目)○又白礬甘艸等分爲末每二錢冷水調下(綱目)○毒蛇蟄急以熱人尿洗出血次取口中唾塗之又以牙塗封傷處又取人屎厚付布裹即消(丹心)○急飲好醋二碗

令毒氣不隨血走或清油亦可(入門)○凡蛇毒取獨頭蒜或小蒜或苦苣或水蓼或豆葉或荏葉皆搗飲汁以滓付傷處(本草)○又絲瓜根洗淨搗研生酒調吃一醉立已(海上)○又鷓鴣及腳骨燒

灰飲服滓付之(本草)○又蚯蚓或蝦蟇搗付之(本草)○牛耳中垢猪耳中垢取付之猪齒燒灰付之(本草)○被蛇咬人忌食酸物梅子犯之必大痛(綱目)○蜈蚣制蛇毒爲末付(本

草)○辟蛇法殺羊角燒之蛇即遠去又小袋盛雄黃帶之蛇遠避又養鵝辟蛇(本艸)

蝎螫傷 蝎有雌雄雄螫痛在一處并泥付之雌者痛牽諸處取瓦屋溝下泥付之無雨時新水從屋上淋下取泥用(本草)○蝎螫痛不可忍冷水漬之即不痛水微煖復痛即易新水(本草)○蝎螫痛

半夏生一字雄黃一字巴豆一個右同研付之(綱目)○又白礬半夏爲末醋調貼之痛止毒出(得效)○又臚耳中垢或貓屎塗之蜘蛛取汁付之又地上磨生薑塗之又薄荷細嚼付之又白礬熔汁

滴傷處(本草)

蜈蚣咬傷 蜈蚣咬人傷痛取蜘蛛安咬處當自吸毒如死而痛未止更易生者如蜘蛛死即投水中救活(綱目)○蛇含草按付之又蝸牛取汁滴入咬處又烏雞血及屎塗之○桑白皮汁或獨頭蒜



蜘蛛咬傷

碗化水點
入雄

咬處即差（本草）○蜘蛛咬人瘡中出絲屢有死者惟飲羊乳可制其毒（本草）○黃麝香末各一錢和之細飲其汁並點交處有人被涎蜘蛛咬重痛至急得此藥汁一服即愈

汁亦好
本草

（本草）○蜘蛛傷土蜂燒末油和付之又取土蜂窠土醋調塗之穴土居赤黑色者是蜂也
又多取人尿灌甕中坐浸其身防蛛毒入內（本草）○又烏雞尿浸西鼠鼠

草○
汁塗之

薤白或韭搗付之又雄黃末付之又桑白皮
又薤青子研油付之又小薊汁飲之（本草）

蚯
蚓
傷
湯有

人以此毒腹大夜間蚯蚓鳴於身有人教用鹽水浸之而愈○有人跌立溼地中其毒死飲鹽水次以鹽湯浸其足即愈本草○近引交其形如大風胃氣字

草○
又老茶

蚯蚓吹瘡雞屎付之○蛭蟻咬鴨屎付之
葉細末油調付蛭蟻即蛭蚓也綱目

蠅虻傷○此

蠅屎瘡如熱痂而大繞腰匝不可療虫如小蜈蚣色青黑長是豆葉安針印之(綱目)

○又鹽
脂苦酒

湯淋潰瘡上數日愈又犀角水磨塗之又雞屎塗之又胡燕窠中土猪和塗之又雞腸草按付之又胡粉和醋付之又嚼梨汁付之（本草）

蜂叮傷醋蜂

雄黃塗之○又青油擦之○薄荷葉貼之○蜂房爲末猪脂和付○授芋莖擦之卽愈○

蠶咬傷汁屋

上爛茅和醬汁研付○麝香蜜調塗之○
飲之又塗之芒近蠶種則蠶不生本草

蝸牛傷

子汁浸之卽差（本草）

蝮蛇傷
灰蛇

以泔水和浸洗以滓付之（本艸）槨葉燒

壁鏡傷

咬毒人必死桑灰淋濃汁調白礬
○又醋磨雄黃塗之（尋效）