

S 2513

4523

金匱玉函經二註

卷柒至拾壹



金匱玉函經二註卷之七

趙以德衍義

元和李清俊燦華校刊

周揚俊補註

慈谿洪明光旭照參校

肺痿肺癰咳嗽上氣病脉證治第七

論三首脉證四條方五首

補註嘉言云金匱於肺痿肺癰二證則徹土綢繆治

之於蚤然先從脉辨其數虛數實次從口辨其吐沫

乾燥然更出一提要之法謂咳嗽之初卽見上氣喘

急者乃外受風寒所致其脉必浮宜從越婢加半夏

之法及小青龍加石膏之法亟爲表散不爾卽是肺

癰肺痿之始基。故以咳嗽上氣病證同敘於肺癰肺痿之下。而另立痰飲咳嗽本門。原有深意。見咳而至於上氣。卽是肺中壅塞逼迫難安。尙何等待。不急散邪下氣以清其肺乎。然亦分表裏虛實爲治。不當誤施。轉增其困矣。

再論肺癰肺痿之病。皆燥病也。肺稟清肅之令。乃金寒水冷之藏。火熱熏灼。久久失其清肅。而變爲燥。肺中生癰。其津液全裹其癰。不溢於口。故口中辟辟然乾燥。肺熱成痿。則津液之上供者。悉從燥熱化爲涎。

沫濁唾，證多不渴，較胃中津液盡傷，母病累子之瘵。又大不同，祇是津液之上輸者，變爲唾沫，肺不霑其惠澤爾。若夫痿病，津液不能滅火，反從火化，累年積歲，肺葉之間，釀成一大火聚。以清涼投之，扞格不入矣。然雖扞格，固無害也。設以燥熱投之，以火濟火，其人有不坐斃者乎？半夏燥藥也，投入肺中，轉增其患，自不待言。但清涼既不能入，惟燥與燥相得，乃能入之。故用半夏之燥，入清涼生津藥中，則不但不燥，轉足開燥。其濁沫隨逆氣下趨，久久津液之上輸者，不

結爲涎沫。而肺得霑其漬潤。痿斯起矣。人但知半夏能燥津液。孰知善用之。卽能驅所燥之津液乎。此轉蘊也。

總按肺爲嬌藏。肺氣素爲形寒飲冷而受傷。久久汗過多而不瘥。氣餒不振。卽爲肺痿。其風傷皮毛。熱傷血脉。風熱相搏。氣血稽留。遂爲肺癰。肺痿多涎法。乃至便下濁沫。肺癰膿血。乃至便下膿積。凡胃強能食而下傳者。皆不死也。夫血熱則肉敗。營衛不行。必將爲膿。是以金匱以通行營衛爲第一義。欲治其子。

先建其母。胃中津液。尤貴足以上供而無絕乏。後世諸方。錯出不一。不明大意。今閱金匱十五方。固已用之不盡矣。

問曰。熱在上焦者。因咳爲肺痿。肺痿之病。從何得之。師曰。或從汗出。或從嘔吐。或從消渴。小便利數。或從便難。又被快藥下利。重亡津液。故得之。曰。寸口脉數。其人咳。口中反有濁唾涎沫者何。師曰。爲肺痿之病。若口中辟燥。欬卽胸中隱隱痛。脉反滑數。此爲肺癰。咳唾膿血。脉數虛者爲肺痿。數實者爲肺癰。

補註按嘉言云、人身之氣、稟命於肺、肺氣清肅、則周
身之氣、莫不服從而順行。肺氣壅濁、則周身之氣、易
致橫逆而犯上。故肺癰者、肺氣壅而不通也。肺痿者、
肺氣痿而不振也。纔見久咳、先須防此兩證。肺癰由
五藏蘊崇之火、與胃中停蓄之熱、上乘乎肺、肺受火
熱薰灼、血爲之凝、痰爲之裹、遂成小癰、所結之形漸
長、則肺日脹而脇骨日昂。迺至咳聲頻併、痰濁如膠、
發熱畏寒、日晡尤甚、面紅鼻燥、胸生甲錯、始先卽能
辨其脉證、屬表屬裏、極力開提攻下、無不愈者。迨至

血化爲膿。肺葉朽壞。傾囊吐出。始識其證。十死不救。嗟無及矣。間有癰小氣壯。胃強善食。其膿不從口出。或順趨肛門。或旁穿脇肋。仍可得生。然不過十中三耳。仲景治法最精。用力開提於未成膿之先。今人施於旣成膿之後。其有濟乎。肺痿者。其積漸已非一日。其寒熱不止一端。總由胃中津液不輸於肺。失其所養。轉枯轉燥。然後成之。蓋肺金之生水。精華四布者。全藉胃土津液之富。上供罔缺。但胃中津液暗傷之竇最多。粗工不知愛護。或腠理素疎。無故而大發。

其汗。或中氣素餒。頻吐以傾倒其囊。或痺或消中。飲水而渴不解。泉竭自中。或腸枯便秘。強利以求其快。漏卮難繼。只此上供之津液。坐耗岐途。於是肺火日熾。肺熱日深。肺中小管日窒。咳聲以漸不揚。胸中脂膜日乾。咳痰艱於上出。行動數武。氣卽喘鳴。沖擊連聲。痰始一應。金匱治法。貴得其精意。大要緩而圖之。生胃津。潤肺燥。下逆氣。開積痰。止濁唾。補真氣。以通肺之小管。散火熱。以復肺之清肅。如半身痿廢。及手足痿軟。治之得法。亦能復起。而肺近在胸中。呼吸所

關可不置力乎。肺癰屬在有形之血，血結宜驟攻。肺痿屬在無形之氣，氣傷宜徐理。故癰爲實，誤以肺痿治之，是爲實實；痿爲虛，誤以肺癰治之，是爲虛虛。此辨證用藥之大畧也。然兩手寸口之脈，原爲手太陰肺脈。此云寸口脈數，云滑數，云數實數虛，皆指左右三部統言，非如氣口獨主右關之上也。其人咳，口中反有濁唾涎沫，頃之遍地者，爲肺痿。言咳而口中不乾燥也。若咳而口中辟辟燥，則是肺已結癰，火熱之毒出現於口，咳聲上下觸動其癰，胸中卽隱隱而痛。

其脉必見滑數有力。正邪氣方盛之徵也。數虛數實之脉。以之分別肺痿肺癰。是則肺痿當補。肺癰當瀉。明矣。

問曰。病咳逆。脉之何以知此爲肺癰。當有膿血。吐之則死。其脉何類。師曰。寸口脉微而數。微則爲風。數則爲熱。微則汁出。數則惡寒。風中於衛。呼氣不入。熱過於榮。吸而不出。風傷皮毛。熱傷血脉。風舍於肺。其人則咳。口乾喘滿。咽燥不渴。多唾濁沫。時時振寒。熱之所過。血爲之凝滯。畜結癰膿。吐如米粥。始萌可救。膿成則死。

補註按嘉言云肺癰之脉。既云滑數。此復云微數者。非脉之有不同也。滑數者。已成之脉。微數者。初起之因也。初起左右三部脉微。知其衛中於風而自汗。左右三部脉數。知爲榮吸其熱而畏寒。然風初入衛。尙隨呼氣而出。不能深入。所傷者不過在於皮毛。皮毛者肺之合也。風由所合以漸舍於肺俞而咳唾振寒。茲時從外入者。從外出之易易者。若夫熱過於榮。卽隨吸氣所入。不出而傷其血脉矣。衛中之風。得榮中之熱。畱戀固結於肺葉之間。乃致血爲凝滯。以漸結

爲癰膿。是則有形之敗濁。必從瀉法而下驅之。使其邪毒隨驅下移。入胃入腹入腸。再一驅。卽盡去不復矣。安在始萌不救。聽其膿成而腐敗耶。上氣面浮腫。肩息。其脉浮大不治。又加利尤甚。

補註肺爲氣之總司。主呼吸者也。今云上氣至於面浮腫。至爲肩息。是其肺氣壅逆。而肩爲動搖矣。何也。肺之所畏者火也。設中焦邪實。阻其升降。而炎上之性有加無已。則所呼之氣。邪有以助之。而所吸之氣。不復下達。遂使出入息肩矣。加以脉浮大。火勢方張。



本體既衰而邪削更甚。又何法可令其內還而下趨乎。故不治也。然猶有可圖者。庶幾中土尙培生氣未絕耳。若加利爲尤甚也。

上氣喘而燥者。屬肺脹。欲作風水。發汗則愈。

補註同一上氣也。此則作喘而不息肩者。正以皮毛乃肺之合。爲邪所蔽。遂令肺氣不得外達。故寒傷營者。亦作喘也。彼燥陰也。上氣何以復燥。肺氣既塞。遂令下流不化。水既不化。又令木氣不疏。此皆以母病而兼及於子也。一發其汗。則塞者得以外通矣。逆者

得以下達矣。故曰愈也。

肺痿吐涎沫而不咳者。其人不渴。必遺尿。小便數。所以然者。以上虛不能制下故也。此爲肺中冷。必眩。多涎唾。甘草乾薑湯以溫之。若服湯已。渴者。屬消渴。

甘草乾薑湯方

甘草

四兩

乾薑

二兩

右二味以水三升。煮取一升五合。去滓。分溫再服。

補註嘉言云肺熱則膀胱之氣化亦熱。小便必赤澀。

而不能多。若肺痿之候。但吐涎沫而不咳。復不渴。反

遺尿而小便數者，何其與本病相反也。必其人上虛不能制下，以故小便無所收攝爾。此爲肺中冷，陰氣上巔，侮其陽氣，故必眩。陰寒之氣凝滯津液，故多涎唾。若始先不渴，服溫藥卽轉渴者，明是消渴，飲一溲二之證，更當消息之矣。

愚按肺寒上虛也，便數下虛也。聖人只溫其中，豈非以補其母，則子自安。總司之地溫而膀胱亦溫，下泉無冽彼之患矣。

欬而上氣，喉中水雞聲，射干麻黃湯主之。

射干麻黃湯方

射干

三兩

麻黃

四兩

生薑

四兩

細辛

三兩

紫苑

三兩

欵冬花

三兩

五味子

半升

大棗

七枚

半夏

半升洗

右九味以水一斗二升先煮麻黃二沸去上沫內諸

藥煮取三升分溫三服

補註嘉言云上氣聲如水雞明係痰阻其氣爾阻之

務在去之而仲景不專於去痰者以肺受風寒主氣

之司已爲邪困而不能自持莫若主於發表而佐以



南京中醫藥大學圖書館版權所有